

復以艾灸瘡上七壯則良

又方斑猫二枚熬一枚末服之燒一枚令絕烟末以傅瘡上卽差又以射苜蓿傳之佳

又方生麝香大蒜合搗以羊脂和著小筒子中帶之行今東間水無不有此浴竟中拭燂燂如苾毛針刺熟看見則以竹葉抄挑去之

比見嶺南人初有此者卽以茅葉細細刮去及小傷皮則爲佳仍數塗苦苴菜汁佳

已深者針挑取蟲子正如疥蟲著爪上映光方見行動也若挑得便就上灸三四壯則蟲死病除

道藏輯要

肘後備急方

全

虛集士  
川卷一

若覺猶惛惛見是毒已太深便應依土俗作方術拂出乃用諸湯藥以浴皆一二升出都盡乃止亦依此方并雜治中溪毒及射工法急救七日中宜差不爾則仍有飛蟲在身中噉人心藏便死慎不可輕

治卒服藥過劑煩悶方第六十七

服藥過劑煩悶及中毒多煩悶欲死方

刮東壁土少少以水一二升和飲之良

又方於屋雷下作坎方二尺深三尺以水七升灌坎中以物揚之令沫出取一升飲之未解更作

又方搗藍取汁服數升無藍只洗青絹取汁飲亦得

服藥失度心中苦煩方

飲生葛根汁大良無生者乾葛爲末水服五合亦可煮服之  
又方吞雞子黃數枚卽愈不差更作

服石藥過劑者

白鴨屎末和水調服之差

又方大黃三兩芫硝二兩生地黃汁五升煮取三升分三服得  
下便愈

若卒服藥吐不止者

飲新汲水一升卽止

若藥中有巴豆下痢不止方

道藏輯要

肘後備急方

笑

虛集十一  
川名川

末乾薑黃連服方寸七差

又方煮豆汁一升服之差

附方

外臺祕要治服藥過劑及中毒煩悶欲死

燒犀角末水服方寸七

治卒中諸藥毒救解方第六十八

治食野葛已死方

以物開口取雞子三枚和以吞之須臾吐野葛出

又方温猪脂一升飲之

又方取生鴨就口斷鴨頭以血瀝口中入咽則活若口不可開