

米上部

麻蕡麻子

畏牡蠣白  
惡茯苓

米中部

大豆及黃卷

惡五參龍膽得前胡烏喙  
杏仁牡蠣良殺烏頭毒

大麥

食蜜爲使  
殺藥火毒

右一百九十七種有相制使其餘皆無故不備錄

或曰古人用藥至少分兩亦輕瘥病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而瘥病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓少欲稟氣中和感病輕微易爲醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以爲醫病輕用藥須少病重用藥卽多此則醫之一隅何足怪也又古

道藏輯要

孫真人千金方

夫

續虛集三  
州文文

之醫者自解採取陰乾曝乾皆悉如法用藥必依土地所以治十得九今之醫者但知診脈處方不委採藥時節至於出處土地新陳虛實一皆不悉所以治十不得五六者寔由於此夫處方者常須加意重複用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳方來學者須詳而熟之

凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光明映徹色理鮮淨者爲佳不然令人身體乾燥發熱口乾而死

凡草石藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾治病不愈

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘惟須精新也