




圖經卷之十一



卷五

物以水五升煮取二升分再服亦主卒風
禁猪肉冷生薑尤亮集驗方載勅賜薑
茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一
兩椀呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷
即去皮大妙。劉禹錫在淮南與李亞同
幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李
乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方
用薑熟燥即不肯服故但出藥多效試之
信然李卿換白髮方云刮老生薑皮一大
升於鑄中以文武火煎之不得令過沸其
鑄惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以
薑皮置鑄中密固濟勿令通氣令一精細
人守之地色未分便須煎之緩緩不得令
火急如其人稍疲即換人看火一伏時即
成置於甕鉢中極研之李云雖曰一復時
若火候匀即至日西藥成也使時先以小
物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然
後拔之再拔以手指熟燃之令入肉第四
日當有黑者生神效

陶隱居云乾薑今惟出臨海章安兩三村

解作之蜀漢藍舊美荊州有好薑而並
能作乾者。又云生薑歸五藏去痰下氣
止嘔吐除風邪寒熱久服少恚少智傷心
氣如此則不可多食。

唐本註云薑久服通神明主風邪主痰氣
生者尤良經云久服通神明即可常飲也。
四五
陳藏器云生薑本攻外汗解毒藥自餘破
血調中去冷除痰開胃用熱即去皮要冷
留皮。

○
日華子云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹
痛冷皮胃乾嘔瘀血撲損止鼻洪解冷熱。

○
毒開胃消宿食。

禹錫云按藥性論云乾薑臣味苦辛治腰
腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開
五藏六腑去風毒冷痺夜多卜便乾者治
嗽主溫中用秦艽主霍亂不止腹痛消脹
滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之
又云生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並
治嗽療時疾止嘔通不下食生和半夏主
心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜食之

又汁和杏仁作煎下一切結氣實心有擁
隔冷熱氣
食療云生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋
心滿去胃中氣通神明又胃氣虛風熱
不能食薑汁拌雞子殼生地黃汁少許蜜
一匙頭和水三合頓服立差。

○
外臺祕要治霍亂注痢不止轉筋入腹欲
死生薑三兩搗破以酒一升煮三四沸頓
服。○又方久患咳嗽連咳四五之聲者取
生薑汁半合蜜一匙頭煎令熱溫服如此
千金方治乾嘔嗽若手足厥冷宜食生薑
此是嘔家藥又治心下痞堅不能食胃中
嘔氣生薑八兩細切以水三升煮取一升
半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二
味合煮取一升半稍服之。○又方治產
後穢污下不盡腹滿生薑二斤以水煮取
汁服即出。

經驗方善治狐臭用生薑塗腋下絕根本
楊氏產乳方胎後血上衝心生薑五兩切

以水八升煮三升分三服

唐崔魏公云鉉夜暴亡有梁新聞之乃訛
之曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半
夏苗必是半夏毒命生薑捩汁折齒而于
之即活

行義曰生薑治暴嘔氣嚼三兩皂子大下
嚙定屢服屢定初得寒熱痰嗽燒一塊哈
齒之終日間軟自愈暴赤眼無瘡者以古
銅錢刮淨薑上取汁於錢脣點目熱淚出
今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試

葉耳

卷之三

采耳 辛散之味 寶味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名蕘一名常思生安陸川谷及六安田野寶熟時採

圖經曰筭耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之筭耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味或曰此物本生蜀中其實

禹錫云按爾雅云卷耳芩耳注廣雅云菜耳也亦云胡荽江東呼爲常葉或曰芩耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采

多刺因羊過之毛中粘纓遂至中國故名
羊負來俗呼爲道人頭寶熟時採之
藥性論云某耳亦可單用味甘無毒主肝
家熱明目

孟詵云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫
因重生擣蒼耳根葉和小兒尿絞汁冷服
一升日三度甚驗

陶隱居云此是常思菜餚人皆食之以葉

覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦堪稀

唐本註云蒼耳三月已後七月已前刈日乾爲散夏水服冬酒服主大風癩瘡頭風

濕痺毒在骨髓日二服丸服二十三十九

陳藏器云莫耳葉按安舌下令涎出去日黃好睡子炒令香麝去刺使腹破浸酒去

雷公云凡採得去心取黃精用竹刀細切
拌之和同蒸從巳至未去黃精取出陰乾
風補益又燒作灰和臘月豬脂封丁腫

千金方嘗以五月五日午時乾地刈取藁耳葉洗曝燥搗下篩酒若漿水服方寸七
日三夜三散若吐逆可密爲丸準計一方
寸七數也風輕勿治者日再服若身體有
風處皆作粟狀出或如麻豆粒此爲風毒

千金翼方治牙痛以蒼耳子五升水一斗
煮取五升熬合之痛即吐吐後復含不過
三劑差蒼耳亦得○又方治五痔方蒼耳
莖葉以五月五日採乾爲末以水服方寸

匕立效

食醫心鏡卷五

云除一切風濕痺四肢拘攣蒼

耳子三兩擣末水一升半煎取七合去滓

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死
忽倒地不知人事者用喝起草取其嫩心
不限多少陰乾爲末以常酒服一大盞不

拘時候其功效大效服之多連腦蓋善通項
門今蒼耳是也

勝金方治毒蛇并射丁沙風等傷眼黑口

噤手腳強直毒攻腹內成塊逡巡不救宜

之將滓厚罨所傷處

楊氏方產乳治誤吞錢繫耳頭一把以水
一升浸水中十餘度飲水愈

葛根

州城



州海

葛根

味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痒

師言微弟子洪南堂製作
起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表
出汗開腠理療金瘡止痛腸風痛 生根汁

大寒療煩渴傷寒壯熱 葛穀主下痢十歲

已上 葉主金瘡止血 花主消酒一名雞

卷五
齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月
採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒

圖經曰葛根生汶山川谷今處處有之江
浙尤多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉
頗似槐葉而青七月著花似豌豆花不

實根形如手臂張仲景治傷寒有葛根及
加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解
肌開腠理

陶隱居云即今之葛根人皆蒸食之當取
入土深大者破而日乾之生者擣取汁飲

之解毒病發熟其花并小豆花乾末服方
寸匕飲酒時知醉南康廬陵間最勝多肉
而少筋甘美

陳藏器云葛根生破血合瘡墮胎解酒毒
身熱亦酒黃小便赤澁可斷穀不飢根堪
嚼亦可斷穀不飢根堪

作粉

日華子云葛冷治胃膈熱心煩悶熱結止
血痢通小腸排膿破血傳蛇蟲蠭解署毒
箭乾者力同

食療云葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

卷五
聖惠方治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗
擣取汁一大盞豉一合煎至六分去豉不

計時候分作二服汗出即差未汗再服若
心熱加梔子仁十枚同煎去滓服○又方
治小兒熱渴久不止用葛根半兩細剉水

一中益煎取六分去滓頻溫服

外臺秘要治傷筋絕擣葛根汁飲之葛白

屑熬令黃傅瘡止血

千金方酒醉不醒擣葛根汁飲一二升便醒

肘後方治卒乾嘔不息擣葛根絞取汁服

一升差○又方食諸菜中毒發狂煩悶吐

下欲死煮葛根汁飲之

梅師方治傷寒初患二三日頭痛壯熱嘔

根五兩香豉一升細剉以童子小便六升

煎取二升分作三服取汗觸風食葱豉粥

廣利方治心熱吐血不止生葛根汁半大

升頓服立差

傷寒類要治妊娠熱病心悶取葛根汁二

升分水三服

父五

衍義曰葛根灌鼎之間冬月取生葛以水

中揉出粉澄成塊先煎湯使沸後擘成塊

下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯中

拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴病

多食行小便亦能使人利病酒及渴者得

之甚良彼之人又切入煮茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煮熟者作果可處吉州南安軍亦有此賣

葛味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸擣汁飲之良

圖經曰文具葛根條下

陳藏器云拾遺云用裹小兒熱瘡妙

禹錫云按中品上卷葛根條功用與此相

通

聖惠方治中鳩毒氣欲絕者用葛粉三合

水三中益調飲之如口禁者以物揭開灌

之○又方治胃中煩熱或渴心躁葛粉四

兩先以水浸粟米半升經宿漉出與葛粉

相拌令勻煮熟食之

食醫心鏡治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇

方葛粉二大錢以水二合調令勻鴻向鑄

鐸中傾側令遍重湯中煮令熟以糜飲相

和食之

十一

桔樓栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱

補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面

黃脣乾口燥短氣通月水止小便利一名地

樓一名果羸一名天瓜一名澤姑實名黃瓜

主胃痺悅澤人面○莖葉療中熱傷暑生洪

農川谷及山陰地入土深者良生鹵地者有

毒二月八月採根曝乾三十日成枸杞爲之

使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

父五

圓經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所

在有之實名黃瓜詩所謂果蓏之實是也

根亦名白藥皮黃肉白三四月內生苗引

藤蔓葉如甜瓜葉作又有細毛七月開花

似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青



至九月熟○孫思邈作粉法深掘大根屈
前皮至白處寸切之水浸一日一易未經
五日取出爛擣研以絹袋盛之澄濾令極
細如粉○唐崔元亮療箭鏃不出擣根傳

父五瘡日三易自出又療時疾發黃心強煩熱
悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水

十三九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合
不令消盡分再服便差

陶隱居云出近道藤生狀如土瓜而葉有
又毛詩云果蠃之實亦施于宇其實今以

雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者○
服食亦用之

唐本註云今用根作粉大宜服食虛熟人
食之作粉如作葛粉法潔白美好今出陝
州者白實最佳

禹錫云按爾雅云果蠃之實桔樓釋曰果
蠃之草其實名桔樓郭云今齊人謂之天
瓜

日華子云桔樓子味苦冷無毒補虛勞口
乾潤心肺療手面皴吐血腸風漏血赤白

病並炒用又桔樓根通小腸排膿消腫毒
生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰
發背痔瘻瘍癧父五

雷公云桔樓凡使皮子莖根效各別其桔

并要樣全別若桔自丸黃皮厚蒂小若要
唯形長赤皮蒂纏是陰人服若脩事去上

殼皮革膜并油子使

聖惠方治熱病頭痺發熱進退方用桔樓
一枚大者取瓢細剉置甕碗中用熱湯一
盞拔之蓋却良久去滓不計時候服

外臺秘要治消渴利方生桔樓三十斤以
水一碩煮取一斗半去滓以牛脂五合煎
取水盡以燒酒先食服如雞子大日三服
即妙

肘後方消渴小便多桔樓薄切炙取五兩
父五水五升煮取四升隨意飲之良○又方若
腸隨肛出轉久不可收入擣生桔樓取汁
溫之豬肉汁中洗手隨接之令暖自得入
梅師方治諸癰背發乳房初起微赤擣桔
樓作末以井花水調方寸匕

集驗方下乳汁桔樓子淘洗控乾炒令香
熟瓦上搗令白色為末酒調下一七合面
臥少時

杜工方治肩膈痛徹背心腹痞滿氣不得
通及治痰嗽大桔樓去穰取子熟炒別研
和子皮麪糊為丸如梧桐子大米飲下十
五丸

母子祕錄治乳腫痛桔樓黃色老大者一
枚熟擣以白酒一斗煮取四升去滓溫一
升日三服若無大者小者二枚黃熟為已
楊氏產乳方治熱遊丹赤腫桔樓末二大
兩釀醋調塗之

產寶方治產後乳無汁桔樓末井花水服
方寸匕日二服夜流出

楊文蔚方治癰嗽利肩膈方桔樓肥實大
者割開子淨洗搘破桔皮細切焙乾半夏
十五四十九箇湯洗十遍搘破焙乾為末用洗
桔樓熟水并瓢同熬成膏研為丸如梧子
大生薑湯下二十九

衍義曰桔樓實九月十月間取穰以乾葛

粉拌焙乾銀石器中熳火炒熟爲末食後
夜卧以沸湯點一二錢服治肺燥熱渴大
腸祕其根與貝母知母秦艽黃芩之類皆
治馬熱

苦參



告味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃
疸澀有餘滯逐水除癰腫補中明日止浹養
肝膽氣安安五藏定志益精利九竅除伏熱
腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部醫平
胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦藏音十六
一名地槐一名莧槐父五一名驕槐十六一名白莧音十七

名虎麻一名莧莧一名裸白一名陵郎生汝
南山谷及田野三月八月十月採根曝乾玄
參爲之使惡貝母漏蘆菟絲反藜蘆

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道

處處皆有之其根黃色長五七寸許兩指
麤細三五莖並生苗高二三尺已來葉碎
青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其
花黃白七月結實如小豆子治癩疾其法
用苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每

飲一合日三常服不絕若覺痺即差
陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹
故有槐名花黃子作莧根味至苦惡病人
酒實飲之多差患者一兩服亦除甚能
殺蟲

禹錫云按藥性論云苦參能治熱毒風皮
肌煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡治
腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚
不入湯用

日華子云殺疳蟲炒帶煙出爲末飯飲下
治腸風漏血父五并熱痢十七

雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔
汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮並
須重重淘過即蒸從巳至申出耽乾細剉
用之

外臺秘要治天行病四五日結脣滿痛壯
熱身體熱苦參一兩剉以醋二升煮取一
升二合盡飲之當上即愈天行毒病作苦
參醋藥不解及湛覆取汗愈○又方小兒
身熱苦參湯浴兒良

千金方治狂邪發無常拔頭大吐欲殺人
不避水火苦參麥九桐子大每服十九薄
荷湯下
梅師方治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩
以苦酒一升煎五沸去滓服之吐出即愈

或取黃犀角汁一升亦佳。又方治傷寒

四五日頭痛壯熱，背中煩痛苦參五兩烏

梅二十枚細剉以水二升煎取一升溫服

千金方治時疾熱病，狂言心躁苦參不限

多少炒黃色爲末，每服二錢水一盞煎至

八分溫服連進參服有汗無汗皆差。

集驗方治毒熱足腫疼，欲絕酒煮苦參以

漬之。

太史公云：淳于意醫齊中大夫，病齶齒炎

左手陽明脉苦，參湯日漱三升出入得五

六日愈。

衍義曰：苦參有朝士苦腰重，久坐旅拒十

餘步然後能行，有一將佐謂朝士曰：見公

日逐以藥揩齒，其氣味傷腎，故使人腰重

後有太常少卿舒昭亮用苦參已數年此

病曰：苦參入齒，其氣味傷腎，故使人腰重。

父五後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒，歲久

亦病腰，自後悉不用腰疾皆愈。此皆方書

舊不載者，有人病遍身風熱，細癰痒痛不

可任，連肩頸臍腹及近陰，皆然挺癰亦多

夜不得睡，以苦參末一兩，皂角二兩，水一升，搗處取汁，銀石器熬成膏，和苦參末爲九如梧桐子大，食後溫水服二十九至三十丸次日便愈。

當歸

陰乾惡簡茹畏菖蒲海藻牡蒙。

圖經曰：當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧滁州皆有之。以蜀中者爲勝，春生苗，綠葉有三瓣，七八月開花似時羅淺紫色，根黑黃色。二月採根，陰乾然，苗

有二種，都類芎藭而葉有大小爲異，莖梗比芎藭甚卑下，根亦二種，大葉名馬尾當歸，細葉名蠶頭當歸，以肉厚不枯者勝。

藥性論云：當歸臣惡熱，羶止嘔逆，勞寒熱破宿血，主女子崩中，下腸胃冷補諸不足，止痢腹痛，單煮飲汁治溫瘧，主女人瀝血，腰痛，療齒疼痛不可忍，患人虛冷加而用之。

陶隱居云：今隴西刀陽黑水當歸多肉少枝，氣香名馬尾。當歸稍難得，西川北部當歸多少枝而細，歷陽所出色白而氣味薄，不相似，呼爲草當歸。少時乃用之，方家有云：真當歸正謂此，有好惡故也。俗用甚多，道方時須爾。

唐本註云：當歸苗有二種，一種似大葉芎

當歸味甘辛，溫大溫，無毒，主欬逆，上氣溫瘧，寒熱洗_音在皮膚中，婦人漏下，絕子，諸惡瘧。瘡_音金瘡，煮飲之溫中止痛，除客血，內塞中風瘻，汗不出，濕痺中惡，客氣虛冷，補五藏，生肌肉。一名乾歸，生隴西川谷。二月八月採根。



清微弟子 沈南蘋

第一種似細葉芎藶惟莖葉卑下於芎藶也今出當州巖州翼州松州宕州最勝細葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠶頭者不如此不復用

陶稱歷陽者是蠶頭當歸也

日華子云治一切風一切血補一切勞破

父五

二十

惡血養新血及主癥瘕

雷公云凡使先去塵并頭尖硬處一分已

來酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實

處若要止痛止血即用尾若一時用不如

○不使服食無效單使妙也

禹錫云按爾雅云薛山蘡注廣雅曰山蘡

當歸也當歸今似蘡而麤大

吳氏云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒

岐伯雷公辛無毒季氏小溫或生羌胡地

別說云謹按當歸自古醫家方論用治婦

人產後惡血上衝倉卒取效無急於此氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血

各有所歸則可以於產後備急於補虛速

效恐聖人立當歸之名必因此出矣

外臺秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒一升
黃取六合飲至再服○又方治心痛當歸

爲末酒服方寸七

肘後方小兒多患胎寒好啼晝夜不止因
此成癇當歸末小豆大乳汁灌之日夜三

四度服

父五

二十葛氏方治小便出血當歸四兩細剉酒三

升復取一升頓服

梅師方胎動下血心腹疼死生不知服此

○湯活即安死即下用當歸四兩芎藶九兩

細剉以酒三升水四升煎取三升分服

子母祕錄治倒產子死腹中持當歸末酒

服方寸七

支太醫方治婦人百病諸虛不足當歸四

兩地黃二兩爲末蜜和丸如梧子大食前

未飲下十五丸

麻黃



黃

麻

麻黃

洲



味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫

瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱
破癥堅積聚五臟邪氣緩急風脅痛字乳餘

疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌淺邪惡

氣消亦黑斑毒不可多服令人虛一名單相

○一名龍沙一名卑鹽生晉地及河東立秋採

莖陰乾令青厚朴爲之使惡辛夷石韋

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有

之以榮陽中牟者爲勝苗春生至夏五月

則長及一尺已來梢上有黃花結實如百

合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣

外紅皮裏仁子黑根紫赤色俗說有雌雄

二種雌者於三月四月內開花六月內結

子雄者無花不結子至立秋後收採其莖
陰乾令青○張仲景治傷寒有麻黃湯及

大小青龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射
肝脾黃湯厚朴麻黃湯皆大方也古方湯
用麻黃先煮去沫然後內諸藥亦用丸散
者皆不然也

陶隱居云今出青州彭城榮陽中牟者爲
勝色青而多沫蜀中亦有不好用之拆除
節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令
人煩其根亦止汗夏月糾粉用之俗用療
傷寒解肌第一

唐本註云鄭州鹿臺及閻中沙苑河傍沙

洲上大多其青徐者今不復用同州沙苑。
日華子云通九竅調血脉開毛孔皮膚逐
風破癰癬積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐
瘴氣

雷公云凡使去節并沫若不盡去之令人
悶用夾刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細
剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡瀝出曬
乾用之

禹錫云按藥性論云麻黃君味甘平能治
身

身上毒風瘡瘍皮肉不仁主壯熱解肌發
汗溫瘡治溫疫根節能止汗方曰并故竹
扇杵末搘之又牡蠣粉粟粉并根等分末
生絹袋盛盃汗出即搘手摩之

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻
黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美
酒五升煮取半升去滓頓服
子母祕錄治產後腹痛及血下不盡麻黃
去節杵末酒服方寸七日二三服血下盡
即止澤蘭湯服亦妙

衍義曰麻黃出鄭州者佳剪去節半兩以
蜜一匙七同炒良久以水半升煎俟沸去
上沫再煎去三分之一不用滓病瘡瘍倒
疊黑者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一
法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服
然其效更速以此知此藥入表也

通草

解州

通脫木

圖經曰通草生石城山谷及山陽今澤路
漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大
如指其莖幹大者徑三寸每節有二三枝
枝頭出五葉頗類石葦今人謂之木通俗

通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱。

通利九竅血脉關節令人不忘療脾疽常欲
眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消
及金瘡惡瘡鼠瘻蹠折鰓_音鼻息肉墮胎去
三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山

陽正月採枝陰乾

十一

十一

間所謂通草乃道脫水

陶隱居云今出近道繞樹藤生汁白莖有

細孔兩頭皆通舍一頭吹之則氣出彼頭

者良或云即萬藤莖

陳藏器云通脫木無毒花上粉主諸蟲瘡

野雞病取粉內瘡中生山側葉似草麻心

中有瓣輕白可愛女工取以飾物爾雅云

離南活脫也一本云藥草生江南主蟲病

今俗亦名通草○又云本功外子味甘利

大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴

○下氣江東人呼爲萬子江西人呼爲擎

子如算袋穰黃子黑食之當去其皮蘇云

色白乃候蓄也

日華子云木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻息通小腸下水破積聚血

塊排膿治瘡節止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳子名覆子七八月採

禹錫云按藥性論云木通臣微寒一名王

翁萬年主治五淋利小便開關格治人多

睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘡癰

陳士良云驚蘆子寒無毒主胃口熱閉反胃不下食除三焦客熱此是木通實名粹

校子莖名木通主理風熱淋疾小便數急

疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷

味溫平主諸瘻瘍喉嚨痛反喉痺並宜煎

服之磨亦得急即含之

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞

即使通又除寒熱不通之氣消鼠癰金瘡

○蹠折煮汁釀酒也

赤白下年月深久不差者白芍藥三大兩

乾薑半大兩細剉熬令黃擣篩空肚和飲

汁服一錢七

藥性論云芍藥臣能治肺邪氣腹中疼痛

血氣積聚通宣藏腑擁氣治邪痛敗血主

時疾骨熱強五藏補腎氣治腹堅脹婦人

血閉不通消瘀血能蝕膿

陶隱居云今出自白山蔣茅山最好白而長

大餘處亦有而多赤赤者小利俗呼以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煮石用

錐生中嶽川谷及丘陵二月八月採根暴乾須丸爲之使○禹錫等按別本作雷丸惡石斛消畏消石鼈甲小薊反藜蘆

圖經曰芍藥生中嶽川谷及丘陵今處處有之海南者勝春生紅芽作叢莖上三枝

五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根

根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有

二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深

俗呼爲牡丹非也○正比廣利方治婦女

乾薑半大兩細剉熬令黃擣篩空肚和飲

赤白下年月深久不差者白芍藥三大兩

乾薑半大兩細剉熬令黃擣篩空肚和飲

汁服一錢七

藥性論云芍藥臣能治肺邪氣腹中疼痛

血氣積聚通宣藏腑擁氣治邪痛敗血主

時疾骨熱強五藏補腎氣治腹堅脹婦人

血閉不通消瘀血能蝕膿

陶隱居云今出自白山蔣茅山最好白而長

大餘處亦有而多赤赤者小利俗呼以止

痛乃不減當歸道家亦服食之又煮石用

之

別本註云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色

日華子云治風補勞主女人一切病并產前後諸疾通月水退熱除煩益氣

雷公云凡採得後於日中曬乾以竹刀刮上麤皮并頭土了剉蜜水拌蒸從巳至未曬乾用

禹錫云按吳氏云芍藥神農苦桐君甘無

毒岐伯鹹李氏小寒雷公酸

別說云今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絕不佳故入藥不可責其效

今考用宜依本經所說州谷丘陵有生者爲勝爾

經驗後方治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎

骨一兩炙爲末夾絹袋盛酒三升漬五日

每服二合日三服

博濟方治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麪裹煨爲末每服一錢匕水一盞煎至七分空心服

廣利方金瘡血不止痛白芍藥一兩蒸令

黃杵細爲散酒或米飲下二錢並得初三服漸加

初虞世治咯血衄血白芍藥一兩犀角末一分爲末新水服一錢匕血止爲限

衍義曰芍藥全用根其品亦多須用花紅

而單葉山中爲佳花葉即多根虛然其根

多赤色其味澀若或有色白麤肥者益好

餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言

者減芍藥以避中寒誠不可忽

○ 蝶豆花



正一天師清微弟

○ 馬蘭

乾

圖經曰蠶實馬蘭子也北人音訛呼爲據子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦

有之近京尤多葉似蕘而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有

稜根細長通

黃色人取以爲刷三月採花

五月採實並陰乾用○崔元亮治喉痺腫

痛取荔花皮根共十二分以水一升煮六

合去滓舍之細細嚥汁差止

陶隱居云方藥不復用俗無識者本名精

亦名豕首也

日華子云馬蘭治婦人血氣煩悶產後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癰腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺蕈毒亦可蔬菜食莖葉同用

外臺秘要治喉痺垂死者杵蠶實根一握水絞取汁稍稍嚥之口噤灌之


千金方治中壘下血如雞肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬蘭根末水服方寸匕隨吐則出極神此苗似葛蔓

綠紫生子似橘子

衍義曰蟲實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬蘭其日華子不當更言亦可爲蔬菜食蓋馬蘭其葉馬牛皆不食爲纔出土葉已硬況

又無味豈可更堪人食也今不敢以蟲實爲馬蘭子更俟博識者

瞿麥



○ 瞿麥

麥味苦辛寒無毒主關格諸癰結小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨
句麥一名大菊文五三十一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾薑草牡丹爲之使惡螺蛸

圖經曰瞿麥生太山川谷今處處有之高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似葵山紅二月至五

月開花七月結實作穗子頗似麥故名瞿

麥立秋後合子葉收採陰乾用古今方通心經利小腸爲最要張仲景治小便不利

有水氣括樓瞿麥丸主之

陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫

赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種肥大花邊有又極

未知何者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖

葉用而實正空殼無復子爾

日華子云瞿麥催生又名杜母草燕麥蕎麥又云石竹治痔瘻并瀉血作湯粥食並得

雷公云

凡使只用藥殼不用花葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用須以葷竹瀝浸一伏時瀝出曬乾使用

外臺祕要治癰以瞿麥爲末水調方寸七千金方治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之

梅師方治竹木刺入肉中不出瞿麥爲末

水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏方治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

衍義曰瞿麥八政散用瞿麥今人爲至要

藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病料其意者不過爲心與小腸爲傳送故用此入小腸藥按經瞿並不治心熱若心無大熱則當止治其

心若或制之不盡須當求其屬以衰之用心正散者其意如此

玄參



○ 瞿麥

○ 瞿麥

○ 雷公



云道家亦以合香未見其理也

日華子云治頭風熱毒遊風補勞虛損心驚煩燥劣之骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

雷公云凡採得後須用蒲葉重重相隔入

飯蒸兩伏時後出乾曬使用時勿令犯銅

餅之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之

禹錫云按藥性論云玄參使一名逐馬味苦治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤

瘻癰瘡

經驗方治患勞人燒香法玄參一斤甘松六兩爲末煉蜜一斤和勻入瓷餅內封閉地中埋窖十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和勻入餅內封更窖五日取出燒

令鼻中常聞香疾自愈

廣利方治療瘻經年久不差生玄參搗碎

傅上日二易之

秦艽

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘡灑血瘕下寒血除胃中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癰定五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及寃句三月四月採根暴乾惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

○圖經曰玄參生河間及寃句今處處有之。二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月採子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者肥膩一根生五七枚三八九月採暴乾或云蒸日乾陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根基黑亦微香道家時用亦以合香唐本註云玄參根苗臭莖亦不似人參陶



川芎

秦艽味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒濕風痺枝節痛下水利小便療風無問新久

通身癱急生飛鳥山谷二月八月採根暴乾菖蒲爲之使

圓經曰秦艽生飛鳥山谷今河陝州軍多

有之根上黃色相交糾長一尺已來麤細

不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萬巨葉六月開紫花似葛花當月結

子每於春秋採根陰乾

蠶陵長大黃白色爲佳根皆作羅紋相交
中多御土用之熟破除去方家多作秦膠

字與獨活療風常用道家不須爾
唐本註云今出涇州鄜州岐州者良本作
七或作斗或作艸三作亡一

林或作絲作膠正作加也

氣又名秦艽羅紋者佳

雷公云 凡使秦艽須於脚心處認取左
文列爲秦即治疾丸即發脚氣凡用秦先
以布拭上黃肉毛盡然後用還元湯浸一

宿至明出日乾用
父五

禹錫云按藥性論云秦艽解米脂人食穀不充悅畏牛乳點食之利大小便差五種黃病解酒毒去頭風

大效

聖惠方治傷寒心神熱躁口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎六分去滓不計時候分溫一服○又方治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去

苗以水一大盞煎取七分去滓每於食前

作兩服差

孫真人方治黃瘦皮膚脉細赤金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煮取一升去滓

內芒消一兩服

百合 微弟子

The image contains two separate illustrations of chrysanthemum plants. The top illustration, labeled '正工師清', shows a plant with several long, slender, light-colored petals. The bottom illustration, labeled '州成', shows a plant with shorter, more rounded petals. Both drawings are done in a traditional woodblock print style.

百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臍脹痞滿寒熱通身疼癟及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月採根曝乾

圖經曰百合生荊州川谷今近道處處有之春生苗高數尺幹麤如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開白花如石榴苗而大根如葫蒜重疊生二三十二月八月採根暴乾人亦蒸食之父五益氣張仲景治病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義

熟欵逆

食療云平主心急黃蒸過蜜食之作粉尤佳紅花者名山丹不堪食

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津

父五

三十七

又方治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃色搗爲散不計時候粥飲調下二錢服之

孫真人食忌云治陰毒傷寒煮百合濃汁服一升良

勝金方治耳聾疼痛以乾百合爲末溫水調下二錢七食後服

衍義曰百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其頭即有淡黃白花四瓣向下

覆長藥花心有檀色每一枝頭須五六花子色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗

圖經衍義本草卷之十二

圖經衍義本草卷之十三

父六

宋太醫助教辨驗藥材卷宗夷編撰
末通直師清微弟子洪百堅

草部中品之上

知母



知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱腸下邪氣膈中惡及風汗內痘多服令人洩一名蟇母岐音一名連母一名野蓼一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名堤音提又

母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須

一名沈燔一名蓀杜舍切臣禹錫等譙生河內川谷二月八月採根曝乾

圖經曰知母生河內川谷今瀕河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤

藥至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花八月結實二月八月採根異乾用藥性論云知母君性平主治心煩躁悶骨熱勞來往主產後蓐勞氣勞憎寒虛損

