

人恐毒入腹煮汁服之生搗傳瘡生濕地如
蓼大莖赤花白東土亦有之

問 味苦平無毒主結氣癰痛上氣氣急衰
服之生伊洛間洲渚苗似木賊節節相接亦
名接續草

圖經衍義本草卷之十五

圖經衍義本草卷之十六

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰
宋大醫助教辨驗藥材許洪校正

草部下品

附子 **烏頭** **天雄** **側子** **半夏**

虎掌 **由跋** **烏尾** **大黃** **升麻** **桔梗**

良姜 **草甘** **葛子** **旋覆花**

附子



附子 味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪
氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘀寒濕踈切

雙拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒
心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨強陰
又墮胎為百藥長生健為山谷及廣漢冬月
採為附子春採為烏頭

地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃

耆人參烏韭

陶隱居云附子以八月上旬採八角者良
凡用三建皆熱灰微炮令拆勿過焦惟薑
附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人
參生薑相配者正以制其毒故也○今按
陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳
中去聾去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜
入內含之勿咽其汁主喉痺

圖經曰文具側子條下

陳藏器云附子無八角陶強名之古方多

用八角附子市人所貨以八角為名

雷公云凡使先須細認勿誤用有烏頭烏

喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身

烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有如大豆許

者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文

武火中炮今破拆即劈破用天雄身全矮

無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即

是天雄宜炮破拆後去皮尖底用不然陰

制用並得側子只是附子傍有小顆附子

如棗核者是宜生用治風癰神妙木鼈子

只是諸家附雄鳥側中毗德者號曰木鼈子不入藥中用若服令人夜目若附子底平有九角如鐵色一箇重壹兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皴拆者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底子薄切用東流水并黑豆浸五日夜然後澆出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮尖了每十兩用生烏豆五兩東流水六升

聖惠方治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同

外臺秘要療偏風半身不遂冷痺症附子一兩生用無灰酒一升右咬咀內於酒中經一七日隔日飲之服一小合差

千金翼治大風冷癢痺脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者兩枚亦得炮之酒清春冬五日夏秋三日服一合以差為度

日再服無所不治○又方治口噤卒不開搗附子末內管中開口吹入喉差

經驗方嘔逆翻胃散大附子一箇生薑一筋細剉黃研如麪糊米飲下之

經驗後方治大人久患口瘡生附子為末醋麪調男左女右貼脚心日再換○又方治熱病吐下水利身冷脉微發躁不止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水二升煎一升溫服立効

斗門方治翻胃附子一箇最大者坐於樽上四面着火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復碎之約生薑汁可盡半椀許搗羅為末用粟米飲下一錢不過三服差○又方治元臟傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅為末以水兩盞入藥二錢鹽及薑薑同煎取一盞空心服大去積冷暖下元肥腸益氣酒食必無所礙

簡要濟眾治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一兩去皮臍生用搗為散生薑汁調如膏塗傳腫上藥乾再調塗之俟腫消為

度

孫用和治大瀉霍亂不止附子秤重七錢炮去皮臍為末每服四錢水兩盞鹽半錢煎取一盞溫服立止

張文仲療眼暴赤腫確痛不得開又淚出不止削附子去皮末如蠶屎著背中以定為度

崔氏方療耳聾風牙關急不得開方取八角附子一枚酢漬之三宿令潤微削一頭內耳中灸上十四壯氣通耳中即差

孫兆口訣云治陰威隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為炭存性為末蜜水調下為一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈○又方治頭痛附子炮石膏煨等分為末入腦麪少許茶酒下半錢

修真秘旨治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用菘豆一合同入銚子內煮豆熟為度去附子服豆即立差每箇附子可煮五服後為末服之


邵州



晉州



江寧府



梓州



成州



龍州



烏頭 味辛甘温大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胃上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙

禹鉏等按中蠱通用藥云射罔温大毒烏喙詳音味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊虛寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫

臘結又墮胎生朗陵山谷採陰乾長三寸已上為天雄

莽草為之使反半夏括樓貝母白欬白及惡藜蘆

陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根

春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂烏頭有兩岐其帶狀如牛角名烏喙喙即鳥之口也亦以八月採搗笮莖取汁日煎為

射罔獵人以傳箭射禽獸中人亦死宜速解之

○

唐本注烏喙即異名烏頭也此物同苗或有三岐者然兩岐者少縱天雄附子兩岐者仍依本名如烏頭兩岐即名烏喙天雄附子若有兩岐者復云何名之

禹錫等按吳氏云烏頭一名莨一名千秋

一名毒公事三一名果負一名耿子七神農雷公

桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相對與蒿相似如烏之喙名曰

烏喙也所畏惡使盡與烏頭同爾雅云葦葦草注即烏頭也江東呼為董音新

崔寔四民月令云三月可採烏頭

藥性論云烏頭使遠志為之使忌豉汁味苦甘大熱有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛痲痺氣塊益陽事

中風洗洗惡寒除寒熱主胃中痰滿冷氣

不下食治欬逆治齒痛破積聚寒主強志

又云烏喙使忌豉汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風溫濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者

陳藏器云射罔本功外主癩瘡瘡根結核

癰瘰毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔漸漸

近瘡習習逐病至骨瘡有熟膿及黃水出

塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不

可塗立殺人亦如殺走獸塗箭鏃射之十步倒也

日華子云土附子味瘰辛熱有毒生去皮

搗瀝汁澄清旋日乾取膏名為射罔獵人

以作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆

葉浮萍冷水薺菴皆可禦也
圖經曰文具側子條下

聖惠方治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三

分去皮臍生搗羅醞醋調塗於故帛上傳

之須臾痛止○又方治久疥癬方用川烏

頭七枚生用搗碎以水二大盞煎至一大盞去滓溫洗之

外臺秘要治頭風頭痛臘日烏豆一升炒

令黃末之絹袋盛酒三升浸溫服

千金方治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不

治久成聾生烏頭味掘得承濕削如棗核

大塞耳且易夜易不過三日愈○又方治

沙虱毒以射罔傳之佳

經驗方治一切冷氣去風痰定偏身疼痛

益元氣強精力固精益髓令人少病川烏

頭一觔用五升許大瓮鉢子盛以童子小便

浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏

頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破

每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸

之每日換七日通前浸二十一日取出焙

乾其藥潔白搗羅為末酒煮麩糊丸菴豆

大每服十九空心鹽湯酒下少粥飲壓之

如冷氣稍盛加丸數服之

經驗後方治痢獨聖九川烏頭一箇好者

柴炙火燒煙欲盡取出地上盞子合良久

細研用酒蠟丸如大麻子每服三九亦痢

用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白用

甘草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚痛水

吞下每於空心服之忌熱物

梅師方治蛇虺螫人以射罔塗螫處頗易

又方治婦人血風虛冷月候不勻或即脚

手心煩熱或頭面虛腫頑麻川烏頭一觔

清油四兩鹽四兩一處鑊內熬令烈如桑

椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處為

末入臼中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大

空心溫酒鹽湯下二十九亦治丈夫風疾

又方補益元藏進飲食壯筋骨二虎九烏

頭附子各四兩醞醋浸三宿取出切作片

子穿一小坑以炭火燒令通赤用好醋三


斗同藥傾入熱坑子內盆合之經一宿取

出去砂土用好青鹽四兩研與前藥同炒

空心冷酒下十五丸鹽湯亦得婦人亦宜
 又方療癱瘓風手足躡曳口眼喎斜言語
 蹇澁步履不正神驗烏龍丹川烏頭去皮
 臍了五靈脂各五兩右為末入龍腦麝香
 研令細勻滴水丸如彈子大每服一九先
 以生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服
 空心晚食前服治一人只三十九服五七
 九便覺擡得手移得步十九可以自梳頭
 勝金方治蝎咬烏頭末少許頭醋調傳之
 靈苑方治馬汗入瘡腫痛甚宜急療之遲
 則毒深難理以生烏頭末傳瘡口良久有
 黃水愈
 初虞世治陷甲成瘡連年不差川烏
 頭尖黃蘗等分為末洗了貼藥
 修真秘訣治瀉痢三神丸草烏頭三兩一
 兩生一兩熟炒一兩燒存性研為末以醋
 麪糊丸如菉豆大每服五丸空心服瀉用
 井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤
 白痢生薑甘草湯下
 孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉

細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾川烏頭
 乾薑等分右為麤散炒令轉色放冷再搗
 為細末每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞
 溫服
 古今錄驗治癰攻腫若有瘻肉突出烏頭
 五枚以苦酒三升漬三日洗之日夜三四
 度
 楊氏產乳療耳鳴无晝夜烏頭燒作灰菖
 蒲等分為末綿裹塞耳中日再用効也
 唐李寶臣為妖人置董於液中寶臣飲之
 即啗三日死
 武后置董於食賀蘭氏食之暴死
 衍義曰烏頭烏喙附子天雄側子五等皆
 一物也止以大小長短似像而名之後世
 補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大
 及半兩以上者其力全不借風家即多用
 大雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯
 就下故取數散也此用烏頭附子之大畧
 如此餘三等則量其材而用之其炮製之
 法經方已著

天雄



天雄 味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺
 歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨
 輕身健行療頭面風去來疼痛心腹結積關
 節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人
 武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山
 谷二月採根陰乾遠志為之使惡蕪婢
 陶隱居云今採用八月中旬天雄似附子
 細而長便是長者乃至三四寸許此與烏
 頭附子三種本並出建平故謂之三建今
 宜都佷山最好謂為西建錢塘間者謂為
 東建氣力劣弱不相似故曰西水猶勝東
 白也其用灰殺之時有水強巨兩者不佳
 唐本注云天雄附子烏頭等並以蜀道綿
 州龍州出者佳餘處縱有造得者力弱都

不相似江南來者全不堪用陶以二物俱
 出建平故名之非按國語實董于肉注云
 烏頭也爾雅云芫董音新○草郭注云烏頭
 苗也此物本出蜀漢其本名董今訛為建
 遂以建平釋之又石龍芮葉似董故名水
 董今復為水菖亦作建音此豈復生建平
 耶檢字書又無菖字甄立言本草音義亦
 論之天雄附子側子並皆用八月採造其
 烏頭四月上旬今云二月採恐非時也
 禹錫等按淮南子云天雄雄雞志氣益注
 云取天雄三枚內雄雞腸中搗生食之令
 人勇
 藥性論云天雄君忌豉汁大熱有大毒乾
 薑製用之能治風痲冷痺軟脚毒風能止
 氣喘促急殺禽虫毒

日華子云治一切風一切氣助陽道暖水
 臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血
 脉四肢不遂破痲癩瘰結排膿止痛續骨
 消瘀血補冷氣虛損霍亂轉筋背脊僂偻
 消風痲下胃膈水發汗止陰汗炮含治喉

痺凡丸散炮去皮臍用飲藥即和皮生使
 甚佳可以便驗又云天雄大長少角刺而
 虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而
 實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生
 者名為虎掌並是天雄一裔子母之類氣
 力乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌
 豉汁

圖經曰文具側子條下

陳藏器云天雄身全短無尖周匝四面有
 附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴
 拆後去皮尖底用之不然陰刺用並得
 別說云謹按此數條說前項備悉但天雄
 者始種烏頭而不生附子側子之類經年
 獨生長大者是也蜀人種之忌生此以為
 不利如養蠶而為白殭之類

側子



以 州

側子 味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰
 脚疼冷寒熱鼠癩又墮胎

陶隱居云此即附子邊角之大者脫取之
 昔時不用比來醫家以療脚氣多驗凡此
 三建俗中乃是同根而本經分生三處當
 各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭
 皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗
 陵縣屬豫州汝南郡今在北國
 唐本注云側子只是烏頭下共附子天雄

同生小者側子與附子皆非正生謂從烏
 頭傍出也以小者為側子大者為附子今
 稱附子角為側子理必不然若當陽已下
 江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角
 如大豆許夔州已上劔南所出者附子之
 角曾微黍粟持此為用誠亦難充比來京
 下皆用細附子有効未嘗取角若然方須
 八角附子應言八角側子言取角用不近
 人情也
 禹錫等按蜀本注云昔多不用今以療脚

氣甚効按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者側子大者為附子殊無證據但云附子角小如黍粟難充於用故有比說今據附子邊果有角大如棗核及檳榔已來者形狀亦自是一顆仍不小則是烏頭傍出附子附子傍出側子理亦明矣陶云初生形似烏鳥頭故謂之烏頭兩岐者如烏鳥口故名烏喙細而長乃至三四寸者為天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟麴等並不及前法

吳氏云側子一名葢神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同

藥性論云側子使能治冷風濕痺大風筋骨學急

圖經曰烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍為山谷及廣漢今並出蜀土然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前將肥腴陸田耕五七遍以豬糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收時一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小麥麴至收採前半月預先用大麥煮成粥後將上件麴造醋候熟淋去糟其醋不用大酸酸則水解之便將所收附子等去根須於新潔瓮內淹浸七日每日攪一遍日足撈出以彌踈篩攤之後向慢風日中曬之百十日以透乾為度若猛日曬則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割削附子傍尖牙角為側子附子之絕小者亦名為側子元種者母為烏頭其餘大小皆為附子以八角者為上如方藥要用須炮令裂去皮臍使之綿州

彰明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收採時月與本經所說不同蓋今時所種如此其內地所出者與此殊別今亦稀用謹按本經冬採為附子春採為烏頭而廣雅云奚毒附子也一歲為煎與側子同二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄今一年種之便有五物也豈今人種蒔之法用力倍至故爾繁盛也雖然藥力當緩於歲久者耳崔氏治寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎為頭主之以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一飴煎令透潤取出焙乾搗篩又以熟蜜丸如梧桐子大冷鹽湯吞二十圓永除又法用煎烏頭蜜汁以桂枝湯五合解之飲三合不知加五合其知者如醉以為中病續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不主悟人急者用大附子一箇可半兩者立劈作四片生薑一大塊立劈作三片如中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如人躰溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心

神定別服水解散太白通關散之類不得與冷水如渴更將滓煎與喫今人多用有效故詳著之

陳藏器云側子冷酒調服治遍身風疹雷公云側子只是附子傍有小顆附子如

棗核者是宜生用治風疹神妙也木鼈子只是諸喙附雄鳥側中毗穗者號曰木鼈子不入藥用若服之令人喪目

半夏



味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胃脹欬逆腸鳴止汗消心腹胃膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰墮胎療痿瘖恍惚澤面目生令人吐熱令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生

槐里川谷五月八月採根暴乾

射干為之使惡卓莢畏雄黃生薑乾薑蘇皮龜甲反烏頭

陶隱居云槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久用之皆

先湯洗十許過令滑盡不爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也唐本注云半夏所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸

南人特重之頃來互用功狀殊異問南人說苗乃是由跋陶注云虎掌極似半夏注由跋乃說為尾於此注中似說由跋二事混淆陶終不識

禹錫等按蜀本云熟可以下痰又圖經云苗一莖莖端三葉有二根相重上小下大五月採則虛小八月採則實大採得當以

灰裹二日湯洗暴乾之藥性論云半夏使忘羊血海藻飴糖茶胡為之使有大毒湯淋十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰涎開胃健

脾止嘔吐去胃中痰滿下脚氣主欬結新生磨塗癰腫不消能除癰瘰氣虛如有痰氣加而用之日華子云味齋辛治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧

圖經曰半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端出三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者葉似芍藥

葉根下相重生上大小皮黃肉白五月八月內採根以灰裹二日湯洗暴乾一云五月採者虛小八月採者實大然以圓白

陳久者為佳其平澤生者甚小名羊眼半夏又由跋絕類半夏而苗高近一二尺許根如雞卵大多生林下或云即虎掌之小者足以相亂半夏主胃冷嘔噦方藥之最

要張仲景治反胃嘔吐大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之二百四十遍煮取三升半溫服一升

日再亦治膈間支飲又主嘔吐穀不得下眩悸半夏加茯苓湯半夏一升生薑半觔

茯苓三兩切以水七升煎取一升溫服之
又主心下悸半夏麻黃圓二物等分末蜜
丸大如小豆每服三九日三服其餘主寒
厥赤丸四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒方
用半夏一升洗去滑焙乾搗末小麥麩一

升合和以水漉令熟和如彈丸以水煮令
麩熟則藥成初吞四五枚日二稍稍增至
十五枚旋黃旋服覺疾減欲更重合亦佳
禁食錫與羊肉

雷公云凡使勿誤用傍籖子真似半夏只
是咬著微酸不入藥用若修事半夏四兩
白芥子末二兩頭醋六兩二味攪令濁將
半夏投於中洗三遍用之半夏上有隙涎
若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

聖惠方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩
浸洗七遍去滑生薑一兩同剉碎以水一
大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫
服○又方治蝎癩五孔皆通半夏一分為
末以水調傳之

經驗後方正胃半夏二兩天兩星二兩右

以為末用水五升入壘子內與藥攪勻浸
一宿去清水焙乾重研令細每服水二盞
藥末二錢薑三片同煎至六分溫服至五
服効

斗門方治胃膈壅滯去痰開胃用半夏淨
洗焙乾搗羅為末以生薑自然汁和為餅
子用濕紙裹於慢火煨令香熟水兩盞用
餅子一塊如彈丸大入盞半錢煎取一盞
溫服能去胃膈壅逆大壓痰毒及治酒食
所傷其功極驗

簡要濟眾治久積冷不下食嘔吐不止冷
在胃中半夏五兩洗過為末每服三錢白
麩一兩以水和搜切作碁子水煮麩熟為
度用生薑醋和調服之

古今錄驗治喉痺半夏末方寸匕雞子一
枚頭開竅子去內黃白盛淳苦酒令小滿
內半夏末著中攪和雞子內以鏤子坐之
於炭上煎藥成置盃中稍暖嚥之
錢相公篋中方治蝎螫人取半夏以水研
塗之立止

梅師方治傷寒病嘔不止半夏熟洗乾末
之生薑湯服一錢七

子母秘錄治小兒腹脹半夏少許洗搗末
酒和丸如粟米大每服二九生薑湯吞下
不差加之日再服又若以火炮之為末貼
臍亦佳○又方治五絕一曰自縊二曰墻
壓三曰溺水四曰壓魘五曰產乳凡五絕
皆以半夏一兩搗篩為末丸如大豆內鼻
孔中即愈此是扁鵲法

御藥院治膈壅風痰半夏不計多少酸漿
浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中煎乾
搗為末漿水搜餅子日中乾之再為末每
入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸雞頭
大紗袋盛通風處陰乾每丸以好茶或
薄荷湯下

紫虛元君南嶽夫人內傳治卒死半夏末
如大豆許吹入鼻中
衍義曰半夏今人知去痰不言益脾蓋能
分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能
制水經曰水勝則瀉一男子夜數如廁或

教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升瓷瓶中慢火燒為熟水時時呷數日已

虎掌

江 州



廣 州



虎掌 味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及宛句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草○陶隱居云近道亦有形似半夏但皆大四邊有子如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不用也

唐本注云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫為腋切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有此名其由跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙爾陶云虎掌似半夏即由來以由跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由跋為半夏也禹錫等按蜀本圖經曰其莖端有八九葉花生莖間根周圍有牙然若獸掌也吳氏云虎掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採藥性論云虎掌使味甘不入湯服能治風眩目轉主疝瘕腸痛主傷寒時疾強陰圖經曰虎掌生漢中山谷及宛句今河北州郡亦有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓如寸大者如雞卵周回生圓牙二三枚或五六枚三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙最莖作房傍開

一口上下失中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之或再火炮合冀州人菜園種之亦呼為天南星江州有一種草葉如大掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三五葉如一本冬青治心痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

跋 主毒腫結熱

陶隱居云本出始興今都下亦種之狀如烏髮而布地花紫色根似附子苦酒磨塗腫亦効不入餘藥唐本注云由跋根尋陶所注乃是為尾根即為頭也由跋今南人以為半夏頭爾非越非惟不識半夏亦不知由跋與為尾今按陳藏器本草云半夏高三尺生澤中熱地根如小指正負所謂羊眼半夏也由跋苗高一二尺似苜蓿根如雞卵生林下所謂由跋也

禹錫等按蜀本圖經云春抽一莖莖端直八九葉根圓扁而肉白也

圖經曰文具半夏條下

烏園味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲瘰癧眩殺鬼魅一名

烏園生九疑山谷五月採

二十四

陶隱居云方家云是射干苗無鳶尾之名

主療亦異當別一種物方亦有用鳶尾者

即應是其根癭體相似而本草不顯之

唐本注云此草葉似射干而闊短不抽長

莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小

毒嚼之或人咽喉與射干全別人家亦種

所在有之射干花紅抽莖長根黃有曰今

陶云由政正說為尾根莖

禹錫等按蜀本云此草名鳶尾根名鳶頭

亦謂鳶尾根○又圖經葉似射干布地生黑

根似高良薑而節大數箇相連今所在皆

有九月十月採根日乾

陳藏器云鳶尾主飛尸游蠱著喉中氣欲


絕者以根削去皮內喉中摩病處令血出

為佳

大黃

蜀

州



大黃

味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒

熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣

除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹

小腹諸老血留結一名黃良生河西山谷及

隴西

二月八月採根火乾

得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚患怒心

下悸氣得消石紫石英桃人療女子血閉

黃芩為之使無所畏

陶隱居云今採益州北部汶山及西山者

雖非河西隴西好者猶作紫地錦色味甚

苦澀色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾

亦有火乾者皮小焦而耐蛀堪久此藥至

勁利者便不中服最為俗方所重道家

時用以去痰疾爾非養性所須也將軍之

號當取其驗快矣

唐本注云大毒性濕潤而易壞蛙火也易

佳二月八月日不烈恐不時燥即不堪矣

葉子莖並似羊蹄但羸長而厚其根細者

亦似宿羊蹄大者乃如椀長二尺作時燒

石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥乃

繩穿眼之至乾為佳幽并已北漸細氣力

不如蜀中者今出宕州涼州羌蜀地皆有

其莖味酸堪生啖亦以解熱多食不利人

陶稱蜀地者不及隴西誤矣

今按陳藏器本草云大黃用之當分別其

力若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似

牛舌片緊硬者若取瀉淺駛快推陳去熱

當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得

一藥用之

禹錫等按蜀本云葉似菟絲根如大半傍

生細根如牛芎小者亦似羊蹄又云圖經

云高六七尺莖脆

藥性論云蜀大黃使去寒熱忌冷水味苦甘消食鍊五藏通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱蝕膿破留血

日華子云宣通一切氣調血脉利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調瘧瘴熱疾利大小便并傳一切瘡癰癰毒廓州馬蹄峽中者次之

圖經曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳。其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似苳麻大者如扇根如芋大者如椀長一二尺傍生細根如牛蒡小者如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃一月開黃花結細實又鼎州一種羊蹄大黃療疥癩又甚効初生苗葉如羊蹄累年長大即葉似商陸而狹尖四月內於押條上生穗五七莖相合

花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼為金蕎麥三月採苗五月收實並陰乾九月採根破之亦有錦文日乾之亦呼為土大黃凡收大黃之法蘇恭云作時燒石使熱橫寸截著石上燻之一日微燥乃繩穿眼之至乾今土大黃往往作橫片曾經火燻蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其効最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多又有三物備急負司空裴秀為散用療心腹諸疾卒暴百病其方用大黃乾薑巴豆各一兩須精好者搗篩蜜和更搗一千杵圓如小豆服三圓老小斟量之為散不及圓也若中惡客忤心腹脹卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以煖水若酒服之若不下捧頭起灌令下喉須臾差未知更與三九腹當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須拆齒灌之藥入喉即差崔知悌療小兒無辜閃癖癩癩或頭乾黃聾或乍痢乍差諸狀

多者皆大黃煎主之大黃九兩錦文新實者若微栝即不中用削去蒼皮乃秤搗篩為散以上好米醋三升和之置銅椀中於大鑪中浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木瓦攪藥候任丸乃停於小窰器中貯兒年三歲五一服七圓如梧桐子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍加圓下膿若多者圓又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母亦同忌法崔元亮海上方治腰脚冷風氣以大黃二大片切如碁子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦則無力搗篩為末每日空腹以水大三合入生薑兩片如錢煎十餘沸去薑取大黃末兩錢別置椀子中以薑湯調之空腹頓服如有餘薑湯徐徐呷之令盡當下冷膿及惡物等病即差止古人用藥毒攻病必隨人之虛實而處置非一切而用也姚僧坦初仕梁武帝因發熱欲服大黃僧坦曰大

黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝勿從
幾至委頓元帝常有腹疾諸醫咸謂宜
用平藥可漸宜通僧坦曰脉洪而實此有
宿妨非用大黃无差理帝從而遂愈以此
言之今醫用一毒藥而攻衆病以偶中病
便謂此方之神奇其差誤乃不言用藥之
失如此者衆矣可不戒哉

唐本注云葉似篔簹根如大芋傍生細根
如牛蒡圖經云高六七尺莖脆味酸醒酒
雷公云凡使細剉内文如水旋班緊重剉

蒸從已至未熟乾又灑騰水蒸從未至亥
如此蒸七度熟乾却灑薄蜜水再蒸一伏
時其大黃摩如烏膏樣於日中熟乾用之
為妙

聖惠方治時氣發腕豆瘡用川大黃半兩
微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二
服○又方熱病狂語及諸黃用川大黃五
兩剉炒微赤搗為散用臘月雪水五升煎
如膏每服不計時候冷水調下半匙
外臺秘要療癰方大黃十兩杵篩醋三升

和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服
三十圓生薑湯吞下以利為度小者減之
千金方治產後惡血衝心或胎衣不下腹
中血塊等用錦紋大黃一兩杵羅為末用
頭醋半升同熬成膏圓如梧桐子大患者
用温醋七分蓋化五圓服之良久下亦治
馬隆内損

千金翼治婦人血癖痛大黃三兩搗篩以
酒二升煮十沸頓服
經驗後方治風熱踈積熱風瘰消食化氣

導血大解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半
生半熟為末鍊蜜圓如梧桐子大每服茶
下一十圓如要微動喫十五圓冬月中最
宜服並不搜攪人

梅師方治卒外腎偏腫疼痛大黃末醋和
塗之乾即易之
斗門方治腰痛用大黃半兩更入生薑半
兩同切如小豆大於鑊内炒令黃色投水
兩椀至五更初頓服天明取下腰間惡血
物用盆器盛如雞肝樣即止

簡要濟衆治吐血川大黃一兩搗羅為散
每服一錢以生地黃汁一合水半盞煎三
五沸无時服
廣利方治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以
童子小便五大合煎取四合去滓空心分
為二服如人行四五里再服

傷寒類要療急黃病大黃麤切二兩水三
升半漬一宿平旦煎絞汁二升半内芒消
二兩絞服須臾當快利
姚和衆治小兒腦熱常閉目大黃一分磨


剉以水三合浸一宿一歲兒每日與半合
服餘者塗頂上乾即再塗
別說云謹按大黃收時皆以火燒石罏乾
欲速貨賣更無生者用之不須更多炮炙
少蒸煮之類也

衍義曰大黃損益前書已具仲景治心氣
不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連
或曰心氣不足矣而不用補心湯更用瀉
心湯答曰若心氣獨不足則不當須吐衄
也此乃邪熱因不足以客之故吐衄以苦

泄其熱就以若補其心蓋兩全之有是證者用之無不効量虛實用之

葶藶

成德軍



丹州



曹州



葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏

留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痹音沸痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名葶音典蒿一名大室一名大適生葶城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮為之使惡蠱蠶石龍芮

陶隱居云出彭城者最勝今道亦有毋則公薺子細黃至若用之當熬○今按此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除胃中痰飲○禹錫等按蜀本云苗似薺芎香末生高二三寸花黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性論云葶藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止嗽○爾雅云葶葶藶注實葉甘似芥一名狗薺○日華子云利小腸通水氣虛腫

圖經西葶藶生葶城平澤及田野今京東陝西北州郡皆有之曹州者本勝初春生苗葉六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃結角子偏小如黍米微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆云靡草葶藶之屬

是也至夏則枯死故比時採之張仲景治肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃色搗末為圓大如彈子每服用大棗二十枚水三升煎之取二升然後內一彈丸更煎取一升頓服之支飲不得息亦主之崔知悌方療上氣嗽長引氣不得卧或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之葶藶子三升微火熬搗篩為散以清酒五升漬之冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬日夜二夜二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單莖向上葉端出角角麤且短又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別前件二種也又篋中方治嗽合膏丸曹州葶藶子一兩帛

觀熬令黑知母一兩貝母一兩三物同搗篩以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同入藥中和為丸大如脾丸每服以新綿裹一丸舍之徐徐嚙津甚者不過三丸今醫亦多用雷公云凡使勿用赤鬚子真相似葶藶

子只是味微甘苦葶藶子入項苦凡使以糯米相合於焙上微微焙待米熟去米單搗用

聖惠方治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔帛炒令紫色搗令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三四服

外臺秘要治食飲不得息葶藶子三兩熬令黃搗為末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

千金方治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升然以酒五升浸七日日服三合
千金翼治頭風搗葶藶子以湯淋取汁洗頭止

經驗方河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令如泥即下漢防已末四兩取綠頭鴨就口中截頭瀝血於口中血盡和鴨頭更搗五千下圓如梧桐子甚者空腹白湯下十圓稍可五圓頗服五

日止此藥利小便有効如神

梅師方治遍身腫浮小便澁葶藶子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗內葶藶於棗汁煎丸如梧桐子飲下十圓○又方治肺壅氣喘急不得卧葶藶子

三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服

簡要濟衆治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁葶藶子半兩微炒搗如泥以棗肉和搗為圓如菽豆大每服五圓棗湯下空心晚下量兒大小加減服之

續十全方治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即搗萬杵若圓得如梧桐子不須蜜和一服五圓漸加至七圓以得微利即佳不可多服令人不甚美食若氣發服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患水腫惟服此得差

傷寒類要治腎痺唇乾以葶藶主之

子毋秘錄治小兒白禿葶藶搗末以湯洗訖塗上

姚和衆治孩兒蛔虫葶藶子一分生為末用以水三合煎取一合一日服盡


聖惠又方治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔帛炒令紫色搗如膏每服圓如彈子大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服

衍義曰葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也然既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明藥性論所說盡矣但不當言味酸

桔梗



成



解



州

桔梗味辛苦微温有小毒主胃脅痛如刀刺
 腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血
 氣除寒熱風痺温中消穀療喉咽痛下蠱毒
 一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一
 名薺芫生嵩高山谷及寬甸二月採根暴乾
 節皮為之使得牡蠣速志療毒怒得消石
 石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽
 陶隱居云近道處處有葉名隱忍二三月
 生可煮食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此
 乃名薺芫今別有薺芫能解藥毒所謂亂

人參者便是非此桔梗而葉甚相似但薺
 芫葉下光明滑澤無毛為異葉生又不如
 人參相對者爾

唐本注云人參苗似五加開短莖圓有三
 四極極頭有五葉陶引薺芫亂人參誤矣

且薺芫桔梗又有葉差互者亦有葉三四
 對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心
 無心為別爾

無心為別爾

禹錫等按藥性論云桔梗臣味苦平無毒
 能下痢破血去積氣消積聚痰涎主肺氣

氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚

痲

日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹
 痛補五勞養氣除邪辟瘟補虛消痰破癥

瘕養血排膿補內漏及喉痺瘰癧毒以白粥

解之

圖經曰桔梗生嵩高山谷及寬甸今在處

有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺
 餘葉似杏葉而長脣四葉相對而生嫩時

亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子

也秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名

隱忍其根有心無心者乃薺芫也而薺芫

亦能解毒二物頗相亂但薺芫葉下光澤

無毛為異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖

細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用

之古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝

夜出血石餘四藏皆損惟心未毀或鼻破

待死者取桔梗搗屑以酒服方寸七日三

不能下藥以物校口開灌之心中當煩須

臾自定服七日止當食豬肝膽以補之神

良集驗方療胃中滿而振寒脉數咽燥不

渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥

是肺癰治之以桔梗甘草各二兩炙以水

三升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差

也

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只

是腥澁不堪凡使去頭上尖硬二三二分已

來并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合

水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事

四兩用生百合五分搗作膏投於水中浸

聖惠方治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭剉以水三大盞煎至一盞去滓不計時分溫三服○又方姪娘中惡心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一中盞入生薑三片煎至六分去滓非時溫服

外臺秘要治卒客忤停尸不能言者燒桔梗一兩末米飲服仍吞麝香如豆大許佳千金方治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煮取一升頓服○又方鼻衄方桔梗為末水服方寸七日四五亦止吐下血

百一方若被打擊瘀血在腸內久不消時發動者取桔梗末熟水下刀圭
經驗後方治骨曹風牙疼腫桔梗為末棗穰和圓如皂子大綿裹咬之腫則荆芥湯漱之

簡要濟眾治痰嗽不定喘急桔梗一兩半搗羅為散用童子小便半升煎取四合去滓溫服

子母秘錄治小兒卒客忤死燒桔梗末三錢七飲服○杜壬治上焦有熱口舌咽中

生瘡嗽有膿血桔梗一兩甘草二兩右為末每服二錢水一盞煎六分去滓溫服食後細呷之亦治肺壅

梅師方治卒盡毒下血如鴉肝晝夜不絕藏腑敗壞桔梗搗汁服七合佳

衍義曰桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云俗方用此乃名薺芫今別薺芫所謂亂人參者便是非此桔梗也唐本注云陶引薺芫亂人參謬矣今詳之非也隱居所言其意止以根言之所以言亂人參唐本注却以苗難之乃本注誤矣

莨菪



子味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼瘵癲狂風癩顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志

益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子

陶隱居云今處處有子形頗似五味核而極小惟入瘵顛狂方用尋此乃不可多食過劑爾久服自無嫌通神健行足為大益

而仙經不見用今方家多作狼唐○今按陳藏器本草云莨菪子主瘡癰安心定志聰明耳目除邪逐風變白性溫不寒取子暴乾隔日空腹水下一指捻勿令子破破即令人發狂亦用小便浸之令吸小便盡曝乾依前服之

禹錫等按蜀本圖經云葉似玉不留行菘藍等莖葉有細毛花白子殼作罌子形實扁細若粟米許青黃色所在皆有六月七月採子日乾

藥性論云莨菪亦可單用味苦辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾針狂亂熟炒止冷瀉主齒痛蚰牙孔子咬之虫出石灰清煮一伏時搗出去牙暴乾以附子乾薑陳楠皮桂心厚朴為圓去一切冷氣積年氣痢

甚溫暖熱發用菘豆汁解之焦炒碾細末
治下部脫肛

日華子云溫有毒甘草升麻犀角並能解
之燒熏艸牙及洗陰汗

圖經曰菘若子生海濱川谷及雍州今處

處有之苗莖高三三尺許葉似池黃王不

留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗

夾莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如

小石榴房中子至細青白如米粒一名天

仙子五月採子陰乾謹按本經云菘若性

寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄

川王美人懷子而不乳意飲以菘若藥一

撮以酒飲之旋乳且不乳豈熱藥所治又

古方王卒癩狂又多單用菘若不知果性

寒邪小品載治癩狂方云取菘若三升作

末酒一升漬數日出搗之以向汁和絞去

滓湯上煎令可圓服如小豆三圓日三當

覺口面急頭中有蟲行額及足手有赤色

處如此便是差候未知再服取盡神良又

篋中方主腸風菘若煎取菘若實一升治

之暴乾搗篩生薑半觔取汁二物相和銀

鍋中更以無灰酒二升投之上火煎令如

稠錫即旋投酒度用酒可及五升以來即

止煎令可圓如梧子每旦酒飲通下三圓

增至五七圓止若圓時粘手則菘絲粉視

隔煎熱切戒火緊則藥易焦而失力矣初

服微熱勿恠疾甚者服過三日當下利疾

去利亦止絕有效

雷公云凡使勿令使蒼實子其形相似只

是服無効時人多用雜之其蒼實子色微

赤若修事十兩以頭醋一盞煮盡醋為度

別用黃牛乳汁果即是菘若子大毒熬乾

別搗重篩用勿誤服衛人心大煩悶眼生

暈火

別說云謹按菘若之功未見如所說而其


毒有甚實一二日而牙方生用者宜審之

草蒿

草蒿



草蒿



味若寒無毒王亦瘡疥惡瘡殺蟲留
熱在骨節間明目一名青蒿一名方漬生華
陰川澤

陶隱居云處處有之即今青蒿人亦取雜
香菜食之

唐本注云此蒿生接傳金瘡大止血生肉
止痛良也○今按陳藏器本草云草蒿

主鬼氣尸疰復連婦人血氣腹內滿及冷
熱久痢秋冬用子春夏用苗並搗絞汁服

亦暴乾為末小便中服如覺冷用酒煮又
燒為灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉

蟹子
禹錫等按蜀本圖經云葉似茵陳蒿而背

不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼為犴蒿為其臭似犴北人呼為青蒿爾雅云蒿故釋曰蒿一名故詩小雅云食野之蒿陸機云青蒿也荆豫之間汝南汝陰皆云故孫炎云荆楚之間謂蒿為故郭云今人呼青蒿香中炙啖者為故是也

日華子云青蒿補中益氣輕身補虛駐顏色長毛髮髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傳之瀉痢飯飲調末五錢七燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用○又

云子味甘冷無毒明目開胃炒用治勞壯健人小便浸之治惡瘡疥癬風癩殺蠱煎洗○又云臭蒿子涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒又名草蒿

圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高三五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者灸作飲香尤佳青蒿亦名方漬凡使子勿使葉使根

勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱勞為最古方多單用者葛氏治金刃所傷取青蒿搗傳上以帛裹創血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小便五大斗澄過青蒿五斗八九

月採帶子者最好細剉一物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗令乾再瀉汁安釜中以微火煎可取二大斗即取猪膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器盛每欲服時取甘草二三兩熟

炙搗末以煎和搗一千杵為圓空腹粥飲下二十圓漸增至三十圓止
雷公云凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用七歲兒

七箇溺浸七日七夜後漉出熱乾用之食療云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目熱風毒搗傳瘡上止血生肉最早春便生色白者是自然香醋淹為菹益人治骨蒸以小便漬一兩宿乾末為圓甚去

熱勞又鬼氣取子為末酒服之方寸七差燒灰淋汁和石灰煎治惡瘡癩癧

百一方治蜂螫人嚼青蒿傳瘡上即差斗門方治丈夫勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏圓如梧桐子大空心臨卧以溫酒吞下二十圓

衍義曰草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以為蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青色者

陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩窠迥然青色土人謂之為香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青故氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青

旋覆花

隨州



旋覆花

味鹹甘溫微冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下氣消胃上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵音職利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一名威椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成

陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋菑根出河南來北國亦有形似芎藭惟合旋菑膏用之餘無所入非此復花根也

唐本注云旋覆根在中品陶云苗似薑根似高良薑而細此是山薑證不是旋覆根今復道從北國來似芎藭芎藭與高良薑

全無髣髴爾

禹錫等按蜀本圖經云旋覆花葉似水蘇花黃如菊今所在皆有六月至九月採花藥性論云旋覆花使味甘無毒主助膈氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開

胃止嘔逆不下食○爾雅云覆盜庚注旋覆似菊蔬復一名盜庚也○蕭炳云旋覆用花菑旋用根

日華子云無毒明目治頭風通血脉葉止金瘡血

圖經曰旋覆花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍大如紅藍而無刺長一二尺已來葉似柳莖細六月開花似菊花銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七月八月採花暴乾二十日成今

近都人家園圃所蔭金錢花花葉並如上說極易繁感恐即旋覆也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋覆代赭湯雜治婦人有三物旋覆湯胡洽有除痰飲在兩脇脹滿等疾旋覆花園用之者尤多也

雷公云凡採得後去裏花葉殼皮并蒂子取花葉蒸從已至午煦乾用

外臺秘要救急續斷筋法取旋覆花草根淨洗土搗量瘡大小傳之日一二易以差

為度○又方破斫筋斷者以旋覆根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十五日即斷筋便續此方出孫景仲家療奴用効

經驗後方治中風及壅滯以旋覆花洗塵令淨搗末煉蜜圓如梧桐子大夜卧以茶湯下五圓至七圓十圓

梅師方治金瘡止血搗旋覆花苗傳瘡即止

衍義曰旋覆花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過如菊行痰水去頭目風其味甘苦辛亦走散之藥也其旋花四月五月有花別一種非此花也第八卷已具之

圖經衍義本草卷之十六