

黃芩當歸甘草各半兩

治小兒傷寒發黃方

搗土瓜根汁三合服之

又方搗韭根汁澄清取如大豆許滴見鼻中

即出黃水瘰

又方搗青麥汁服之

又方

小豆三枚 瓜蒂十四枚 糯米四升

右三味為末吹入鼻中

二物通汗散治少小有熱不汗方

粉斤半 雷丸兩四

右搗為細末和下篩以粉兒身

二物茯苓粉散治少小頭汗方

茯苓兩 牡蠣各四兩

右治下篩以粉八兩合搗為散有熱輒取

粉汗即自止

三物黃連粉散治少小盜汗方

黃連兩 牡蠣兩 貝母各八錢

右以粉一升合搗下篩取粉兒身佳

犀角飲子此由心臟熱之所感宜服此方

犀角八錢 茯苓兩 麥門冬半兩

甘草兩半 白朮六錢

右五味咀咀以水九合煎取四合分服加

龍齒一兩佳

恒山湯治小兒溫瘧方

恒山兩切一 小麥二合 淡竹葉升切一

右三味以水一升半煮取五合一日至七

日兒一合為三服八日至十五日兒一合

半為三服十六日至二十日兒二合為三

服四十日至六十日兒六合為三服六十

日至百日兒一服二合半百日至二百日

兒一服三合

又方鹿角末臨發時先服一錢七

又方燒龍甲及以酒服一錢七至發時服三

七并以火炙身

又方燒雞臍腔中黃皮為末和乳與服男雄

女雌

又方炙兩乳下一指三壯

孫真人備急千金要方卷之十一

孫真人備急千金要方卷之十二

六

宋朝奉郎中大夫少師充翰林院學士等校正

少小嬰孺方

救嗽第六方

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小

瘡復發五月中忽小小救嗽微溫治之因

變癩一日二十過發四肢縮動背脊狀跳眼

反須更氣絕良久復蘇已與常治癩湯得快

吐下經日不問爾後單與竹瀝汁稍進一日

一夕中合進一升許發時小疎明日與此竹

瀝湯得吐下發便大折其間猶稍與竹瀝

汁

竹瀝湯方

竹瀝五合 黃芩三錢 木防已一

羚羊角一 白朮各六錢

大黃二兩 茵芋三錢 麻黃一

白薇一 桑寄生一 草薢一

甘草各半兩

右十二味咀咀以水二升半煮取藥減半

內竹瀝煎取一升分服二合相去一食久

進一服一方無

紫苑湯治小兒中冷及傷寒暴咳或上氣咽
喉鳴氣逆或鼻塞清水出方

紫苑 杏仁 黃芩
當歸 甘草 橘皮

青木香 麻黃 桂心各六

大黃兩一

右十味以水三升煮取九合去滓六
十日至百日兒一服二合半一百日至二
百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青
喘迫欬晝夜不息食則吐不下方

五味子 當歸各半 麻黃
乾薑 桂心 人參

紫苑 甘草各六 細辛

救冬花各二分 大黃一分 白朮
右十二味以水二升半煮取九合去
滓兒六十日至百日一服二合半一百日
至二百日一服三合其大黃別浸一宿下

一方無救冬花大
黃有大棗三枚

治小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾
嗽出臭膿方

燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日
五服大人一升亦日五服不妨食息乳
哺

治小兒寒熱欬逆胸中有癖乳若吐不欲食
方

乾地黃兩四 麥門冬 五味子
蜜各半 大黃洪百 消石各一

右六味以水三升煮取一升去滓內

消石蜜煮令沸服二合日三宵中當有宿
乳汁一升許出大者服五合

射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干 麻黃 紫苑
甘草 生薑各一 半夏五

桂心五分 大棗二十

右八味以水七升煮取一升五合去
滓內蜜五合煎一沸分溫服二合日三

又方半夏兩四 紫苑 桂心
生薑 細辛 阿膠

甘草各二 救冬花各一分 蜜一分
右九味以水一斗煮半夏取六升去
滓內諸藥煮取二升五合五歲兒服一升
二歲服六合量大小多少加減之服之立
効

杏仁圓治大人小兒欬逆上氣方

杏仁三升熱搗如膏蜜一升為三分以
一分內杏仁搗令強更內一分搗之如
膏又內一分搗熱止先食已含咽之多
少自在日三每服不得過半方寸七則
利

又方

半夏二升 去皮何水 白礬一斤
丁香 甘草 葶豆蔻
川外麻 縮砂各四兩

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸
春冬三七日夏秋七日密封口日足取出
用冷水急洗風吹乾每服一粒嚼破用薑
湯下或乾喫候六十日乾方得服非尋
常方
八味生薑煎治小兒方

生薑兩七

乾薑兩四 桂心兩二

甘草

款冬花各三 紫苑各三

杏仁

蜜各一

右合諸藥為末微火上煎取如飴餉量其大小多少與兒含咽之百日小兒如棗核

許日四五服甚有驗

四物款圓治小兒嗽晝夜甚初不得息不能復喘方

款冬花

紫苑各一 桂心兩半

伏龍肝兩六

右為末蜜和如泥取如棗核大傳乳頭令兒飲之日三傳之漸漸令兒飲之

菖蒲圓治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂莢各六

款冬花

乾薑

桂心

紫苑各十

蜀椒各五

吳茱萸各六

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十九日三兒小以意減之兒大

以意加之暴嗽數服便瘥

桂枝湯治少小十日已上至五十日卒得聲

款吐乳嘔逆暴數晝夜不得息方

桂枝兩半

甘草兩二 紫苑兩八

麥門冬兩一

右四味以水二升煮取升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節

乳哺

麻黃湯治少小辛肩息上氣不得安此惡風入肺方

麻黃兩四

甘草兩一 桂心兩五

五味子兩半

半夏兩半 生薑兩二

右六味以水五升煮取二升百日兒服一合大小節度服之便愈

癖結脹滿第七方 變法 霍亂附

雙紫圓治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥更可重服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼

不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數

用神驗千金不傳方亞德等詳序列中凡云服紫丸者即前變蒸為

中四味者是也云服紫丸不下者服赤丸赤丸差味病重者當用之方中並無赤丸而此用朱砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也

巴豆

麩核仁各十 麥門冬兩十

甘草兩五

甘遂

朱砂各二

牡蠣

蠟各八

右八味以湯熱洗巴豆研新布絞去油別擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研麩核人令極熟乃內散更擣二千杵藥燥不能

相丸更入少蜜足之半歲兒服如梧子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二九五歲者服如大麻子二九七歲八歲服如小豆二九九歲十歲微大於小豆二九常以雞鳴時服至日出

時不下者熱粥飲數合即下丸皆雙出也下甚者飲以冷粥即止

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁不起兒乳哺不為肌膚心腹痛滿黃瘦瘠四肢痿躄緣疾服之可令充悅方

芍藥

柴胡各二 大黃

人參各一

乾薑如熱以甘草各半

龍甲

茯苓各一

右八味為末蜜丸如大豆服一九一歲已

上乳服三九七歲兒服十九日二

牛黃圓治小兒宿乳不消腹痛驚啼方

牛黃各一

附子二枚 真珠

巴豆

杏仁各一

右五味搗附子真朱為末下篩別搗巴豆

杏仁今如泥內藥及牛黃搗一千二百杵

藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米

一九三歲兒服如麻子一九五六歲兒服

如胡豆一九日二先乳哺了服之隔上下

悉當微轉藥完出者病愈散出者更服以

藥完出為度

芒消芽圓治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱

不欲食消瘦方

磁硝

大黃各四 半夏

甘遂各二

代赭兩

巴豆二百

杏仁十枝

右七味為末別搗巴豆杏仁治如膏旋內

藥末搗三千杵令相和合強者內少蜜百

日兒服如胡豆一九過百日至一歲服二

九隨兒大小以意節度當候兒大便中藥

出為愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

芍藥

枳實 知母

大黃各三

柴胡二兩 外麻

黃連

黃芩各二 竹葉切半

桔梗兩

細辛十五

右十一味以水六升煮取一升八合

去滓分四服十歲兒為三服一本有枳實

杏仁各一兩半而桔梗黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃

柴胡 黃芩各三

枳實一兩 外麻

知母 枳子各二 生薑十八

杏仁二 竹葉切半

右十一味以水六升半煮取二升十

歲至十五者分三服

牛黃雙圓治小兒結實乳食不消心腹痛方

牛黃

太山甘遂各半

真珠各一

杏仁 芍藥

黃芩各一 巴豆十八

右七味為末蜜丸一歲兒飲服如麻子二

九但隨兒大小加減之

牛黃雙圓治小兒結實壯熱食不消化中

惡忤氣方

牛黃

厚朴 茯苓

桂心

芍藥 乾薑各半

薤甲

麥麩 柴胡

大黃

枳實 芍藥各一

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服以

意量之

芫花圓治小兒心下痞癥癖結聚腹大脹滿

身體壯熱不欲哺乳方

芫花

黃芩各一 大黃

雄黃各二

右四味為末蜜和更搗一千杵三歲兒至

一歲已下服如粟米一九欲服丸內兒候

中今毋與乳若長服消病者當以意消息
與服之與乳哺相避

真珠圓治小兒痰實結聚宿癖蠱露不能飲
食方

真珠兩半 麥門冬兩一 麩仁二百

巴豆四十分

右四味為末蜜丸蒜歲兒服二丸如小豆
大二百日兒服如麻子二丸漸增以知為
度當下病赤黃白黑葵汁下勿絕藥病盡
下自止久服使小兒肥白已試驗

蠶甲圓治少小腹中結堅脅下有疹手足煩
熱方

蠶甲 芍藥 大黃各三
茯苓 柴胡 乾薑各二
桂心六 麩蟲 蟾蜍各二

右九味為末蜜和服如梧子七丸漸漸加
之以知為度

蠶頭圓治小兒痞氣脅下腹中有積聚堅痛
方

蠶頭一枚 皮兩半 麩蟲

麩蟲 桃仁各十

右五味為末蜜丸服如小豆二九日三大
便不利加大黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦慢懶宜常服不妨乳方

甘草五兩為末蜜丸一歲兒服如小豆
十九日三服盡即更合

桂心橘皮湯治小兒五六日不食氣逆方

桂心 人參各半 橘皮三

黍米五 成擇五

右五味以水七升先煮黍煎取二升
次下薤米末熟藥成稍服之

地黃圓治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

乾地黃 大黃各一兩 茯苓十八
當歸 柴胡 杏仁各半

右六味為末以蜜丸如麻子大服五九日
三

馬通粟圓治少小脅下有氣內痛喘逆氣息
難往來寒熱羸瘦不食方

馬通中粟十八 杏仁 紫苑
細辛兩半 五味子 石膏

秦朮 半夏 茯苓各六

右九味為末蜜丸服如小豆十九日三不
知加至二十九

治小兒下痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取
一升分三服

又方

腹上摩衣中白魚亦治陰腫

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方

韭根汁和猪脂煎細細服之

又方

車穀中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方

米粉鹽等分炒變色腹上摩之

治小兒瘳

灸兩乳下一寸各三壯

當歸圓治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青
涎下方一名

當歸

狼毒各九

吳茱萸一作

杏仁

蜀椒各半

細辛

乾薑

附子各十

巴豆枚十

鼓各七

右九味持七種下篩秤藥末令足研巴豆如膏稍稍內末持令相得蜜和桑椹蒸

五升米飯下出擣一千杵一月兒服如黍米一九日一夜二不知稍加以知為度亦

治水癖

馬齒莧圍治小兒胎寒嘔喘驚瀾腹脹不嗜

食大便青黃并大人虛冷內冷或有實不可

吐下方

馬齒莧一斤燒半日以棗膏和大人服

如梧子二九日三小兒以意減之以腹

內溫為度有實實去神妙

治小兒忽患腹痛天矯汗出名曰胎寒方

煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

半夏圍治小兒暴腹滿欲死方

半夏隨多少微火炮之擣末酒和服如

粟米粒大五九日三立愈

治小兒霍亂吐痢方

人參兩一

厚朴

甘草各半

白朮十八

右四味咬咀以水一升二合煮取半升六

十日兒服一合百日兒分三服暮歲分二

服中間隔乳服之乳母忌生冷油膩等一

方加乾薑一分或加生薑三分

養香湯治毒氣吐下腹脹逆宮乳哺方

藿香兩一

生薑兩三

青竹茹

甘草各半

右四味咬咀以水二升煮取八合每服一

合日三有熱加外麻半兩

治孩子霍亂已用立驗方

人參

藿香兩各半

藟豆藤兩二

倉米一

右四味咬咀以水二升煮取八合分溫服

又方

人參兩一

木瓜枚一

倉米一

右三味咬咀以水煮分服以意量之立效

治小兒霍亂方

研尿滓乳上服之

又方

牛涎灌口中一合

治少小吐痢方

亂髮兩一

鹿角六

右二味為末米汁服一升圭日三服

又方

熱牛尿含之一作牛膝

又方

燒猪屎水解取汁少小服之

孫真人備急千金要方卷之十二