

又方臘月猪脂四升煎大覓一枚今消盡以

生布揩拭癩處令赤塗之不過四五上

又方以熱瓦熨之

又方以凍凌熨之

治身及面上印文方

針刺字上破以醋調赤土傅之乾又易

以黑滅即止

又方以未滿月小兒屎傅上一月即沒

孫真人備急千金要方卷之二十一

孫真人備急千金要方卷之二十二 刃三

宋朝集部守太常少卿尤松閣校理林億等校正

風毒脚氣方

論風毒狀第一十六章

論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少

有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師師道人述法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不惑。熟徐王撰錄未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居

初三然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病發初得先從脚起因即胫脣時人號為腳氣深師云脚弱者即其義也深師述支法存所用永平山敷施連苑粗耀黃素等諸脚弱方凡八十餘條皆是精要然學者尋覽頗覺繁累真正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫人有五臟心肺二臟經絡所起在手十指肝腎與脾三臟經絡所起在足十趾夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中脚久而不瘥遍及四肢腹背頭項也微時不覺猶滯乃知經云次傳間傳是也

論得已便令人覺不

凡腳氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大閼經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾誤作餘病治之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微飲食嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳黃帝云緩風濕痺是也

曾不經一事未讀一方自驕了了詐作明能談說異端或言是虛或道是實或云是風或云是蠱或道是水或云是痰紛紜謬說種種不同破壞病人心意不知孰是遷延未定時不待人欵然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識病深淺採曆方書古今是事明解者看病不爾大誤人事竊悲其如此者衆故一一顯析具述病之由狀今來世病者讀之以自防備也但有一狀相應則須依方急治勿取外人言議自貽憂悔但詳方意

○人死不難莫信他言以自悞也余嘗爲人撰門冬前此方治脚氣大有驗病者須用之論脉候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脉要須不違四時者爲吉其逆四時者勿治餘如脉經所說此中不復具載其人本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟則受疾至深難愈也

論腫不腫

○凡人久患脚氣不自知別於後因有他病發動治之得瘥後直患嘔吐而復脚弱余爲診之乃告爲脚氣病者曰某平生不患脚腫何因名爲脚氣不肯服湯藥醫以爲石發狐疑之間不過一日而死故脚氣不得一向以腫爲候亦有腫者有不腫者其以小腹頑癥不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即今人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也論須慎不慎

○凡脚氣初得脚弱便速灸之并服竹瀝湯灸訖可服八風散無不瘥者惟急速治之若人但灸而不能服散服散而不灸如此者半瘥半死雖得瘥者或至一二年復更發動覺得大怒惟得食梗粱粟米皆鼓葱韭薤椒薑橘有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌皮又不得食諸生果子酸酢之食犯者皆不可瘥又大宜生牛乳生栗子

初灸風市 次灸伏兔 次灸擴鼻
次灸膝兩眼次灸三里 次灸上廉
次灸下廉 次灸絕骨

初灸風市 次灸伏兔 次灸擴鼻
次灸膝兩眼次灸三里 次灸上廉
次灸下廉 次灸絕骨

○凡脚氣痛枉死者衆畧而言之有三種一覺之傷晚二驕狠恣傲三狐疑不決此三種正當枉死之色故世間誠無良醫雖有良醫而

病人有性靈堪受人者更復渺少故雖有驥驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其爲枉橫亦猶此也今有病者有受人性依法使余治之不過十日可得永瘥矣若無受人性者亦不須爲治縱令治之恐無瘥日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法爲信者施不爲疑者說

○初灸風市 次灸伏兔 次灸擴鼻
次灸膝兩眼次灸三里 次灸上廉
次灸下廉 次灸絕骨

中央指頭解大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏免尤令病人累夫端坐以病人手夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得窟解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附胫骨外是一云在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一夫亦附胫骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附胫骨外是灸之百壯第八絕谷涌泉承山東骨等凡一十八穴舊法多灸此脚弱灸以四指爲一夫也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然

○骨兀在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸

尤灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯數爲佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絕骨各一處

中央指頭解大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏免尤令病人累夫端坐以病人手夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可

兩脚惡者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不瘥速以次灸之多多益佳一說灸絕骨最要人有患此脚弱不即治

輸及諸管關節腹背盡灸之并服八風散往

往得瘥者諸管輸節解法並在別卷中覺病入腹若病人不堪痛不能盡作大灸但灸胃

心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量

一夫之法覆手并舒四指對度四指上中節

上橫過爲一夫夫有兩種有三指爲一夫者

此脚弱灸以四指爲一夫也亦依支法存舊

法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然

○骨兀在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸尤灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯數爲佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絕骨各一處

非深相委悉慎勿爲人灸之慎之慎之凡灸八衝須小作艾炷

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脉有三品內外證候相

似但脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯若脉浮大緊轉駛宜作竹瀝湯若病人脉微

而弱宜服風引湯此人脉多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱

而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駛此是三品之中最惡脉也或沉細而

駛者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沉細者病在內治亦不異當消息

以意耳其形尚可而手脚未容至弱數日之中氣上即便命終如此之脉往往有人得之

無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要陽勢指奇一分兩足凡八尤曹氏名曰八衝極下氣有效其足十趾端名曰氣端日灸三壯並大神要其八衝可日灸七壯氣下即止病者

滿可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下可
以圓藥助湯令下後更服竹瀝湯趣令脉
勢折氣息料理便停服三十二物八風散佳
凡初得病便摩野葛膏日再頑痒脚弱都愈
乃止若服竹瀝湯脉勢折如未病時氣力轉
勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病
重者瘧後半年始能扶人行耳既覺脉及體
內瘧但當勤服八風散勿以脚未能行輕加
餘治餘治未必全得益更生諸惡失此諸治
也猥人邊亦勿行野葛膏有人聞竹瀝湯云
恐傷腰脚者即勿與治宜知此法此皆人無
受入性不可與醫故也不為疑者說此之謂
也竹瀝湯有三首輕者服前方重者以次第
服後方此風毒乃相注易病人宜將空缺服
小金牙散以少許塗鼻孔耳門病目人及新
亡人喜易人強健人宜將服之亦以塗耳鼻
乃可臨近亡人及視疾者絳囊帶一方寸七
男左女右臂上此散毒服宜從少為始金牙
散方見別卷病人惟宜飲赤小豆飲冬服側
子金牙酒續命湯治風毒病初得似時行毒

病而脉浮緩終不變此不治或數日而死
或十日而死或得便不識人或發黃或發斑
或目赤或下部穿爛者此最急得之即先服
續命湯一劑須服葛根湯麻黃湯下之若故
不折更與續命湯兩三劑必瘥此病大急常
令湯勢相接不可使半日關湯即便殺人續
命湯方見別卷

孫真人備急千金要方卷之二十三 切四

宋朝奉郎守太常少卿充翰林院校理林億等整理

風毒脚氣方

湯液第二方 裹脚方附

第一竹瀝湯治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁
腹脹起如腫接之不陷心中惡不欲食或患
冷方

竹瀝升五

葛根

甘草

秦艽

防己

細辛

麻黃

桂心

乾薑各一

防風

升麻各一

茯苓三兩

附子一枚

杏仁五十枚

右十五味㕮咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗千金翼方無茯苓杏仁有白朮一兩

第二大竹瀝湯治卒中風口噤不能言四肢
緩縱偏癱擊急風經五臟恍惚恚怒無常手
足不隨方

竹瀝一斗

獨活

芍藥

白朮

茵芋

甘草

細辛

正一天師清微宗 洪百堅 製作

道教學術資訊網

