

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分作

三服

治腎腑臟溫病身面如刺腰中欲折熱毒內

傷方

茵陳蒿

梔子

芒硝各三

苦參

生葛各四

生地黃

石膏各八兩

葱白

豉升各一

右九味㕮咀以水九升者煎二升半下炭

硝分三服

萎蕤湯治溫風之病脉陰陽俱浮汗出體重

其息必喘其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者。

則小便難發其汗者必讞語加燒針者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此疾者宜服之方

萎蕤

白薇

麻黃

獨活

杏仁

芎藭

甘草

青木香各二兩

石膏三兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服取汗若一寒一熱加朴消一分及大黃三兩下之如無木香可用麝香一分小品一小

天蠶病與百合狐惑濕風溫病鬼魅皆相類

孫真人備急千金要方卷之二十九

方云萎蕤湯治冬溫冬春月中風傷寒則發熱頭腦痛咽喉乾舌僵骨肉疼心胸痞滿腰背強亦治風溫

孫真人備急千金要方卷之三十

望

傷寒方

青膏治傷寒頭痛項強四肢煩疼方

當歸

吳茱萸

蜀椒

白芷

附子

烏頭

甘草各三兩

右八味㕮咀以醇苦酒漬之再宿以猪脂

四斤煎令藥色黃絞去滓以溫酒服裏核

大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩

如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳

黃膏治傷寒赤色頭痛項強賊風走風方

大黃

附子

細辛

乾薑

蜀椒

桂心各半兩

巴豆

一枚

右七味㕮咀以醇苦酒漬一宿以臘月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒赤色發熱酒服梧子大一枚又以火摩

身數百過兼治賊風絕良風走肌膚遊風

所在摩之神效千金不傳此趙泉方也

白膏治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚溫覆取汗摩身當千過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以鹽湯洗瘡以布拭之傅膏癰腫火炙摩千過日再自消者方

天雄

烏頭

莽草

羊躡躅各三兩

右四味㕮咀以苦酒三升漬一夕作東向露竈入作十二聚濕土各一升許大取成煎豬脂三斤著銅器中加竈上炊以葷新令釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡偏藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核一枚日三摩時令勿近目

發汗散第四方

四十一

崔文行解散治時氣不和傷寒發熱者方
右五味治下節水服方寸七日三多飲水汗出即愈

桂心十二兩

猪苓

白朮

茯苓各十兩

桔梗

細辛各四兩

白朮八兩

度瘴發汗散治傷寒赤色惡寒發熱頭痛項強體疼方
右四味治下節若中傷寒服錢五七覆取汗解若不覺復小增之以知爲度若時氣重服之或當微下利者有大黃故也

麻黃二兩

桔梗

細辛

吳茱萸

防風

白朮各一兩

烏頭

乾薑

蜀椒

六物青散治傷寒赤色亞寒方
皆酒服

附子

白朮

防風

細辛各一兩

桔梗

烏頭各三兩

右六味治下節以溫酒服五七不知稍增鼓圓若瞿氏圓如得便頭重者可以二大豆許內鼻孔中覺燥渴出一日可三四度必愈兼辟時行病

五苓散主時行熱病但狂言煩躁不安精彩之服後食頃不汗出者進溫粥一杯以發汗出止若汗大出不止者溫粉粉之微

者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹丸方出下篇
發汗九門

青散治春傷寒頭痛發熱方

苦參

厚朴

石膏各三兩

大黃

細辛各二兩

麻黃五兩

烏頭

五兩

右七味治下節覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸七投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫粉粉之良久一服不除宜重服之或當微下利者有大黃故也

詔書發汗白薇散治傷寒三日不解者方
右四味治下節若中傷寒服錢五七覆取汗解若不覺復小增之以知爲度若時氣重服之或當微下利者有大黃故也

白薇十二兩

杏仁

貝母各十兩

孫真人備急千金要方 卷三〇

右四味治下篩酒服方寸匕自覆汗出即愈	華佗赤散治傷寒頭痛身熱腰背強引頸及風口癰瘍不絕婦人產後中風寒經氣腹大	方
丹砂 <small>朱</small> 十二	蜀椒	蜀漆
乾薑	細辛	黃芩
防已	桂心	茯苓
人參	沙參	桔梗
女萎	烏頭 <small>名</small> 十 <small>朱</small> 三十	雄黃 <small>二</small> 十 <small>朱</small> 四十
吳茱萸 <small>朱</small> 三十	麻黃	代赭 <small>名</small> 二 <small>朱</small> 二十
右十八味治下篩酒服方寸匕日三耐藥者二七覆令汗出欲治瘧先發一時所服藥二七半以意消息之細辛薑桂丹砂雄黃不數餘皆斂之		
赤散治傷寒頭痛項強身熱腰脊痛往來有		

蜀椒 茴本 麻黃
黃芩 代赭 桔梗
吳茱萸各一 附子兩
右十四味治下篩先食酒服一錢七日三
鳥頭赤散治天行疫氣病方
烏頭一兩
細辛
桔梗
大黃各一
右六味治下篩清酒若井花水服一刀圭
日二不知稍增以知爲度除時氣疫病若
牛馬六畜中水行疫亦可與方寸七八人始
得病一日時服一刀圭取兩大豆許吹著。
兩鼻孔中

水解散治時行頭痛壯熱一二日方
桂心 甘草 大黃各二
麻黃四兩
正一師清酒一斗半
道學古方站

治時病表裏大熱欲死方
右四味治下篩患者以生熟湯浴訖以暖
水服方寸匕日三覆取汗或利便差丁強
人服二方寸匕迄年檢錄有黃芩芍藥各
二兩古全錄驗無甘草有
芍藥治大行熱病
瘡瘍及解肌出升
瘡瘍

大黃 寒水石 硫硝
石膏 升麻 麻黃
葛根 紫葛
右八味等分治下篩水服方寸匕日二
發汗湯第五方桂枝湯

例曰大法春夏宜發汗凡發汗欲令手足皆周至熱熱然一時間許益佳但不可令如水流離濶濶耳若病不解當更重發汗汗出多則亡陽陽虛不可重發汗也凡服湯藥發汗中病便上不必盡剝也凡云可發汗而無湯者圓散亦可用要以汗出為解然不及湯隨證良驗凡病無故自汗出復發其汗愈衛復和故也

夫脉浮者病在外可發汗宜桂枝湯

夫陽脈浮大而數者亦可發汗為宜桂枝湯夫病常自汗出者此為榮氣和榮氣和而外不解此為衛氣不和也榮行脈中衛行脈外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

夫病人腋無他病時時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和故也先其時發汗則愈宜桂

枝湯

太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故令汗

出欲抹邪風宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風寒宜桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚

朴杏人湯

太陽病外證未解者不可下宜桂枝湯

太陽病先發其汗不解而下之其脉浮者不

愈浮為在外而反下之故令不愈今脉浮故

在外當須解其表則愈宜桂枝湯

○太陽病下之氣上衝者可與桂枝湯不上衝。

不可與

凡桂枝本為解肌若脉浮緊發熱無汗者勿

與之常知此勿誤也

凡酒客勿與桂枝湯若服必嘔

初十 凡服桂枝湯吐者後必吐膿血也

桂枝湯治中風其脈陽浮而陰弱陽浮者熱

自發陰弱者汗自出濶濶惡風漸漸惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔方

桂枝

芍藥

生薑

兩三

甘草二兩

大棗十二枚

石膏如雞子生薑三兩

杏仁四十枚

大棗十二枚

杏仁四十枚

右五味㕮咀三物切薑蜜棗以水七升煮
棗令爛去滓乃內諸藥水少者益之煮令

微沸得三升去滓服一升日三小兒以意

減之初服少多使得汗出者小闊其間不

得汗者小促其間令藥勢相及汗出自護

如法特須避風病若重宜夜服若服一劑

不解病證不變者常復服之至有不肯汗

出服兩三劑乃愈服此藥食項飲熱粥以

助藥力

○麻黃湯治傷寒頭及腰痛身體骨節疼發熱。

惡寒不汗而喘方

麻黃三兩

桂心

甘草各二兩

杏仁七十枚

大棗五十枚

甘草各二兩

正一天師弟子子

道家真言

大棗十二枚

升麻

甘草

各半兩

蜀椒

雄黃

桂心各六錢

右四味㕮咀以水九升煮麻黃減二升去

沫內諸藥煮取二升半去滓服八合覆

今汗

大青龍湯治中風傷寒脉浮緊發熱惡寒身
體疼痛汗不出煩躁方

麻黃六兩

桂心

甘草各二兩

二

陰毒甘草湯治傷寒初病一二日便結成陰
毒或服藥六七日已止至十日變成陰毒身
重背強腹中絞痛咽喉不利寒熱攻心心下

無在心有蟹甲手大一斤附後典一千全月古今錄驗者施子六錢蟹甲如手一片仲景

堅強短氣不得息嘔。遇晝青面黑四肢厥冷。其脉沉細緊數仲景云此陰毒之候。身如被。打五六日可治。至七日不可治也。方

甘草

蜀椒各六

升麻各半

當歸

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服。

人行五里頃更進一服。溫覆發汗。毒當從汗出。汗出則愈。若不汗則不除。重作

○陰旦湯治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩方。

芍藥

黃芩各三

桂心四

大棗十五

右六味㕮咀以水一斗煮取五升去滓溫服一升。日三夜再服令小汗。

○陽旦湯治傷寒中風脉浮發熱往來汗出惡風頭項強鼻鳴乾嘔桂枝湯主之隨病加減如左方。

○以泉水一斗煮取四升分服一升。日三自汗者去桂枝加附子一枚。渴者去桂枝加桔梗三兩利者去芍藥桂加乾薑三

○日者方
丹砂一兩末之以水一斗煮取一升頓服之。覆取汗。

○治疫氣傷寒三日前不解者方

累附子一枚炮心下憐者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急正陽旦主之煎得二升內膠鉛半斤為再服。若脉浮緊發熱者不可與之。

六物解肌湯治陽寒發熱身體疼痛方。

葛根四

芍藥

甘草各二

桂心四

大棗十五

右六味㕮咀以水八升煮取二升分三服再服後得汗。汗通即止。

○解肌湯治傷寒溫病方。

葛根四

芍藥

甘草各二

桂心四

大棗十五

右六味㕮咀以水八升煮取二升分三服再服後得汗。汗通即止。

○葛根龍膽湯治傷寒三四日不差身體煩毒。

葛根四

芍藥

甘草各二

桂心四

大棗十五

右六味㕮咀以水一斗煮取二升飲一升

日三服。三四日不解脉浮者宜重服發汗。

○脉沉實者宜以駁豉丸下之。

○治傷寒時氣溫疫疼痛壯熱脉盛始得一二

○而熱方

葛根八

芍藥

甘草各二

桂心四

大棗十五

右十二味㕮咀以水一斗煮葛根取八升

○內鰥藥煮取三升分四服日三夜一

○治傷寒四五日頭痛壯熱四肢煩疼不得飲

○食方
桃子仁
黃連
黃藥

好豉一升

葱白半升

小男兒尿升

三

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

二升分再服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

甘草各一

杏仁三十

石膏

貝齒三枚一作貝

十八銖

右三味先藜豉葱令相得則投小便煮取

</

大黃各半 好豉一 葱白七
薑

右六味㕮咀以水八升煮上四物六七沸
內後葱白豉煮得三升頓服一升日三服
湯訖溫覆令汗出粉之得汗便止後服勿
復取汗不得汗者復服重發此藥無忌特
宜老小神良

七物黃連湯治夏月傷寒四肢煩疼發熱其
人喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令
喜煩方

○ 黃連

茯苓

黃芩
各十
八株

芍藥
各一兩

葛根
各一兩

甘草
一兩
六錢

右各㕮咀以水七升煮取三升冷分三服
不能一升者可稍稍服之湯勢安乃卧藥
主寒氣服湯之後胸中熱及咽喉痛皆差
其明日復煮一劑如法服之此湯無毒但
除熱下氣安病人小兒服者取三分之一
以水四升煮得二升稍稍服

三七湯治傷寒中風得之三日至七八日不
解胸脇痛四肢逆乾嘔水漿不下腹中宿食

不消重下血一日數十行方

○ 茯苓
如雞子大

黃芩

人參
各三兩

桂枝

黃芩

甘草
各二兩

○ 桔梗根
四兩

硝石
一錢

乾地黃
各一升

升麻

葛根

生薑
各三兩

○ 大黃
切十一

麻黃

寒水石
各半升

右九味㕮咀以水九升煮取二升七合分
升煮今三沸絞去滓服之日三溫覆汗出
即愈病劇與六七七

王香麻黃湯治傷寒忽發腫或著四肢或在
胸背虛腫浮如吹狀亦著頭面唇口頸項劇
者偏著脚脰外如軸大而不痛不赤著四肢

○ 雪煎治傷寒方

麻黃
升

大黃
一斤十二兩
金色者

桂枝
四升

杏仁
三十

升麻

葛根

生薑
各三兩

○ 薰陸香
半兩

麝香
半兩

沉香

青木香

麻黃

桂枝
各二兩

防風

獨活

秦艽

白薇

姜蕤

甘草
各二兩

枳實
各二兩

右十三味㕮咀以水九升煮取三升分三
服覆取汗後外摩防已膏

右三味㕮咀以雪水五斛四斗漬麻黃於
東向甕釜中三宿內大黃攪令調炊以桑
薪煮得二斛汁去滓復內釜中攪杏人內
汁中復炊之可餘六七斗汁絞去滓置銅
器中又以雪水三斗合煎之攪令調得二
斗四升藥成可丸冷凝丸如彈丸有病者
以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫
之立汗出若不愈者復服一丸密盛藥勿
令泄氣