

更以泉水二升煮百合取一升去滓又以

水二升煮餘二味取一升內百合汁如前

法復煎取一升半分再服

百合雞子湯治百合病已經吐之後更發者
方

右二味治下篩飲服方寸匕日三當微利
利者止勿復服熱即除一本云治百合病
小便赤澀脣下堅急

治百合病腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令黃色搗篩為

散飲服方寸匕日三滿消痛止卷三

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二
升煮取一升取雞子黃一枚內汁中攪
令調分再服

百合地黃湯治百合病始不經發汗吐下其
病如初者方

○以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二

升煮取一升內生地黃汁一升復煎取

一升半分再服大便當去惡沫為候也

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先
洗病人身洗後食白湯餅勿與鹽豉

也渴不瘥可用桔梗根并牡蠣等分為
散飲服方寸匕日三

治百合病變而發熱者方

百合根一两滑石三两

孫真人備急千金要方卷之三十四 廉

宋朝米芾太常少卿元祐閣校理林僅等校正

傷寒方

傷寒不發汗變成狐惑病第四論
方

論曰狐惑之病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉起卧不安其毒在喉咽為惑病在陰肛者為狐病狐惑之病並惡飲食不欲食聞食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食於上者則聲喝也謂一毒食下部者則乾咽也此由溫毒

氣所為食於上者渴心湯主之食於下者苦參湯淹洗之食於肛外者熏之并用雄黃三片稍置瓦餅中炭火燒向肛熏之并服湯也治狐惑湯方

黃連四两薰草四两

右二味㕮咀白醋漿一升漬一宿煮取二升分為三服

赤小豆當歸散其人脉數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日眼赤如鳩眼得之七八日其四目黃黑能食者膿已成也治之方

大黃

芩塵子兩各二

右二味為末蜜和丸如梧子大末食服十
丸日三病瘥止

又方

大黃二兩

黃連三兩

黃芩

黃芩一兩

黃連三兩

黃芩

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三
丸日三不知加至五丸

茵陳湯治黃疸身體面目盡黃方

茵陳一兩

黃連三兩

黃芩二兩

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三
丸日三不知加至五丸

茵陳湯治黃疸身體面目盡黃方

茵陳一兩

黃連三兩

黃芩二兩

三黃散治同前

大黃二兩

黃連三兩

黃芩一兩

右三味治下篩先食服方寸匕日三亦可
為丸

五苓散治黃疸利小便方

猪苓一兩

茯苓三兩

澤瀉四兩

大黃二兩

黃連三兩

黃芩一兩

黃藥
大黃
芩
藥

大黃各
一

卷二

右六味治下篩飲服方寸匕當大吐吐者
日一眼不吐日再亦得下服五日知可消
暑不覺復更服之小升更消息之

茵陳湯治傷寒七八日內實瘀熱結身黃如橘小便不利腹微脹滿宜下之方

尤以吐利為佳不知加一丸初覺體氣有
異急服之即瘥神效

息不覺退更服之小折便消息之

右三味㕮咀以水一斗二升先煮茵陳取五升去滓次內梔子大黃煎取三升分服

茵陳
大黃附三
黃連二
兩
梔子

一升日三小便當利如皂莢沫狀色正赤
當腹減黃悉隨小便去也范用療敷症
小品方用石膏

先服湯後服丸方

大黃芩湯治強盜腹痛小便不利而赤自汗出比為表和裏實當下之方

黃芩

太黃
黃藥
芒硝各四

右六味爲末以蜜丸如梧子大白飲服二

師清微
學術研究

十九令微利

右四味㕮咀以水六升煮取二升去滓內

小黃連丸亦可。湯治傷寒瘀熱在裏身體

芒消復煎取一升先食頓飲之

麻黃
葛根
連翹
甘草各二錢

卷之三

生薑	三
大棗	十二
杏仁	三十

菌藻 梨子 硝

赤小豆
升一
生梓白皮
升二

杏仁各三
巴豆一
帽山

右八味㕮咀以勞水一斗先煮麻黃去沫
次內諸藥煎取三升分三服

鱉甲 兩 **大黃** 兩

○ 桔梗根 苦參 草薢各六錢
右七味六味爲末以艾煎和丸如梧子大
先食服五丸日二可至二十九有熱加苦
參湯加桔梗小便澀加萆薢小便多加凝
水石小便白加黃連大使難加大黃
濕症之爲病始得之一身盡疼發熱面色黑
黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如
施肝狀其小腹滿者急下之亦治一身盡黃
目黃腹滿小便不利方

熱府穴在第二節下兩傍相去各一寸五分

針灸無在治馬黃黃疸等病

肺輸穴從大椎數第三椎兩傍相去各一寸

五分灸主黃疸通治百毒病

心輸穴從肺輸數第二椎兩傍相去各一寸

五分

肝輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸

五分

脾輸穴從肝輸數第二椎兩傍相去各一寸

五分

腎輸穴從脾輸數第三椎兩傍相去各一寸

五分

腳後跟穴在白肉後際針灸隨便治馬黃黃

疸寒暑諸毒等病

側面圖第三
耳中
脾石子頭
手太陽
唐四十四

太衝

耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃
黃疸寒暑發毒等病
頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針
主治馬黃黃疸寒暑溫疫等病頰兩邊同法

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸

脾石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太

澤作湖文向上一夫接白肉際灸七壯治馬

黃黃疸等病

錢孔穴度乳至臍中屬肋頭骨是灸百壯治

黃疸

太衝穴針灸隨便治馬黃黃溫疫毒等病

○孫真人備急千金要方卷之三十四

孫真人備急千金要方卷之三十五 麽至
宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林意等校正

傷寒方

溫瘡第六
瘡瘍方 滷刺法

論曰夫瘡者皆生於風夏傷於暑秋為瘡瘍
也問曰瘡先寒而後熱者何也對曰夫寒者

陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風
故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘡問曰

先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷

於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘡

其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少

氣煩悶手足熱而欲嘔名曰癰瘡問曰夫病

溫瘡與寒瘡而皆安舍於何藏對曰溫瘡

者得之冬中於風寒氣藏於骨骼之中至春

則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓

第五 錄肌肉消腠理發泄因有所用力邪氣與汗

皆出此病邪氣先藏於腎其氣先從內出之

於外也如是則陰虛而陽盛則病矣衰則

氣復反入則陽虛虛則寒矣故先熱而後

寒名曰溫瘡問曰癰瘡何如對曰癰瘡者肺