

黃本 附子各兩 甘草

茯苓 麥門冬 乾地黄

桂心 阿膠各三兩 半夏

遠志 石膏各四兩 生薑六兩

粘糖斤一 大棗二十枚

右十四味取十三味咀咀以水一斗五升  
煮取五升湯成下糖分四服

補心圓治臟虛善恐怖如魘狀及女人產後  
餘疾月經不調方

當歸 防風 苜蓿

附子 芍藥 甘草

蜀椒 乾薑 細辛

桂心 半夏 厚朴

大黃 猪苓各一兩 茯苓一方用

遠志各二兩

右十六味為末蜜丸如梧子酒服五九日  
三不知加至十九丸冷極加熱藥

心勞第三方

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於  
心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞

順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反  
順為逆是謂關格病則生矣

大黃洩熱湯治心勞熱口為生瘡大便苦難  
閉澀不通心滿痛小腸熱方

大黃 澤瀉 黃芩

芒硝 梔子仁各三兩 桂心十兩

通草二兩 石膏八兩 甘草一兩

大棗二十枚

右十味咀咀用水九升先以水一升別漬  
大黃一宿餘八升水煮諸藥取二升五合

去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝令烱分  
三服

孫真人備急千金要方卷之四十

孫真人備急千金要方卷之四十一 歲一

心脈方

心脈方

脈極第四論方

論曰凡脈極者主心也心應脈脈與心合心

有病從脈起又曰以夏遇病為脈痺脈痺不  
已復感於邪內舍於心則飲食不為肌膚軟

脫血色白不澤其脈空虛口脣見赤色凡脈  
氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損

脈為心風心風之狀多汗惡風若脈氣實則  
熱熱則傷心使人好怒口為赤甚則言語

不快血脫色乾燥不澤飲食不為肌膚若脈  
氣虛則寒寒則效效則心痛喉中介介如哽

甚則咽腫喉痺故曰心風虛實候也若陽經  
脈病治陰陰脈病治陽經定其血氣各

守其鄉脈實宜瀉氣虛宜補善治病者定其  
虛實治之取瘥病在皮毛肌膚筋脈則全治

之若至六腑五臟則半死矣

扁鵲云脈絕不治三日死何以知之脈氣空  
虛則頰焦髮落脈應手少陰手少陰氣絕則

脉不通血先死矣

生地黃煎治脉熱極則血氣脫色白乾燥不  
澤飲食不為肌膚消熱止極強胃氣方

生地黃汁 生麥門冬 赤蜜各一升

草心一升 遠志二升 甘草二兩

人參 茯苓 乾地黃

芍藥 白木各三兩 石膏六兩

生薑四兩

右十三味十一味以水一斗二升煮  
取二升七合去滓下地黃汁及蜜更煎取

三升五合分四服

灸法

胃中痛引腰背心中嘔逆面無滋潤灸上門  
隨年壯穴在俠巨關兩邊相去各半寸一寸云  
顏色焦枯勞氣失精肩臂痛不得上頭灸肩

髃百壯穴在肩外頭近後以手按之有解宛  
宛中

脉虛實第五論針灸法方

論曰凡脉虛者好驚跳不定脉實者洪滿凡  
脉虛實之應主于心小腸若其腑臟有病從

熱生則應臟寒則應腑也

防風圓補虛調中治脉虛驚跳不定乍來乍  
去主小腸腑寒方

防風 桂心 通草

茯苓 遠志 麥門冬

甘草 人參 白石英各三兩

右九味為末白蜜和丸如梧子大酒服三  
十九日再加至四十九

升麻湯治脉實供滿主心熱病方

升麻 子芩 澤瀉

梔子仁 淡竹葉 磁石各三兩

生地黃切一升

右七味以水九升煮取三升去滓下  
芒消分三服

麻黃湯調心淺熱治心脉厥大寸口小腸熱

齒齲噎痛方

麻黃 生薑各四兩 細辛

子芩 茯苓 芍藥各三兩

白木二兩 桂心一兩 生地黃切一升

右九味以水九升煮取三升去滓分

三服須利加磁石三兩甚善

針灸法

脉不出針不容穴在幽門兩傍各一寸五分  
是也

心悶痛上氣牽引小腸灸巨關二七壯

心腹痛第六論針灸法 惠賢法

論曰寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胃  
痺感於寒微者為欬甚者為痛為泄厥心痛  
與背相引善癢如物從後觸其心身偃僕者  
腎心痛也厥心痛腹脹滿心痛甚者胃心痛

也厥心痛如以針針刺其心痛甚脾心痛  
也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息  
者肝心痛也厥心痛卧若從心間痛動作痛  
益甚色不變者肺心痛也真心痛手足清至  
節心痛甚旦發夕死夕發旦死蛇心痛心腹

中痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中  
熱善延出是蛇咬也以手按而堅持之勿令  
得移以大針刺之復久持之蟲不動乃出心  
下針不可刺中有成聚不可取於輸腸中有  
蟲蛇咬皆不可取以小針

100x14 1127

治寒熱氣卒客於五臟六腑中則發心痛方

大黃 芍藥 柴胡各四兩

升麻 黃芩 桔梗

朱砂各三兩 鬼箭羽 鬼臼

桂心各二兩 朴硝各二兩

右十一味咳咀以水九升煮取二升七合分三服先分朱砂作三分每服內一分攪令勻服之得快利痛不止宜服後方

赤芍藥六兩 桔梗 杏仁各五兩

右三味咀以水六升煮取三升分三服

九痛圓治九種心痛并療冷衝上氣落馬墮

車血疾等方一蟲心痛二注心痛三風心痛四伴心痛五食心痛六飲心痛七寒心痛八熱心痛九去來心痛比之謂九痛

附子 乾薑各二兩 吳茱萸

人參 巴豆各一兩 生狼毒四兩

右六味為末蜜和丸如梧子大空腹服一丸卒中惡腹脹痛口不能言者二九日一服連年積冷流注心胃者亦服之好好將息神驗

治九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭咀

咀以水三升煮取一升頓服

桂心三物湯治心中痞諸逆懸痛方

桂心 生薑各二兩 膠飴斤半

右三味取二味咀以水六升煮取三升

去滓內飴分三服膠飴時發用枳實五枚

白木二兩 為五味

烏頭圓治心痛微背背痛徹心方

烏頭六兩 附子半斤 蜀椒半斤

乾薑 赤石脂各一斤

右五味為末蜜丸如梧子大先食服三九日三不知稍增之范注不用附子服如括

治心痛方六兩

桃白皮煮汁空腹以意服之范氏用療

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止回欲吐方

苦參斤

右一味咀以水一石煮取二斗去滓下

苦酒二斗更煎取五升大且黃末煮和汁

中煎今可充併手凡之如梧子大每服以

酒一升連三四九日一當倒腹吐不吐

下利更酒漬苦參三斤浸久彌佳非止暴

痛如斷骨斷等痛凡是腹中之疾悉主之

又治宿冷血結陰癰頻用有效大良

治卒中惡心痛方

苦參三兩

右一味咀以好酢一升半煮取八合強

者頓服老小分二服

又方桂心兩

右一味咀以水四升煮取一升半分作

三服

治蟲心痛方

鶴蝮為末蜜和丸如梧子大服四十九

蜜湯下日一服可加至五十九慎酒肉

又方鶴蝮一兩為末以溫酢一盞和空腹服

之蟲當吐出之

又方服漆一合方見養生服餌篇中凡蟲心

痛皆用漆主之

五辛湯治心腹冷痛方

細辛 蜀椒 桂心  
 乾薑 吳茱萸 芍藥  
 防風 苦參 甘草  
 乾地黄 當歸 梔子  
 烏梅 大棗 七枚

右十四味以水九升煮取三升分四服

犀角圓治心腹久痛積年不定不過一時間還發甚則數日不能食又使出乾血窮天下方不能瘥甄立言處此方數日即愈

犀角 麝香 雄黃  
 桔梗 莽草 鬼臼  
 桂心 芫花 甘遂  
 光明砂 附子 貝齒  
 巴豆 赤足蜈蚣  
 右十四味為末蜜丸如梧子飲服一九日二漸加至三九以微利為度古今集驗無雄黃  
 高良薑湯治心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍方  
 高良薑 厚朴 當歸

桂心 芍藥 厚朴  
 右四味以水八升煮取一升八合分三服日二若一服痛止便停不須更服強者為二服若者分三服  
 當歸湯治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方

當歸 芍藥 厚朴  
 半夏 桂心 甘草  
 黃耆 人參 乾薑  
 蜀椒

右十味以水一斗煮取三升二分合分四服羸劣人分六服小品方云大冷加附子一枚  
 又方治虛冷腹痛不下飲食食復不消膠脹者方

當歸 茯苓 黃耆  
 鹿茸 桂心 昆布  
 肉蓯蓉 橘皮 甘草  
 烏頭 大棗 桃仁  
 地骨皮 法麴 大麥蘖  
 右十八味以水一斗五升煮取四升

二合分為五服下利加赤石脂龍骨各三分渴加麥門冬一升  
 又方治寒冷腹中痛方小品名吳茱萸湯  
 當歸 桂心 甘草  
 人參 生薑 半夏  
 小麥 吳茱萸

右八味以水一斗五升煮取三升分三服日三亦治產後虛冷  
 又方治冷氣膈下往來衝胃腸痛引脇背悶者方

當歸 桂心 人參  
 甘草 吳茱萸 芍藥  
 大黃 茯苓 枳實  
 乾薑  
 右十味以水八升煮取二升半分三服日三治尸症亦佳外臺仲景方無茯苓枳實  
 又方治久寒疾胃腹中痛時下利方  
 當歸 甘草 柑皮  
 附子 乾薑  
 右五味以水八升煮取二升分三服

日三

又方治久寒宿疾胃腹中痛短氣時滯下痢

當歸

桂心各三兩 乾薑四兩

附子一兩

右四味咀咀以水八升煮取二升分三服

日三花江無附子用甘草二兩云虛冷

溫中當歸湯治心腹中痛發作腫聚往來上

下痛有休止多熱喜涎出是蛇蟲咬也服二

三劑後若不效有異宜改方增損之

當歸

人參 乾薑

茯苓

厚朴 木香

桂心

桔梗 芍藥

甘草各二兩

右十味咀咀以水八升煮取三升分溫五

服日三不耐本香者以犀角一兩代之

羊肉當歸湯治腹冷絞痛方

羊肉斤半

當歸分四 乾薑

橘皮

黃耆 芍藥

芎藭

桂心 獨活

防風各三

吳茱萸 人參

甘草

乾地黃 茯苓各一

生薑分六

大棗三十枚

右十七味咀咀以水一斗半先煮肉取一

斗二升出肉次內諸藥煮取三升分三服

日三覆取溫暖

溫脾湯治腹痛臍下絞結繞臍不止方

甘草

附子 人參

砒石各二兩

當歸 乾薑各三兩

大黃五兩

右七味咀咀以水七升煮取三升分服日

三

生薑湯治胃腹中卒痛方

生薑一斤

食蜜八兩 酸酏四兩

右三味做大上耗令相得適寒溫服三合

日三

熨蒸法凡心腹冷痛者

熨鹽一斗熨穀鹽沙燒磚石蒸熨取其

裏溫暖止蒸土亦大佳

針灸法

凡邪在心則病心痛甚悲時眩仆視有餘不

足而調其輸

腎心痛先取京骨崑崙發針不已取然谷

胃心痛取大都太白

脾心痛取然谷太谿

肝心痛取行間太衝

肺心痛取魚際太淵

心痛引腰脊欲嘔刺足少陰

心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陰

心痛腹脹滿瀉然大便不利取足太陰

心痛小腹滿上下無常處澀便難刺足厥陰

心痛短氣不足以息刺手太陰

心痛不可按煩心巨闕主之

心痛有三蟲多涎不得反側上管主之

心痛身寒難以俛仰心疝衝胃死不知人中

管主之

心痛如針刺然谷及太谿主

心腹中卒痛石門主之

心疝暴痛取足太陰

心懊憹微痛煩逆灸心輸百壯

心痛如錐刀刺氣結灸膈輸七壯  
心痛冷氣上灸龍領百壯在鳩尾頭上行一  
寸半不可刺之

心痛惡氣上膈急痛灸通谷五十壯在乳下  
二寸

心痛暴絞急絕欲死灸神府百壯在鳩尾正  
心有忌

心痛暴惡風灸巨關百壯

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛灸臂腕橫文三七壯又灸兩虎口白肉  
際七壯

胃痺第七論方

論曰胃痺之病令人心胸堅滿痞急痛肌中  
苦痺絞急如刺不得俯仰其胃前皮皆痛手  
不得把胃中幅幅而滿短氣欬唾引痛咽塞  
不利習習如癢喉中乾燥時欲嘔吐煩悶白  
汗出或徹引背痛不治之數日殺人  
論曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即胃  
痺而痛所以然者責甚極虛故也今陽虛知  
在上焦所以胃痺心痛者以其人脉陰弦故

也平人無寒熱短氣不足以息者實也

枳實薤白桂枝湯治胃痺心中痞氣結在胃  
胃滿脇下逆搶心方

枳實四枚 薤白一斤 桂枝兩

厚朴兩三 枳實實一枚

右五味以水七升煮取二升半分再

服仲景方厚朴用四兩薤白半斤水五升煮取二升半服之

枳實湯治胃痺病喘息欬唾胃背痛短氣寸  
脉沈而遲關上小緊數方

枳實實一枚 半夏半升 薤白斤

枳實兩二 生薑兩四

右五味以水七升煮取一斗煮取四升服

一升日三服仲景肘後不用生薑枳實半夏

治胃痺候胃中幅幅如滿噎塞習習如癢喉  
中澀燥唾沫宜此方

橘皮斤 生薑斤 枳實五枚

右三味以水五升煮取二升去滓分

再服

治中湯胃痺方

茯苓湯治胃中氣塞短氣方

茯苓三兩 甘草兩 杏仁五十枚

右三味以水一斗三升煮取六升去  
滓為六服日三未瘥再合服

通氣湯治胃滿短氣噎塞方

半夏八兩 生薑兩六 橘皮兩三

吳茱萸四兩

右四味以水八升煮取三升分三服

一方用桂二兩無橘皮

細辛散治胃痺遠背痛短氣方

細辛 甘草各二 枳實

生薑 枳實 乾地黄

白木各三 桂心 茯苓各五

右九味治下篩酒服方寸匕日三

蜀椒散治胃痺連背方

蜀椒 食茱萸各一 桂心

桔梗各三 烏頭兩 豉六

右六味治下篩食後酒服方寸匕日三

前胡湯治胃中逆氣心痛徹背少氣不食方

前胡 甘草 半夏

芍藥各二 黃芩 當歸

人參 桂心各一兩 生薑三兩  
 大棗三十枚 竹葉一升  
 右十一味以水九升煮取三升分為四服

又方  
 前胡 人參 生薑  
 半夏 麥門冬 甘草  
 芍藥 茯苓 飴糖各三兩  
 桂心 黃芩 當歸各一兩  
 大棗三十枚

右十三味以水一斗四升煮取三升去滓分三服

熨背散治胃背疼痛而悶方

烏頭 細辛 附子  
 羌活 蜀椒 桂心各五兩

芎藭一兩六銖

右七味治下節常裏微火炙令暖以慰背  
 上取瘥乃止慎生冷如常法

下氣湯治胃腹背閉滿上氣喘息方  
 杏仁四七枚 大腹橫榔二七枚

右二味以童子小便三升煎取一升半分再服曾患氣發輒合服之  
 橫榔湯主破胃背惡氣音聲塞閉方

橫榔大者四枚 小者八枚

右一味二品以水一斗二升半煮減

一升去滓分三服頻與五劑永定

灸法

胃痺引背時寒間使主之

胃痺心痛天井主之

胃痺心痛不得息痛無常處臨泣主之

胃痺心痛灸中百壯穴在鳩尾上一寸忌

針

胃腸滿心痛灸期門隨年壯穴在第二肋端

乳直下一寸半

孫真人備急千金要方卷之四十一

孫真人備急千金要方卷之四十二 歲二

宋朝奉節中太常少卿光祿門校書林傳等校正

心臟方

頭面風第八方 按白法

芎藭酒治腦風頭重頭項強眼眵淚出善

欠目欲眠睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐

逆眩倒不自禁諸風乘虛經五藏六腑皆為

癲狂諸邪病悉主之方

芎藭 辛夷 天雄

人參 天門冬 栝子仁

磁石 石膏 茵芋

山茱萸 白頭翁 桂心

秦艽各三兩 松蘿 羚羊角

細辛 薯蕷 葛蒲

甘草各二兩 雲母一兩燒令赤木為粉

防風四兩

右二十一味以酒二斗漬七日初服

二合漸加至五合日三有女人少時患風

眩發則倒地為婦積年無兒服此酒并將

紫石門冬丸服之眩瘥生兒平復紫石門冬丸方

F-11 V (900)