

亦云止遺溺也太谿中封然谷太白大都跌陽行間大敦隱白涌泉凡此諸穴各一百壯腹背兩脚凡四十七處其腎輪腰目關元水道此可灸三十壯五日一報各得一百五十壯佳涌泉一處可灸十壯大敦隱白行間此處可灸三壯餘者悉七壯皆五日一報滿三灸可止也若發灸諸陰不愈宜灸諸陽諸陽在脚表并灸肺輪募按流注孔穴壯數如灸陰家法

小便數而少且難用力輒失精者令其人舒兩手合掌併兩大拇指令齊急逼之令兩爪甲相近以一炷灸兩爪甲本肉際肉際方後自然有角令炷當角中小侵入爪上此兩指共用一炷也亦灸脚大趾與手同法各三炷而已經三日又灸之

孫真人備急千金要方卷之六十三

孫真人備急千金要方卷之六十四 仁

宋朝東都中太常少卿元和開校理林億等撰

淋閉第二 論一首 方六十五首 證二條 灸法十五首

論曰熱結中脘則為堅下脘則為溺血令人淋閉不通此多是虛損人服大散下膾容熱所為亦有自然下膾熱者但自少可善候之凡氣淋之為病溺難澀常有餘瀝石淋之為病莖中痛溺不得卒出膏淋之為病尿似膏自出勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝下熱淋之為病熱即發甚則尿血治之皆與氣淋同。

凡人候鼻頭色黃法小便難也
 地膚子湯治下膾結熱小便赤黃不利數起出少莖痛或血出濕病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及行步冒熱以飲逐熱熱結下膾及散石熱動關格小腹堅胞脹如斗諸有此淋悉治之立驗方

- 地膚子 兩 知母 黃芩
- 猪苓 瞿麥 枳實 一作枳實
- 升麻 通草 葵子

海藻

右十味以水一斗煮取三升分三服大小便皆閉者加大黃三兩女人房勞腎中有熱小便難不利小腹滿痛脉沈細者加猪腎一具 崔氏云若加腎可用水盪半先炙腎取生汁然後內

藥煎之小品方不用枳實

治百種淋寒淋熱淋勞淋小便澀胞中滿腹急痛方

- 通草 石韋 甘草
- 王不留行 各二兩 冬葵子 滑石

瞿麥 白朮 芍藥 各五兩

右九味以水一斗煎取三升分三服 古今雜驗有雷神麻兩治下所以麥射清服方十七日三

又方滑石 石韋 桔萸根 各三兩

右三味治下膾大麥飲服方寸七日三

治諸種淋方

- 葵根 兩 茺菀 石首魚頭石 各五兩
- 甘草 兩 通草 兩 貝子 各五兩
- 天麻根 兩

右七味以水一斗二升煮取五升分

五服日三夜二亦主石淋

又方榆皮性

車前子

冬瓜子性

鯉魚齒

桃膠

通草

地豚性

瞿麥性

右八味吹咀以水一斗煮取三升分三服

日三

又方細白沙三升熬令極熱以酒三升淋取

汁服一合

治淋痛方

滑石性

貝子性

茯苓

白朮

通草

芍藥性

右六味治下篩酒服方寸七日二服十日

瘥

又方葵子性

茯苓

白朮

當歸性

右四味吹咀以水七升煮取二升分三服

日三

又方取猪脂酒服三合日三小兒服一合臘

月者

治小便不利莖中疼痛小腹急痛方

通草

茯苓性

葶藶性

右三味治下篩以水服方寸七日三

又方蒲黃

滑石性

右二味治下篩酒服方寸七日三

治小便不利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍曝乾為末服方寸七日三

治小便不通方

滑石性

葵子

榆白皮性

右三味治下篩煮麻子汁一升半取一升

以散二方寸七和分三服即通

又方水四升洗甄帶取汁煮葵子取二升半

分三服

又方胡燕屎鼓各一合和擣丸如梧子服三

丸日三

又方髮去垢燒末葵子各一升以飲服方寸

七日三

又方石首魚頭石為末水服方寸七日三

又方石槽塞灰土并華水服之日三

又方鯉魚齒燒灰末酒服方寸七日三

又方車前子末方寸七日三服百日止

治卒不得小便方

吞雞子白取瘥性

桑白皮性

又方車前草性

桑白皮性

右二味吹咀以水三升煎取一升頓服之

治婦人卒不得小便方

杏仁二七枚熬末服之立下

又方紫苑末并華水服三指撮立通血出者

四五度服之

治黃疸後小便淋瀝方

猪腎性

茯苓性

瞿麥性

車前根性

黃芩性

椒目性

澤瀉

地膚子性

右八味吹咀以水二斗煮車前取一斗六

升去滓下猪腎煮取一斗三升去腎下藥

煮取三升分三服

治氣淋方

水三升煮船底苔如鴨子大取二升頓

服

又方水三升煮豉一升一沸去滓內鹽二合

頓服亦可單煮豉汁服之

又方水一斗煮比輪錢三百文取三升溫服之

又方搗葵子末湯服方寸七

又方空腹單如蜀葵一滿口

又方熬鹽熱熨小腹冷復易亦治小便血後肘

方治小便不通

灸法

臍中著鹽灸三壯若云云治小便不通

灸關元五十壯又灸伏玉泉相去一寸半三十壯

治石淋方

右用車前子二升絹袋盛水九升煮取三升先經宿不得食平旦空腹頓服之石即出急方云

又方取浮石使滿一手許治下篩以水三升

酢一升煮取二升澄清服一升不過三服

石出亦治淋症

又方桃膠棗許大夏以冷水三合冬以湯三合和服日三當下石子如豆卵石盡止出小便

又方

又方

又方

又方

灸法

石淋臍下三十六種病不得小便灸關元三十壯

又灸氣門三十壯

又灸水泉三十壯足大敦是也

治膏淋方

右搗葎草汁二升酢二合和空腹頓服之

當尿如小豆汁也又濃煮汁飲亦治淋瀝

治五勞七傷八風十二痺勞結為血淋熱結

為肉淋小便不通莖中及小腹痛不可忍者

方

滑石 桂心 冬葵子

玉不留行 通草 車前子

甘遂 石韋

右八味治下篩以麻子飲五合和服方寸

七日三尿沙石出一方加榆白皮三分

勞淋灸足太陰百壯在內踝上三寸三報之

治熱淋方

大棗 葵根

又方

又方

又方

右二味以水三升煮取一升二合分二服

熱加黃芩一兩出難加滑石二兩末血者

加茜根三兩痛者加芍藥二兩加藥亦加水也

又方白茆根切四斤以水一斗五升煮取五

升服一升日三夜二

又方常煮冬葵根作飲服之

治血淋小便破痛方

雞蘇 通草 滑石

竹葉 生地 小蘗根

右六味以水九升煎取三升去滓分

三服溫服

石韋散治血淋方

石韋 當歸 蒲黃

芍藥

右四味各等分治下篩酒服方寸匕日三

又方以水五升煮生大麻根十枚取二升頓

服

又方以水四升煮大豆葉一把取二升頓服

又方以水三升煮葵子一升取汁日三服亦

又方

又方

治虛勞尿血

灸法

血淋灸丹田隨年壯又灸伏留五十壯一云隨年壯

五淋不得小便灸懸泉十四壯穴在內踝前一寸斜行小脉上是中封之别名

五淋灸大敦三十壯

卒淋灸外踝尖七壯

淋病九部諸疾灸足太陽五十壯

淋病不得小便陰止痛灸足太衝五十壯

腹中滿小便數起灸玉泉下一寸名尿胞一名屈骨端灸二十七壯小兒以意減之

治遺尿小便澀方

牡蠣

鹿茸各等

桑耳各等

阿膠兩

右四味吹咀以水七升煮取二升分二服

日二

又方防已

葵子

防風各等

右三味吹咀以水五升煮取二升半分三服散服亦佳

治小便失禁方

以水三升煮雞腸取一升分三服

治失禁出不自覺方

右用豆醬汁和窻突壘如豆大內尿孔中

范注云治淋轉亦治小兒

治尿淋方

以取羊肚系盛水令滿線縛兩頭熟煮即開取中水頓服立瘥

又方取雞臍一具并腸燒末酒服男雌女

雄

又方取羊胞盛水滿中炭火燒之盡內空腹

食不過四五度瘥

又方以新炊熱飯一盞瀉尿牀處持與食之

勿令知良

灸法

遺尿失禁出不自知灸陰陵泉隨年壯

遺溺灸道遺候玉泉五寸又灸陽陵泉又灸

足陽明各隨年壯

小便失禁灸大敦七壯又灸行間七壯

尿淋垂兩手兩臂上盡指頭上有陷處灸七

壯又灸臍下橫文七壯

尿血第三方前

治房勞傷中尿血方

牡蠣

桂心

黃芩

車前子各等

右四味治下篩以飲服方寸匕稍加至二

日三服

治小便血方

生地黃兩

栢葉兩

黃芩

阿膠兩

右四味吹咀以水八升煮取三升去滓下

膠分三服一方加甘草二兩

又方菟絲子

蒲黃

白芷

荆實

乾地黃

酸棗小品

芎藭

葵子

當歸

茯苓各等

右十味為末蜜丸如梧子飲服五九日三

稍加至十九

又方戎鹽分兩

甘草

蒲黃

鹿魚膠

芍藥各等

礬石兩

大藥

右七味咬咀以水九升煮取二分分三服
又方胡麻三升搗細末以東流水二升漬一宿平旦絞去滓煮兩沸頓服

又方龍骨為細末溫水服方寸七日五六服

又方酒三升煮蜀當歸四兩取一升頓服

又方酒三升煮蜀當歸四兩取一升頓服

又方酒服亂髮灰蘇頌月水服

又方酒服葵莖灰方寸七日三

又方刮滑石末水和傳繞小腹及陰際佳

又方鼓二升酒四升煮取一升頓服

水腫第四論一首仁四方四十九首 卷八錄一首

論曰大凡水病難治後特須慎於口味又復病人多嗜食不廉所以此病難愈也代有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人欲食肉於貴勝之處勸令食羊頭蹄肉如此者未見有一愈者又此病百脉之中氣水俱

實治者皆欲令瀉之使虛羊頭蹄極補那得

瘰癧所以治水藥多用葶藶子等諸藥本草云葶藶久服令人大虛故水病非久虛不得絕其根本又有蠱脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫大有醫者不善診候治蠱以

水藥治水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所云愚醫殺之今錄忌如左其方治具在雜方篇中第七十四卷中

喪孝 產乳 音樂

房室 誼戲 一切魚

一切肉 一切生冷 酢滑

蒜 粘食米豆油膩

右以前並禁不得食不及不得用心其不禁者並具本方之下其房室等猶三年慎之永不復發不爾者雖復發復發不可

更治也古方有十水丸歷驗多利大便而不利小便所以不能述錄也

黃帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石癧何以別之岐伯曰水之始起也目果上微腫微腫作如新卧起之狀頭脉動時欬陰股間

寒足脛腫腹仍大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹何以

候之膚脹者寒氣客於皮膚之間穀穀然而堅太素外臺腹大身盡腫皮厚按其腹陷太素而不

起腹色不變此其候也鼓脹如何鼓脹者腹脹身腫大大與膚脹等其色蒼黃腹

脉起此其候也腸覃如何腸覃者寒氣客於腸外與胃太素相薄正氣不得榮因有所擊擊腹而內著惡氣乃起息肉乃生始也如雞卵稍以益大及其成也若懷子之狀久者離

歲月按之即堅推之則移月事時下此其候也石癧如何石癧者生於胞中寒氣客於子門子宮閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉所以

留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之曰膚脹鼓脹可刺耶

曰先瀉其腹之血絡後調其經刺去其血脉師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證浮腫按之沒指不惡風其腹如鼓太素不滿不渴當發其汗正

水其脉沈遲外證自喘石水其脉自沈外證
 腹滿作脉經不喘黃汗其脉沈遲身體發熱胃
 滿四肢頭面並腫久不愈必致癰膿心水者
 其人身體重一作而少氣不得卧煩而燥其
 人陰大腫肝水者其人腹大不能自轉側而
 脇下腹中痛時時津液微生小便續通脾水
 者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣
 小便難也肺水者其人身體腫而小便難時
 時鴨溲腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺
 陰下濕如牛鼻上汗足為逆冷其面反瘦師
 曰治水者腰以下腫當利小便腰以上腫當
 發汗即愈問曰有病下利後渴飲水小便不
 利腹滿因腫何故師云此法當病水若小便
 自利及汗出者自當愈一作滿凡水病之初
 先兩目上腫起如老蠶色俠頸脉動股裏冷
 脛中滿按之沒指腹內轉側有聲此其候也
 不即治之須臾身體稍腫腹中盡脹按之隨
 手起水為已成猶可治也此病皆從虛損所
 致
 大病或下利後婦人產後飲水不即消三臌

決瀉小便不利仍相結漸生聚遂流諸經
 絡故也

水有十腫不可治者有五第一層黑傷肝第
 二缺盆平傷心第三臍出傷脾第四背平傷
 肺第五足下平滿傷腎此五傷必不可治

凡水病忌腹上出水出水者一月死大忌之
 中軍候黑圓治膽玄水先從頭面至脚腫頭
 眩痛身虛熱名曰玄水腫大小便澀宜此

治小腸水小腹滿暴腫口苦乾燥方
方見第五卷中

右用已豆三十枚和皮吹咀水五升煮取
 三升綿內汁中拭腫上隨手可減日五六
 拭莫近目及陰集驗治身

治大腸水乍虛乍實上下來去方
 赤小豆升 桑白皮升 鯉魚升

白木兩
 右四味吹咀以水三斗煮魚取爛勿用鹽

去魚盡食并取汁四升許細細飲下

又方羊肉斤 當陸升
 右二味以水二斗先煮當陸令爛去滓後

內羊肉及葱豉酢一如腫法肘後云治本腫
 治膀胱石水四肢瘦腹腫方

桑白皮 穀白皮 澤漆葉各升
 大豆升 防已 射干

右七味吹咀以水一斗五升煮取六升去
 滓內好酒三升更煮取五升日二夜一餘
 者次日更服集驗方無澤漆防

又方桑白皮兩 射干 黃芩
 茯苓 白木兩 澤瀉兩

防已兩 大豆升 澤漆物
 右九味吹咀以水五斗煮大豆取三斗去
 豆澄清取一斗下藥煮取三升空腹分三
 服

治胃水四肢腫腹滿方

猪腎兩 茯苓兩 防已兩
 橘皮 玄參 黃芩

杏仁 澤瀉兩 桑白皮兩
 猪苓 白木兩 大豆升

右十二味吹咀以水一斗八升煮猪腎大

豆澤瀉桑白皮取一斗澄清去滓內餘藥
煮取三升分三服若效加五味子三兩凡
服三劑間五日一劑常用有效

有人患氣急積久不瘥遂成水腫如此者衆
諸皮中浮水攻面目身體從腰以上腫皆以
此湯發汗悉愈方

麻黃兩 甘草兩

右二味以水五升煮麻黃再沸去沫
內甘草取三升分三服取汗愈慎風冷等

治面腫小便澀心腹脹滿方

茯苓 杏仁各兩 橘皮
防己 葶藶各伍 蘇子伍

右六味為末蜜丸如小豆服十九以桑白
皮湯送下日二加至三十九

治面目手足有微腫常不能好者方

以楮葉切二升以水四升煮取三升去滓
內米煮作粥食如常食勿絕冬則預取葉
乾之準法作粥周年永瘥慎生冷一切食
物

治大腹水腫氣息不通命在旦夕者方

牛黃分 椒目分 昆布

海藻各伍 牽牛子 桂心各兩
葶藶子伍

右七味為末別搗葶藶如膏合和丸如梧
子飲服十九日二稍加小便利為度大良

正觀九年漢陽王患水醫所不治余處此
方日夜尿一二斗五六日即瘥瘥後有他
犯因爾殂矣計此即是神方崔氏云雲和
為丸塞湯服

有人患水腫腹大其堅如石四肢細小勞苦
足脛腫小飲食便氣急此終身疾服利下藥

不瘥者宜服此藥將以微除風濕利小便消
水穀歲久服之乃可得力瘥後可常服

鬼箭羽 丹參 白朮
獨活各伍 秦艽 猪苓各伍
知母 海藻 茯苓

桂心各兩

右十味以酒三斗浸五日服五合日
三任性量力漸加之

治水腫利小便酒客虛熱當風飲冷水腹腫
陰脹滿方

當陸兩 甘遂兩 硃硝

芫花 吳茱萸兩
右五味為末蜜丸如梧子大飲服三九日
三一方有大黃芫花各二兩無茱萸加麝
香猪苓各一兩

大豆散治久水腹肚大如鼓者方十六

烏豆一斗熬令香勿令大熟去皮為細
末篩下錫粥皆得服之初服一合稍加
之若初服多後即嫌臭服盡更作取瘥
止不得食肥膩渴則飲羹汁慎酒肉猪

雞魚生冷酢滑房室得食漿粥牛羊兔
鹿肉此據大飢渴時食之可忍亦勿食
也此病難治雖諸大藥丸散湯膏當時
暫瘥過後復發惟此散瘥後不發終身
服之終身不發矣其所禁食物常須少
噉莫隨意鹹物諸雜食等

又方葶藶末 蒼耳子各伍

又方葶藶末 蒼耳子各伍

又方葶藶末 蒼耳子各伍

又方葶藶末 蒼耳子各伍

又方葶藶末 蒼耳子各伍

又方葶藶末 蒼耳子各伍

治水氣腫鼓脹小便不利方

葦苈子升 黏羊肺羊亦佳

右二味先洗羊肺湯微洗之薄切曝乾作末以三年大酢漬葦苈子一晷時出整令變色熟搗如泥和肺末蜜合搗三千杵為

丸如梧子大食後一食久以麥門冬飲服四九日三以喉中乾口粘浪語為候數日小便大利佳山連療章司業得瘥司業姪雲表所送云數用神驗

麥門冬飲方

麥門冬伍枚 米伍粒

右二味以水一升和煮米熟去滓以下前件丸藥逐服作用之

徐王煮散治水腫利小便方

牛角鯁 防己 羌活

人參 丹參 牛膝

升麻 防風 秦艽

生薑屑 穀皮 紫菀

杏仁 附子 石斛各五

桑白皮而 橘皮而 白木

澤瀉

茯苓 郁李仁 黃連各宜

右二十三味治下篩為粗散以水一升五合煮三寸七取一升頭服日再不能者但一服二三月以前可服主利多而小便澀者用之大驗

猪澄漢防己散治水腫上氣方

漢防己 澤漆葉 石葦

澤瀉各伍 桑根白皮 白木

丹參 赤茯苓 橘皮

通草各壹 生薑伍 郁李仁伍

右十二味治下篩為粗散以水一升半煮三方寸七取八合去滓頓服日三取小便利為度

茯苓圓治水腫甄權為安康公處者方

茯苓 白木 椒目各肆

木防己 葶藶 澤瀉各伍

甘遂分拾 赤小豆 前胡

芫花 桂心各伍 芒硝別研

右十二味為末蜜和丸如梧子蜜湯下五

丸日一稍加以知為度

治水腫利小便方

大黃 白木半壹 木防己各半

右三味為末蜜丸如梧子飲下十九利小便為度不知加之

又方牽牛子末水服方寸七日一以小便利為度

又方

葶藶 桂心而壹

右二味為末蜜丸如梧子大飲下七九日

二以知為度

又方郁李仁 麩各壹

右二味和作餅子七枚燒熟空腹熱食四枚不知加一枚以至七枚

又方水銀各壹 葶藶子 椒目各壹

衣魚各伍 水萍 瓜蒂各壹

又方

滑石各壹 芒硝伍

右八味搗葶藶令細下水銀更搗令不見

水銀止別搗椒目令細搗瓜蒂水萍下篩

合和餘藥以蜜和更搗三萬杵成丸初服

一九如梧子次服二九次服三九次服四

九次服五九次服六九至七日還從一九起次服二九如是每至六九還從一九起始服藥當咽喉上有癭子腫起頰車腫滿齒斷皆腫唾碎血出勿怪也不經三五日即消所苦皆瘥以上服藥若下多停藥以

止利藥至五下止病未瘥更服病瘥止此治諸體肉肥厚按之不陷甚者臂粗著衣袖不受及十種大水醫不治者悉主之神驗深師集驗陶氏古今錄驗無木魚水洋瓜帶滑石

澤漆湯治水氣通身浮腫四肢無力或從消渴或從黃疸支飲內虛不足榮衛不通氣不消化實皮膚中喘息不安腹中響脹滿眼目不得視方

澤漆根拾 鯉魚肝 生薑切
赤小豆煮 茯苓兩 人參

甘草 麥門冬各

右八味吹咀以水一斗七升先煮魚及豆減七升去之內藥煮取四升半一服三合日三人弱服三合再服氣下喘止可至四合時時小便利腫氣減或小溲下若小便

大利還從一合始大利便止若無鯉魚鱗魚亦可用若水甚不得卧卧不得轉側加澤漆一斤湯加枯薑根二兩款嗽加紫莞二兩細辛一兩款冬花一合桂心三兩增魚汁二升治本在五臟今人軟弱微渴上氣腫大而喘兩脚腫日下有卧裏狀微渴不得安卧氣奔加氣有項乃腹小使水氣通肺命命氣滿陽病宜利小便水氣通肺命命氣

猪苓散治虛滿通身腫利三焦水道方
猪苓 葶藶 人參
玄參 五味子 防風
澤瀉 桂心 狼毒
椒目 白木 乾薑
大戟 甘草各 茯苓各
女麴合 赤小豆合

右十七味治下篩酒服方寸七日三夜一老小一錢七以小便利為度

治水氣通身洪腫百藥治不瘥待死者方

大麻子皆取新 赤小豆不得一粒
右二味皆以新精者淨揀擇以水淘洗曝乾蒸麻子使熟更曝令乾貯淨器中欲服

取五升麻子熬令黃香只宜緩火勿令焦極細作末以水五升搗取汁令盡淨密器盛貯明旦欲服今夜以小豆一升淨淘浸至旦乾漉去水以新水煮豆末及好熟即漉出令乾內麻子汁中煮令大爛熟為佳

空腹恣食日三服當小心悶少時即止五日後小便數或赤而唾粘口乾不足怪之服訖常以小便利為佳

又方煎人尿令可丸服如小豆大日三服三丸如行十五里久又服三九水出更服一丸即止
又方擣生葶藶子酢和服以小便數為度
又方燒薑石令赤內黑牛尿中令熱服一升日一

又方單服牛尿大良凡病水服無不瘥服法先從少起得下為度
又方灸足第二趾上一寸隨年壯又灸兩手大指縫頭七壯
麻黃煎治風水通身腫欲裂利小便方

麻黃

茯苓

澤瀉各肆兩

防風

澤漆

白木各伍兩

杏仁

大戟

清酒各壹斗

黃耆

猪苓各壹兩

獨活樹兩

大豆貳斗

水柒斗

取壹斗

右十三味咬咀以豆汁酒及水一斗合煮取六升分六七服一日一夜令盡當小便極利為度

大豆散治風水通身大腫眼合不得開短氣欲絕方

大豆

杏仁

清酒各壹斗

麻黃

木防己

防風

猪苓各肆兩

澤瀉

黃耆

烏頭各壹兩

生薑各肆兩

半夏陸兩

茯苓

白木各伍兩

甘遂二兩

甘草各肆兩

右十六味

咬咀以水一斗四升煮豆取一斗去豆內藥及酒合煮取七升分七服日四夜三得小便快利為度腫消停藥不必盡劑若不利小便者加生大戟一升葶藶

二兩無不快利萬不失一澤瀉方無猪苓

治風水腫方

大豆叁斗

茯苓

白木各伍兩

防風

橘皮

半夏

生薑各伍兩

鼈甲

當歸

防己

麻黃

猪苓各壹兩

大戟貳斗

葵子壹斗

桑白皮伍斗

右十五味

咬咀內前汁中煮取五升每服

八合日三每服相去如人行十里久

麻子湯治偏身流腫方

麻子伍斗

赤小豆叁斗

當陸壹斗

防風叁兩

附子壹兩

右五味

咬咀先搗麻子令熟以水三斗煮

麻子取一斗三升去滓內藥及豆煮取四

升去滓食豆飲汁

大豆煎治男子女人新久腫得暴惡風入腹

婦人新產上圍風入臍腹中如馬鞭者噓吸

短氣欬嗽方

右用大豆一斗淨擇以水五斗煮取一斗

五升澄清內釜中以一斗半美酒內中更

煎取九升宿勿食平旦服三升溫覆取汗

兩食頃當下風氣腫退慎風冷十日平

復除日合服佳苦急不可待遂急合服腫

不盡退加之腫差更服三升若十分瘥勿

服病中亦可任性飲之使酒氣相接吐後

又方猪皮枝葉一大束切煮取汁隨多少釀

酒但飲醉為佳不過三四日腫少退瘥後

可常服之一方用猪椒皮枝葉

又方鯉魚長一尺五寸以尿淹漬一宿平旦

以木篦從口貫至尾微火炙令微熟去皮

宿勿食空腹頓服之不能者分再服勿與

鹽

摩膏治表凡腫病須百方內外攻之不可一

藥方

生當陸斤壹 猪膏壹斤煎可

右二味和煎令黃去滓以摩腫亦可服少

許并塗以紙覆上燥輒傳之不過三日瘥

麝香散治婦人短氣虛羸偏身浮腫皮膚急人所稀見方

麝香銖銖 雄黃銖銖 芫花

甘遂銖銖

右四味治下篩酒服錢五七老小以意增

減亦可為丸如小豆大強者服七丸無小

黃深師以蜜丸如大豆服二九日三治三焦決滿水在胃外名曰水病腹滿大在腹後有人參或分為丸服

治虛勞浮腫方

右灸太衝百壯又灸腎輸

孫真人備急千金要方卷之六十四

孫真人備急千金要方卷之六十五

宋朝奉節守太常少卿元松園松林德華校正

丁腫第一方二十九首 證十五條 灸法一首

論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興此二炁更相擊怒當是時也必有暴氣夫暴氣者每月之中必有卒然大風大霧大寒大熱若不時避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚流注經脈遂使腠理壅隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣泄變成癰疽疔毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識令人死不逮辰若著訖乃欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡痍無所逃矣
凡瘡丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血傳藥藥氣得入針孔中佳若不達瘡內瘡不得力
又其腫好著口中頰邊舌上見赤黑如珠子瘡痛應心是也秋寒毒久結皮中變作此疾不即瘡之日夜根長流入諸脉數道如箭入身投人不得動搖若不慎口味房室死

不旋踵經五六日不瘥眼中見火光神昏口乾心煩即死也

一曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微赤多癢食麻子及衣布并入麻田中行

二曰石丁其狀皮肉相連色烏黑如黑豆甚硬刺之不入肉內陰陰微疼忌瓦礫磚石之屬

三曰雄丁其狀胞頭黑紫四畔仰瘡胞漿起有水出色黃大如錢孔形高忌房事

四曰雌丁其狀瘡頭稍黃向裏紫亦似炎瘡四畔胞漿起心凹色赤大如錢孔忌房事

五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑紫四邊有胞漿起如赤粟米忌火炙燥

六曰爛丁其狀色稍黑有白癩瘡中潰潰則有膿水流仁五出瘡形大小如匙面忌沸熱食爛帛物

七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治如未滿三十六