

乳婦人飲兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也

宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳二物飛鳥

膏及飛鳥散佳若始作者可傳黃芩漏蘆散

及黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯方

右用柏皮切三升以水一斗煮取五升夏

冷用之冬溫用之分以洗乳亦洗諸深敗

爛久瘡洗竟傳膏散

天麻湯方

右用天麻草切五升以水一斗半煮取一

斗隨寒熱分洗乳以殺癢也此草葉如麻

冬生夏著花赤如鼠尾花也亦以洗浸淫

黃蠟熟瘡瘍疽陰蝕小兒頭瘡洗竟傳

飛鳥膏方

傾粉是燒來炒作水銀上磬石各本

右二味爲末以甲煎和如脂以傳乳瘡日

三傳作散者不須和汁自著者可用散及

諸熱瘡黃蠟瘡浸滲汁癢丈夫陰蝕癢濕

瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡癩瘡等並皆

黃連胡粉散
主之

黃連兩

胡粉分水銀合

右三味黃連爲末相和更皮裹熟接之自能和合縱不得成一家亦得水銀細散入

粉中也以傳乳瘡諸濕瘡黃蠟肥瘡等者乾著甲煎爲膏

治妬乳乳生瘡方

蜂房

豬甲中土車轍中土各等分

可忍者方

右三味爲末苦酒和傳之

鹿角分鹿角散治婦人乳生瘡頭汁出疼痛欲死不

鹿角分

甘草分

可忍者方

右二味治下節和以雞子黃於銅器中置溫處炙上傳之日再即愈神驗不傳

治妬乳方

右以葵莖灰搗篩飲服方寸七日三即愈

集驗方直擣

又方燒自死蛇爲灰和以猪膏塗之大良

灸法

右以蒲橫度口以度從乳上行灸度頭二七壯

論曰產後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳蓄喜結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傳乳房令消結也若飲兒不泄者數捨去之亦可令大孩子含水使口中令爲嗍取滯乳汁吐去之不含水漱去熱喜令乳頭作瘡乳孔塞也

凡女人多患乳癰年四十已下治之多瘥年五十已上慎勿治治之多死不治自得終天

年。

連翹湯治妬乳乳癰方

連翹

礮硝各兩

芳藥

射干

升麻

防已

杏仁

黃芩

大黃

治乳癰方

右十一味㕮咀以水九升煮取二升五合

分三服

麥門冬升黃芩

苦藥

芍藥

通草各
分量

右十四味爲末蜜丸如梧子大未食飲服

三丸不知益至五丸三無所忌一方無

大黃敗醬黃連通草爲散酒服方寸匕

孫真人備急千金要方卷之七十

孫真人備急千金要方卷之七十一

仁十

宋朝奉郎少卿充秘閣校理孫億等校正

五痔第三

論一首 方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳

時時瀆膿血出牝痔者肛腫痛生瘡脉痔者

肛邊有瘡癰痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血

痔者大便清血隨大便污衣又五痔有氣痔

寒溫勞濕即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如兒

乳在孔中頗出見外妨於更衣鼈甲主之牝

痔酒膏作從孔中起外腫五六日自潰出膿。

血鴟皮主之腸痔更衣挺出久乃縮母猪左

足懸蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之

五藥皆下篩等分隨其病倍其主藥爲三分

旦以井花水服半方寸匕病甚者旦暮服之

亦可四五服禁寒冷食豬肉生魚菜房室惟

得食乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用

藥導下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用

野葛燒末刀圭內藥中服藥五日知二十

若三十日愈痔痛通忌草藥

治五痔衆醫所不能愈者方

秦艽

白芷

厚朴

紫參

亂髮

紫菀各量

雷丸

藁本各量

石南

麌蟲各量

貫眾各量

蟲蟲半

豬後懸蹄拾脾

槐子圓治燥濕痔瘻有雄雌皆主之方

槐子

乾棗

秦艽

吳茱萸根白皮

各半

白芷

桂心

黃芩

黃耆

白斂

杜鵑

龍骨

雷丸

丁香

木香

蕤蕤

附子各量

右十六味爲末蜜丸如梧子大飲服二十

九日三

千金翼無白斂深師無黃耆云治
苦參有乾燥腹痛者有崩血無數