

孫真人備急千金要方卷之七十三

宋朝奉郎守太常少卿尤秘閣校理林億等校正

解毒雜治方

解五石毒第三論方

論曰人不服石以庶事不佳惡瘡疥癬溫疫

瘡疥年年常患寢食不安興居常惡非止已事不康生子難育所以石在身中萬事休泰要不可服五石也人年三十已上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上三年可服一劑六十已上二年可服

一劑七十已上一年可服一劑

又曰人年五十已上精華消歇服石猶得其力六十已上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足溫暖骨髓充實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服之凡石皆熟鍊用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發作有時狀如溫瘡但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止一切冷食惟酒須溫其諸解法備如後說其發背疽腫方見別卷入曰凡服石人甚不得雜食口味雖百品具

陳終不用重食其肉諸雜既重必有相賊聚積不消遂動諸石如法持心將攝得所石藥爲益善不可加余年三十八九嘗服五六兩

乳自是以來深深體悉至於將來節度頗識其性養生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地清白光潤羅紋烏翻一切皆成白可入眼其非土地者慎勿服之多皆殺人甚於鴉毒紫石白石極須外內映徹光淨皎然非此亦不可服寒石五石更生散方舊說此藥方上古名賢無此漢末有何侯者行用自皇甫士安已降有進餅者無不發背解體而取顛

覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者不一所以寧食野葛不服五石明其大大猛毒不可不慎也有識者遇此方即須焚之勿久留也今但錄主對以防先服者其方以從煙滅不復須存爲含生害也

葱白豉湯鍾乳對木又對枯萎其治主肺上通頭胷木動鍾乳胷塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣有時木動鍾乳直頭痛胷乳

寒然鍾乳與木爲患不過此也雖所患不同其治一也發動之始要有所由始覺體中有異與上患相應宜速服此方

葱白半升  
甘草半升  
人參一升

甘草三兩  
桂心二升  
豉半升

右四味㕮咀先以水一斗五升煮葱白作湯澄取八升內藥煮取三升分三服繞服便使人按摩搖動口中嚼物然後仰卧覆以煖衣汗出去衣服湯熱歇即使冷淘飯燥脯而已若服此不解復服

桂心湯方

甘草三兩

桂心二兩

豉半升

葱白半升

桂心二兩

豉半升

右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣復服

桂心湯方

桂心

麥門冬各三兩

人參

甘草各二兩

豉二升

葱白半升

右六味合服如前法此方與時復散登身體生瘡步門冬湯方

用重分兩小劑

杜仲湯硫黃對防風又對細辛其治主脾腎  
通主腰脚防風動硫黃煩熱脚疼腰痛或噴  
忿無常或下利不禁防風細辛能動硫黃而  
硫黃不能動彼始覺發便服此方

杜仲三兩

枳實

甘草

李核仁各二兩  
杏豉一升  
梔子仁十四枚

大麥奴湯方

右六味合服如上法若不解復服

右凡五味合服如上法頻服得下便止不

下服盡若熱勢未除視瞻高而患渴復服

大麥奴四兩

甘草

人參

桂心各二兩

麥門冬半斤

○右六味合服如上法若服此已解脾胃猶  
有餘熱氣或冷復服

人參湯方

人參四兩

乾薑

甘草

當歸各一兩  
附子一枚

硝石湯方

右五味合服如上法

生麥門冬湯白石英對附子其治主胃通主  
脾腎附子動白石英煩熱腹脹白石英動附  
子嘔逆不得食或口噤不開或言語難手脚

疼痛始覺發宜服此方

參二兩  
右七味合服如上法若腹脹去硝石用入

生麥門冬四兩  
甘草

麻黃各二兩

豉升

右四味合服如上法不解更服

大黃湯方若煩加細辛五兩

大黃三兩

豉升

甘草二兩

人參湯紫石英對人參其治主心肝通主腰  
脚人參動紫石英外臺云細辛人急而痛  
或驚悸不得眠卧恍惚忘誤失性發狂昏昏  
欲眠或憤憤喜噴或瘞或劇乍寒乍熱或耳  
聾目暗又防風雖不動紫石英紫石英猶動  
防風紫石英為藥中亦有人參銀防風動  
人亦心痛煩熱頭項強始覺服此方

○右六味合服如上法若噴盛加太黃芩  
梔子各三兩若忘誤在發猶未除服  
生麥門冬湯方外臺此方治參石發

人參各三兩  
白朮各三兩  
甘草外臺無

桂心各二兩  
細辛一兩  
豉升

生麥門冬各半斤  
葱白各半斤  
甘草三兩

○右五味合服如上法溫牀暖覆牀下著大  
口中嚼物使身稍汗一日便解若心有餘  
熱更服

人參湯方

人參一兩  
防風

甘草各三兩

桂心兩 生薑

白朮兩各一

右六味合服如上法

大麥麯方赤石脂對桔梗其治主心通主胃  
背桔梗動石脂心痛寒噤手腳逆冷心中煩  
悶赤石脂動桔梗頭痛目赤身體壯熱始覺  
發宜溫清酒飲之隨能否須酒勢行則解亦  
可服此方

大麥熬令汗出燥止勿令大焦春去皮

細擣絳節以冷水和服之千金萬云妙  
今寒暉乾然  
今香乃為本

○葱白豉湯譽石無所偏對其治主胃發則令  
人心急口噤骨節痙攣強或節生瘡始覺發  
即服此方外臺云  
大麥門冬湯

葱白半斤 豉半升

甘草兩

右三味以水六升煮取二升半分三服若

散發身體卒生瘡宜服

生麥門冬湯方

生麥門冬五兩 甘草三兩

人參一兩半 葱白半斤

右六味服如解鍾乳湯法

木對鍾乳木發則頭痛目疼或舉身壯熱解

如鍾乳法

附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆  
手腳寒體強骨節痛或項強面目滿腫發則  
飲酒服之自愈若不愈與白石英同解

人參對紫石英人參發則煩熱頭項強與紫  
石英同解

大黃黃芩湯桔梗對赤石脂又對茯苓又對  
牡蠣桔梗發則頭痛目赤身體壯熱解與赤

石脂同桔梗發則壯熱煩悶宜服此方

大黃

黃芩

梔子仁三分

豉半升

葱白半斤

甘草二兩

右五味㕮咀以水六升煮取二升半分三  
服

牡蠣發則四肢壯熱心腹煩悶極渴解與赤

石脂同

乾薑無所偏對

桔梗根湯海蛤對桔梗海蛤先發則手足煩

熱桔梗先發則寒寒清涕出宜服此方

赤石脂紫石英發宜飲酒得酒即解凡藥發

或有宜冷或有宜飲酒不可一槩也

桔子仁十四枚

右四味合服如解鍾乳法

白石英發先腹脹後發熱  
石硫黃發通身熱兼腰膝痛  
譽石英發遍身發熱兼口噤  
茯苓發頭痛而煩渴熱

桔梗發頭面熱  
海蛤發心中發熱七上降海  
外宜浴  
紫石英發乍寒乍熱

赤石脂發心噤身熱頭目赤二上  
朱宣酒

石硫黃譽石桔梗牡蠣茯苓此五物發宜浴  
白石英亦可小浴其餘皆不宜浴譽石發宜  
用生熱湯茯苓發熱多攻頭即以冷水洗身  
漬之

浴法初熱先用緩水後用冷水浴時慎  
不可洗頭垂沐可以二三升灌之丸藥  
宜浴便得解即佳不瘥可餘治之

或有宜冷或有宜飲酒不可一槩也

又一法云寒食散發動者云草藥氣力易盡  
石性沉滯獨主胃中故令數發欲服之時以  
絹袋盛散一匕著四合酒中塞其口一宿後  
飲盡之其酒用多少將御節度自如舊法此  
則藥石之勢俱用石不住胃中何由而發事  
甚驗也

梔子豉湯治食宿陳臭肉及羹宿菜發者  
方

梔子一枚 香豉半升 甘草三兩  
右三味㕮咀以水八升煎取三升分三服  
○亦可加人參葱白

葱白豉湯治因失食發及飲酒過醉發者方

葱白一斤 豉半升 乾薑五兩  
右四味㕮咀以水七升煮取三升分三服  
不解宜服

理中湯方

人參

甘草

白朮

各三兩

乾薑二兩

右四味㕮咀以水六升煮取三升半分三

治癧發下利者方

人所爲燒將理自愈

其法前以冷物熨小腹已次以熱物熨

之又以冷物熨之若小便數此亦是取

眼  
人參湯治因脾怒太過發者方

人參 枳實

甘草各九分

乾薑

枯萎根各六分

右六味㕮咀以水九升煮取三升分三服  
○若短氣者稍稍數飲千全翼云子清作末下肺以溫其皮以湯七升兼取二升去滓

息在燭者燒若短氣者稍稍數飲千全翼云子清作末下肺以溫其皮以湯七升兼取二升去滓

內子末為再服

欖榔湯凡服散之後忽身體浮腫多是取冷  
過所致治之方  
欖榔三十枚搗碎以水八升煮取二升  
分再服千全翼云子清作末下肺以溫其皮以湯七升兼取二升去滓

欖榔三十枚搗碎以水八升煮取二升

分再服千全翼云子清作末下肺以溫其皮以湯七升兼取二升去滓

治凡散發瘡腫方

蔓菁子熟 杏仁 黃連

胡粉各一兩 水銀二兩

右五味別擣蔓菁子杏仁如膏以猪脂合

研令水銀減以塗上日三夜一

治散發赤腫者方

生地黃五兩 大黃一兩

生商陸三兩

杏仁四十枚

黑去滓摩腫上日三夜一

右四味切醋漬一宿猪膏一升煎商陸今  
冷熱熨法若大小便閉塞不通或財灑漏血  
陰中疼痛此是熱氣所致用此法即愈

治散發生細瘡者方

黃連 硫硝各五兩

右二味㕮咀以水八升煮黃連取四升去  
滓內硫硝令烊漬布取帖瘡上數敷易換

多少皆著之

治散發瘡痛不可忍方

冷石三兩下篩爲末粉瘡上日五六度

即燥須更痛亦定

治服散忽發痛方

乾薑五兩㕮咀以水五升煮取三升去

滓內塞一合和絞頓服不瘥重作

鴨通湯解散除熱方

白鴨通五升沸湯二斗半加之酒清取汁二斗

梔子仁二十粒 鳥糞三升

冷石二兩

甘草五兩

石膏三兩

○

右七味五味㕮咀以鴨通汁煮取六升去

滓內豉三沸分服五合若覺體冷小便快

闊其間若熱猶盛小便赤促服之不限五

合宜小勞當漸進食不可令食少但勿便

多耳

解散治盛熱實大小便赤方

升麻

大黃

黃連

甘草

黃芩各三兩

梔子仁十四枚

竹葉切四兩

○

右方

肥豬肉斤半

葱白

薤各半斤

○

右三味合煮治如食法宿不食旦服之令

盡不盡明日更服

人方治發動數數患熱因壓藥下之之方

盡不盡明日更服

人方治發動數數患熱因壓藥下之之方

適寒溫一服三合每日夜五六服多至

五六升二日稍隨大便下

○

人方作肥豬肉臚一升調如常法平旦空腹

頓服令盡少時腹中雷鳴鳴定藥下隨下以

器盛取用水淘得石不盡更作如前服之

豉一升 白鴨通五合

右十一味㕮咀以水三斗先煮鴨通竹葉

取一斗二升去滓澄清取一斗次內藥煮

取三升分三服若上氣者加杏仁五合腹

滿加石膏三兩

○

下散法治藥發熱因方千金翼云凡散數發等同用之

泰米三升作糜以成煎豬脂一斤和令

調宿不食旦空腹食之令飽晚當下藥

神良不盡熱發更合服之

○

孫真人備急千金要方卷之七十三