

不吉損男百倍令女得病有子必顛癡頑愚

瘡痘聾聵跛盲眇多病短壽不孝不仁又

避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈

圊廁之側塚墓戶枢之傍皆所不可夫交合

如法則有福德大智善人降託胎中仍令性

行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不

如法則有薄福愚癡惡人來託胎中仍令父

母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至

雖生成長家國滅亡夫禍福之應有如影響

○此乃必然之理可不再思之

○黃帝雜禁忌法曰人有所怒血氣未定因以

交合令人發癰疽又不可忍小便交合使人

淋莖中痛面失血色及遠行疲乏來入房為

五勞虛損少子且婦人月事未絕而與交合

令人成病得白駭也水銀不可近陰令人消

縮鹿猪二脂不可近陰令陰痿也

孫真人備急千金要方卷之八十三

孫真人備急千金要方卷之八十四 隱三

宋朝秦郎太常少卿充秘閣校理林億等校正

養性平脉方

平脉大法第一

徐七

論曰夫脉者醫之大業也既不深究其道何

以為醫者哉是以古之哲醫寤寐俯仰不與

常人同域造次必於醫顯沛必於醫故能感

於鬼神通於天地可以濟衆可以依憑若與

常人混其波瀾則庶事隳壞使夫物類將何

仰焉由是言之學者必當屏棄俗情凝心於

○此則和鶴之功因茲可得而致也

經曰診脉之法常以平旦陰氣未動陽氣未

散飲食未進經脈未盛絡脈調均氣血未亂

故乃可診有過之脉脉經云過此非也均脉動靜而

視精明察五色觀五藏有餘不足六腑強弱

形之盛衰可以此參互訣生死之分也

又曰平脉者皆於平旦勿食勿語消息體氣

設有所作亦如食項師亦如之既定先診寸

口初重指切骨定裏便漸舉指令指不厚不

薄與皮毛相得如三菽之重於輕重之間隨

人彊弱肥瘦以意消息進退舉按之宜稱其浮沉諸類應於四時五行與人五臟相應不爾者以其輕重相薄尋狀論寒暑得失

凡人稟形氣有中適有躁靜各不同氣脉

潮動亦各隨其性韻故一呼而脉再至一吸

而脉再至呼吸定息之間復一至合爲五至

此爲平和中適者也春秋日夜正等無餘分

時也其餘日則其呼而脉至多吸而脉至少

或吸而脉至多呼而脉至少此則不同如冬

夏日夜長短之異也凡氣脉呼吸法晝夜變

通微四時然於呼吸定息應五至之限無有。

病僻猶晷刻與四時有長短而歲功日數無

遺也若人有羸有壯其呼吸雖相壓邊而晝

夜息度隨其漏刻是謂呼吸象晝夜變通微

四時

夫診脉當以意先自消息壓取病人呼吸以

自同而後察其脉數計於定息之限五至者

為平人若有盈縮尋狀論病源之所宜也

問曰何謂三部脉答曰寸關尺也凡人脩短

不同其形各異有尺寸分三關之法從肘腕

中橫文至掌魚際後文却而十分之而入取九分是爲尺從魚際後文却還度取十分之一則是寸寸十分之而入取九分之中則寸口也此處其骨自高故云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入却行六分爲關分從

關分又入六分爲尺分

又曰從魚際至高骨却行一寸其中名曰寸

口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺

前名曰關陽出陰入以關爲界如天地人爲三界寸主射上焦頭及皮毛竟手上部關主

射中焦腹及腰中部尺主射下焦小腹至足

下部此爲三部法象三才天地人頭腹足爲三元也夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五臟六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口

者脉之大會手太陰之動脈也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人

一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於其身渴水下百刻禁衛行陽二十五度

行陰亦二十五度爲一周時故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五臟六腑

之所終始故法取於寸口人有三百六十脉

法三百六十日也

診五臟脉輕重法第二

初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部辛之氣初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部辛之氣

如六菽之重與血脉相得者心部丙丁之氣如六菽之重與血脉相得者心部丙丁之氣

如九菽之重與筋肉相得者脾部戊己之氣如九菽之重與筋肉相得者脾部戊己之氣

如十二菽之重與筋筋平者肝部庚辛之氣如十二菽之重與筋筋平者肝部庚辛之氣

如十六菽之重與筋筋平者腎部壬癸之氣如十六菽之重與筋筋平者腎部壬癸之氣

心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也

肺肝俱沉何以別之然牢而長者肝也

浮而短濶者肺也

微浮而短濶者肺也

按之更舉指來實者腎也

按之更舉指來實者腎也

浮脉舉之有餘按之不足

浮脉舉之有餘按之不足

脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也

脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也

表無裏革脉有似沈伏實大而長微弦千金翼以
革爲弦與緊相類輕與弱相類浮與芤相類
又曰浮與微與濡相類沈與伏相類緩與遲
洪相類又曰緩與遲相類與草與實相類真作守與實相類滑與數相類

五臟脉所屬第四

心部在左手關前寸口亦名肝部在左手關上
腎部在左手關後尺中

肺部在右手關前寸口亦名脾部在右手關上
腎部在右手關後尺中脉法讚云

肝心出左 脾肺出右 腎與命門
俱出尺部 魂魄穀神 皆見寸口

左主司官 右主司府 左大順男

右大順女 關前一分 人命之主

左爲人迎 右爲氣口 神門決斷

兩在關後 人無二脉 痘死不愈

諸經損減 各隨其部 三陰三陽

誰先誰後 陰病治官

陽病治府

如何捕取 奇邪所舍

審而知之

內陰陽 按察也

外陽病 治府也

亦官藏

針入病愈 脈有三部 陰陽相乘 荣衛氣血
而行人躬 呼吸出入 上下於中
因息遊布 津液流通 隨時動作
微象形容 春弦秋浮 冬沈夏洪
察色觀脉 大小不同 一時之間
變無經常 尺寸參差 或短或長
上下乖錯 或存或亡 痘輒改易
進退低昂 心迷意惑 動失紀綱
頑爲蟠陳 今得分明師曰子之所問
道之根源 脈有三部 尺寸及關
榮衛流行 不失衡鉉 腎沈心洪
肺浮肝弦 此自常經 不失銖分
出入升降 漏刻周旋 水下二刻
脈一周身 旋復寸口 虛實見焉
變化相乘 陰陽相干 風則浮虛
寒則緊弦 沈潛水畜 支飲急弦
動弦爲痛 數洪熱煩 設有不應
知變所緣 三部不同 痘各異端
太過可怪 不及亦然 疾不空見

終必有奸 審察表裏 三焦別分
知邪所舍 消息診看 料度腑臟
獨見若神 分別病形狀第五

於脉小血少病在心

而洪出於心脉下堅上

虛病在脾胃脉滑

一作而微滑病在肺脉大

而堅病在腎

而緊脉滑者多血少氣脉澀

者少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來大

而堅者血氣俱實脉小者血氣俱少又云脉

來細而微者血氣俱虛沈細滑疾者熱遲緊

爲寒

脉經云洪數滑疾爲寒脉盛滑緊者病在外

熱脉小實而緊者病在內冷脉小弱而濶

謂之久病脉滑浮而疾者謂之新病脉浮滑

其人外熱風走刺有飲難治脉沈而緊上焦

有熱下寒得冷即便下脉沈而細下焦有寒

小便數時苦絞痛下利重脉浮緊且滑直者

外熱內冷不得大小便脉洪大緊急病速進

在外苦頭發熱癰腫脉細小緊急病速進在

中寒爲疝瘕積聚腹中刺痛脉沈重而直前

中寒爲疝瘕積聚腹中刺痛脉沈重而直前

絕者病血在腸間脉沈重而中散者因寒食成癥脉直前而中散絕者病消渴一云病脉沈重前不至寸口徘徊絕者病在肌肉通戶脈左轉而沈重者氣微陽在胃中脉右轉出不至寸口者內有肉癥脉累累如貢珠不前至有風寒在大腸伏留不去脉累累如止不至寸口輕者結熱在小腸膜中伏留不去脉直前左右彈者病在血脉中肝血也脉後而左右彈者病在筋骨中也脉前大後小即頭痛目眩脉前小後大即胃滿短氣上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰太素作滑則氣少濡則心痛渾渾革革至如涌泉病進而危弊弊絳絳其去如弦絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而弦急者病在內浮而洪大者病在外脉實者病在內脉虛者病在外上爲表在下爲裏浮爲在表沈爲在裏滑爲實爲下又爲陽氣裏數爲虛爲熱浮爲風爲

虛動爲痛爲驚沈爲水爲實又爲鬼疰弱爲虛爲悸遲則爲寒瀆則少血緩則爲虛洪則爲氣一作熱緊則爲寒弦數爲瘡瘍脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則爲虛代散則死弦爲痛彈爲風痙偏弦爲飲變弦則脇下拘急而痛其人瀆瀆惡寒脉大寒熱在中伏者霍亂安卧下利胃中虛冷此等其脉並緊浮而大者風浮大者中風頭重鼻塞浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉滑而浮散者攤緩風滑爲鬼疰瀆而緊彈病浮洪大長者風眩癲疾大堅疾者癲病弦而鈎脅下如刀刺狀如蠻尸至困不死緊而急者遁戶洪大者傷寒熱病浮洪大者傷寒秋吉春成病浮而滑者宿食浮滑而疾者食不消脾不磨短疾而滑酒病浮而細病微數雖甚不成病不可勞浮滑疾緊者以合百病久易愈陽邪來見浮洪陰邪來見沈細水穀來見堅實脉來乍大乍小乍長乍短者爲祟脉來洪大嫋嫋者祟脉來沈沈澤澤四肢不仁而重土祟脉與肌肉相得久持之至者可下之弦小緊者可下之緊而數寒熱俱發必下乃愈弦遲者宜溫藥緊數者可發其汗

三關主對法第六

諸浮諸弦諸沈諸緊諸瀆諸滑若在寸口屬

諸浮諸弦諸沈諸緊諸瀆諸滑若在寸口屬

以上病頭若在關上胃以下病腹若在尺中
臂以下病腰平寸口脉主對法寸口脉滑而遲不沈不浮不長不短爲無病左右同法寸口太過與不及寸口之脉中手短者曰頭痛中手長者曰足腰痛中手促上擊者曰肩背痛寸口脉沈而堅者曰病在中寸口脉浮而盛者曰病在外寸口脉沈而弱者曰寒熱及疝瘕小腹痛又作中寸口脉沈而弱者曰寒熱必墮落寸口脉沈而緊苦心下有寒時時痛有積邪寸口脉沈而滑者胃中有水氣面目腫有微熱爲風水寸口脉沈大而滑沈即爲血實滑即爲氣實血氣相搏入臟即死入腑即愈寸口脉沈而緊苦心下寒者寒熱寸口脉浮而滑頭中痛寸口脉浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有滯氣宿食寸

口脉弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒水流走腸間寸口脉緊或浮腸上有寒肺下有水氣脉緊上寸口者中風風頭痛亦如之莫云亦爲傷寒頭痛脉弦上寸口者宿食降者頭痛寸口脉弦大婦人半生漏下男子亡血失精

寸口脉微而弱微即惡寒弱則發熱當發不發骨節痠煩當煩不煩與極汗出寸口脉微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汗出寸口脉動而弱動即爲驚弱即爲悸寸口脉緩而遲緩即爲虛遲即爲寒虛寒相搏則欲溫食食冷即咽痛寸口脉遲而緩遲則爲寒緩即爲氣寒氣相搏則絞而痛寸口脉遲而遲遲即爲寒遲爲少血脉來過寸入魚際者遺尿脉出魚際逆氣喘息寸口脉但實者心勞寸口脉激澈如糞上肥陽氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰兩手前部陽絕者苦心下寒毒。喙中熱寸口脉偏絕則臂偏不遂其人兩手俱絕者不可治寸口脉來暫大暫小者陰絡也苦陰風痺應時自發身洗洗也寸口脉來暫小暫大者陽絡也苦皮膚病汗出惡寒下部不仁寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府向火灸身摩治風膏覆令汗出寸口脉緊苦頭痛是傷寒宜服麻黃湯發汗針眉衝頸頸摩傷寒青寸口脉微

苦寒爲衄宜服五味子湯麻黃茱萸散令汗出寸口脉數即爲吐以有熱在胃管薦胃中宜服藥吐之及針胃管服除熱湯若傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜服知母湯寸口脉洪大胃脹滿宜服生姜湯白薇丸亦可紫菀湯下之針上管期門章門寸口脉緩

皮膚不仁風寒在肌內宜服防風湯以藥薄宜之佳矣諸治風穴寸口脉滑陽實管中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕寫之寸口脉弦心下幅幅微頭痛心下有水氣宜服甘草湯自養調和飲食針胃管一作三里補之逐九針期門寫之寸口脉弱陽氣虛弱自汗出宜服茯苓湯內補散將適飲食消息勿極。勞針胃管補之寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針胃管一作三里補之寸口脉芤吐血微芤者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黃土湯炙腫中寸口脉伏胃中運氣宣塞是諸氣上衝會中宜服前胡湯大建九針巨闕寫寸口脉沈管中引胃痛會中水氣宜服澤漆湯針巨闕寫之寸口脉輕弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯葛根丸內補散牡蠣散并粉針大衝補之寸口脉

遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯
生薑湯茱萸丸調和飲食以暖之寸口脉實
即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛則生寒在脾胃
食不消化熱即宜服竹葉湯葛根湯寒即茱
萸丸生薑湯寸口脉細發熱嘔吐宜服黃芩
龍膽湯吐不止
脈經云入大黃
陽而治之佳
針巨闕下管漏之關上脉微
開脈主對法關上脉浮而大風在胃中張口
肩息心下澹澹食欲嘔閑上脉微浮積熱在
胃中嘔吐蛇蟲心健忘關上脉滑而大小不
均必吐逆是爲病方欲來不出一二日復欲
發動其人欲多飲飲即利如利止者生不
止者死關上脉緊而滑者蛇動關上脉弦而
長大
異作有痛
云有疾在腑
左右上下
關上脉澀而堅大而實按之不
減有力爲中焦實有伏結在脾肺氣塞實熱

胃管先漏後補之關上脉緊心下苦滿痛脉
緊爲實宜服茱萸當歸湯又加大黃二兩佳
食不消化熱即宜服竹葉湯葛根湯寒即茱
萸丸生薑湯寸口脉細發熱嘔吐宜服黃芩
龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗湯爻中府平
開脈主對法關上脉浮而大風在胃中張口
肩息心下澹澹食欲嘔閑上脉微浮積熱在
胃中嘔吐蛇蟲心健忘關上脉滑而大小不
均必吐逆是爲病方欲來不出一二日復欲
發動其人欲多飲飲即利如利止者生不
止者死關上脉緊而滑者蛇動關上脉弦而
長大
異作有痛
云有疾在腑
左右上下
關上脉澀而堅大而實按之不
減有力爲中焦實有伏結在脾肺氣塞實熱

脉伏有水氣滯泄宜服水銀丸針關元利小
便止溏泄便止關上脉洪胃中熱必煩滿宜
服平胃丸針胃管先漏後補之關上脉沈心
下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇丸茯苓丸附
九針巨闕補之關上脉數胃中有客熱宜服
知母湯一作黃芩
除熱湯針巨闕上管漏之關上
胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子
丸針巨闕補之關上脉數胃中有客熱宜服
知母湯一作黃芩
除熱湯針巨闕上管漏之關上
脉緩不欲食此脾胃氣不足宜服平胃丸補
脾湯又針章門補之關上脉滑胃中有熱滑
爲熱實氣滿故不欲飲食即吐逆宜服朴硝
麻黃湯平胃丸一作宜服紫苑湯
參大平胃丸
針胃管漏
之關上脉弦胃中有冷心下厥逆脉弦胃氣
虛宜服茱萸湯溫調飲食針胃管補之關上
脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱爲虛熱作病
且說云有熱不可大攻之熱去即寒起正宜
服竹葉湯針胃管補之關上脉細虛腹滿宜
服生薑湯茱萸蜀椒湯白薇丸針灸三管關
上脉澀血氣逆冷脉澀爲血虛宜服乾地黃
湯四補散針足太衝上補之關上脉芤大便
去血宜服生地黃并生竹皮湯爻腸輸若重
爲虛滿宜服平胃丸茯苓湯生薑前胡湯針
下去血針關元甚者服龍骨丸附元一
關上

即爲妊娠尺脉來而斷絕者男子小腹有滯

氣婦人月水不利尺脉俱軟弱內溫熱手足

逆冷汗出尺脉俱沈關上無有者苦心下喘

尺脉俱沈關上若有苦寒心下痛陰中冷脚

痺尺脉俱微少心力不欲言血氣不足其人

腳弱短氣尺脉俱數手足頭面有熱俱遲有

寒手足頭面有冷風尺脉浮下熱風小便難

宜服瞿麥湯滑石散針橫骨關元瀉之尺脉

緊脣下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之

尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建

中湯針氣海尺脉數惡寒脣下熱痛小便赤

黃宣服鷄子湯白魚散針橫骨瀉之尺脉緩

黃宣服鷄子湯白魚散針橫骨瀉之尺脉緩

湯瞿麥散針橫骨瀉之尺脉滑血氣實經脉

不利宜服朴硝煎大黃湯下去經血針關元

瀉之尺脉弦小腹疼小腹及腳中拘急宜服

建中湯當歸湯針氣海瀉之尺脉弱氣少發

熱骨煩宜服前胡湯乾地黃茯苓湯針關元

補之尺脉澀足脰逆冷小便赤宜服附子四

逆湯針足大衝補之尺脉孔下焦虛小便去

血宜服竹皮生地黃湯炙丹田關元尺脉伏

小腹痛癥疝水穀不化宜服大平胃丸桔梗

丸針關元補之尺脉沈腰背痛宜服腎氣丸

針京門補之尺脉軟脚不收風痺一無此字

便難宜服瞿麥湯白魚散針關元瀉之尺脉

牢腹滿陰中急宜服革釐子茱萸丸針丹田

關元中極尺脉遲下焦有寒宜服桂枝丸針

氣海關元瀉之尺脉實小腹痛小便不禁宜

服當歸湯加大黃一兩利大便針關元補之

孫真人備急千金要方卷之八十四

孫真人備急千金要方卷之八十五 暈三

宋朝奉郎太常少卿充秘閣校理林衡等校正

平脉方

人病有積有聚有穀氣穀一作藥夫積者藏病終

不移也聚者腑病發作有時展轉病移爲可

治也穀氣者腸下牽痛按之則愈愈復發爲

不移也聚者腑病已愈不得復發令病復發即爲穀

氣也諸積大法脈來而細軟附骨者爲即也

寸口結積在胷中微出寸口積在喉中關上

結積在脣傍微下關者積在心下脉出在左積在左

在氣衝上關上積在心下脉出在左積在左

脉出在右積在右脉兩出積在中央各以其

部處之寸口沈而橫者脇下及腹中有積積

痛其脈弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒

疝瘕

脉弦緊而細微者瘕也夫寒痺癥瘕積聚之

脉狀皆弦緊若在心下即寸弦緊在胃管即

關弦緊在脣下即尺弦緊一曰關脉長弦有

積在脣左右上下