

臨泣主小兒驚癇反視

顙息主小兒癇喘不得息

然谷主小兒臍風口不開善驚

瘻脉長強主小兒驚癇瘻癰嘔吐泄注驚

恐失精暗視不明賜

懸鍾主小兒腹滿不能飲食

諺語主小兒食晦頭痛

孫真人備急千金要方卷之九十三

急救仙方序

側一

醫之療疾莫難於婦人婦人之疾莫重於胎

產胎產之重者何蓋以一身之疾否繫乎母

予之存亡故千金方部居獨以婦人列其首

此思邈孫真人之用心不苟矣世之胎產諸

方不爲不富然其間多犯冗僻貴冗則倉卒

之際難備僻則窮鄉下邑難得貴則貧窶之

家難求是三者雖非君子用心之不周而人

之蒙其惠者往往求什一於千百今此方之

編分爲三類末附以雜病雖不能如諸方之

廣載博該要之不犯冗僻貴而凡胎產危急

之證大略亦盡之矣俾倉卒之際窮鄉下邑

貧窶之家皆得易而求之雖一草一木足以

收效豈若前三者之難爲功哉苟有用者始

信其爲閨門之重寶云金川徐守貞序

急救仙方卷之一

妊娠諸疾品

木芩湯治婦人胎孕不安

白木黃芩各等分

右爲粗末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍溫服

立效散治胎動不安如意物所墜冷如冰

川芎當歸各等分

右爲粗末每服五錢水煎食前溫服或下血心腹痛酒水相半煎服

連皮縮砂不以多少炒黑去皮

保安散治妊娠因有所傷胎動疼不可忍及

血崩不止

右爲細末溫酒調下覺腹中熱則胎已安矣

治妊娠胎動不安或腰痛胞轉擔心下血不止

石菖蒲根姜汁三
升煎之

又方艾葉如雞子大以酒四升煮取二升分
二服良

又方檳榔一兩爲末葱白湯調下一錢七佳

二黃散治有孕胎漏下血

生地黃

熟地黃各等分

右爲細末每服三錢煎白朮枳殼調下
立聖散治妊娠下血不止

雞肝二具用好酒一升煮熟共酒食之大

枳芩散治胎漏下血或因事下血

枳殼去核半兩炒黃芩半兩

白朮二兩

○治妊娠誤有失墜或推築著疼痛難忍
○當歸一兩新青竹茹合

右爲粗末每服五七錢水煎去滓食前服

○右以好酒二升煮十數沸分三服

又方以川芎爲末每服二錢溫酒調下

○治妊娠因頓躊躇動不安腰痛腹滿或有所
下或胎上捨心

熟地黃二兩

白芍藥甘草各一兩

阿膠炒珠

黃蓍

右㕮咀每服半兩姜三片棗一枚水煎服

火龍散治妊娠心氣痛

艾葉半兩鹽茴香半兩

川練子半兩

葶藶二兩

白朮五兩白茯苓

桑白皮

郁李仁各二兩

右爲粗末水六升煮取二升分三服小便

利即差

又方澤瀉二兩

葶藶二兩

茯苓

通氣散治妊娠腰痛狀不忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒熟爲末嚼

○

胡桃肉一箇空心溫酒調下三錢

芎歸湯治妊娠胎動子死或不死

川芎當歸各等分

○

右㕮咀每服三五錢加紫蘇數葉酒水合

○煎服死者即下未死者即安

○

黃連湯治妊娠兒在腹中啼

○黃連二兩生甘草錢

○

右濃煎汁令母呷之

○又方以多年空屋下鼠穴中土一塊令母噙

○

○治妊娠從脚上腫至腹小便微利微渴引飲

○猪苓五兩

○

○右爲末以熟水服方寸七日三

人參散治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參一兩厚朴一兩姜蜜

陳皮一兩

鴉鴉散
生炒一兩

十一

右爲粗末都作一服生姜三片同煎食前

服神效

治妊娠挾熱下痢

黃連
一兩

黃柏
一兩

桔子仁
十枚

右咬咀每服五錢水二盞浸三時火煮十

沸去滓頓服加生姜橘皮

治妊娠下利腹痛小便澁

糯米
一合

當歸
一兩炒

黃耆
一兩

○右細切和勻水二盞煮取一盞二分去滓

分四服

黃連散治妊娠下痢赤白膿血久不止

黃連
八錢

厚朴
姜制一錢

阿膠
一錢

當歸
各六錢

艾葉
一錢

黃柏
各四錢

乾姜
一錢

右爲細末空心米飲調下方寸七日三服

治妊娠小便不禁

桑螵蛸
十二錢

右爲細末每服二錢空心米飲調下

白薇散治妊娠遺尿不禁

白薇

白芍藥
炒各半錢

天門冬
去心一兩

貝母

人參

甘草

桑白皮

桔梗

紫苑

天門冬
去心一兩

桔梗

右咬咀每服四錢姜三片水煎服服藥忌

食鯉魚

紫苑湯治妊娠嘔吐不止胎不安

紫苑

天門冬
去心一兩

桔梗

甘草

桑白皮

杏仁

防風
一兩

天門冬
去心一兩

桔梗

右咬咀每服三錢竹茹一塊水煎去滓入

蜜半匙再煎二沸溫服服藥忌食鯉魚

人參

桔紅

白朮

麥門冬
去心一兩

甘草
三錢

厚朴
一錢

白茯苓
各半錢

右爲粗末每服四錢入淡竹葉薄子大生

姜三片水煎空心食前服

加味四物湯治妊娠傷寒諸證

熟地黃

當歸

川芎

右爲細末每服四錢入淡竹葉薄子大生

姜三片水煎空心食前服

桔梗散治妊娠肺壅及外傷風寒咳嗽喘急

桔梗

當歸

川芎

右㕮咀每服四五錢水煎服
若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊加麻黃
細辛
若妊娠傷寒中風表裏自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱加黃耆地骨皮
若妊娠傷寒中風濕之氣肢節頑痺脉浮而熱頭痛加防風蒼朮
若妊娠傷寒胃脹滿痛而脉弦加柴胡黃芩
若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉
○數加大黃生桃仁去皮尖炒
若妊娠傷寒小便不利加茯苓澤瀉
若妊娠傷寒小便赤如血狀者加琥珀茯苓
若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛
脉沉而遲加附子炮去皮用
若妊娠傷寒畜血證加生地黃酒浸大黃
若妊娠傷寒身熱大渴蒸又而熱脉長而大者加石膏知母
若妊娠傷寒下後過解而不愈溫毒發斑

如錦紋加升麻連翹
若妊娠傷寒下後咳嗽不止者加人參五味子
若妊娠傷寒下後虛痞腹滿加厚朴姜枳實沙参
若妊娠傷寒下後不得眠者加施子黃芩
若妊娠傷寒汗後血漏不止胎氣損者加阿膠炙甘草黃耆
若妊娠脉浮頭腫自利腹中疼痛去地黃加桂枝
○若妊娠傷寒自利腹中痛飲食不下脉沉者去地黃川芎加白朮炙甘草茯苓加黃耆
護胎法治妊娠傷寒
白蘿子不拘多少爲末用雞子清調攏於紙花上可捲來大貼在臍下胎存處乾則以溫水調之
○右每服四錢姜四片淡竹葉十四片水煎服
柴胡散治妊娠傷寒頭痛項強身熱口乾脣渴
柴胡 前胡 川芎 當歸 人參 茯苓 甘草 生地黃各半
右爲細末每服四錢姜三片棗三枚葱白三根水煎出汗
秦艽散治妊娠傷寒五六日不得汗口乾多

白朮散治妊娠煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆不下食
白朮 桔紅 人參 前胡 川芎 麥門冬去心
赤茯苓各一兩半夏湯洗 甘草各半
升麻 石膏各一兩 黃芩 麥門冬去心
知母各五錢 麻黃去馬脚 蒼朮炒 麥門冬去心
○右每服四錢姜四片淡竹葉十四片水煎服
秦艽散治妊娠傷寒頭痛項強身熱口乾脣渴
柴胡 前胡 川芎 當歸 人參 茯苓 甘草 生地黃各半
右爲細末每服四錢姜三片棗三枚葱白三根水煎出汗
秦艽散治妊娠傷寒五六日不得汗口乾多

嗽水狂語嘔逆

秦艽

柴胡各一
兩

石膏二
兩

前胡

赤芩芩
各半

甘節
兩

葛根

犀角屑
各半

升麻
兩

黃芩
各半

升麻
兩

葛根
兩

右每服四錢姜四片竹茹三錢水煎

防風葛根湯治妊娠中風腰背強直時復反

○

防風

葛根

川芎
兩

川芎
兩

甘草

澤瀉
兩

石膏

甘草

甘草

甘草

生地黃
二
兩

杏仁
一
兩半

麻黃
去節
半
兩

白茯苓
兩

桂心
炒各
二兩

獨活
兩

甘草

人參
各三
兩

甘草

甘草

桂心
少
兩

獨活
兩

甘草
兩

柴胡
兩

生大黃
各二
兩

黃芩
一
錢

甘草
錢

甘草

甘草

防己
各一
兩

獨活
兩

甘草
兩

甘草
錢

柴胡
兩

生大黃
各二
兩

黃芩
一
錢

甘草
錢

甘草

右哎咀每服四錢水煎

治妊娠中風角弓反張口噤語濶謂之風癇

亦名子癇

麻黃
去
兩

桂心
少
兩

升麻
兩

甘草
兩

又方大黃
二
兩

柴胡
一
兩

黃芩
兩

甘草
錢

羚羊角屑
酸棗仁
各半

秦艽
各半

甘草
兩

芍藥
一
兩

川芎
兩

當歸
半

杏仁
七
錢

甘草
錢

右哎咀每服四錢姜四片竹瀝一合水煎

右爲細末清水糊爲丸如桐子大每服百丸臨發日五更冷湯吞下隔兩時再服五

服

治妊娠臨月因發風症忽閼憤不識人吐逆

眩倒名子癇

葛根
兩

防己
兩

甘草
半

人參
半

知母
半

石膏
二
兩

麥門冬
去
心

甘草
兩

○

十九以利爲度

治妊娠癟疾發熱口乾渴飲無度者

生地黃
半
兩

黃芩
一
兩

石膏
二
兩

甘草
兩

乾葛
一
兩

○

秦艽
柴胡各一
兩

石膏二
兩

葛根
兩

貝母
心去
皮

牡丹皮
兩

當歸
兩

甘草
半

乾葛
一
兩

石膏
二
兩

○

治妊娠癟疾得効方

常山
兩

石膏各一
兩

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

○

右哎咀每服五錢入烏梅半箇煎服

黃芩
各半
兩

烏梅
七
箇

石膏
各一
兩

甘草
錢

甘草
錢

○

治妊娠癟疾得効方

常山
兩

石膏各一
兩

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

○

右細切以酒水各一椀浸一宿平旦煎至

一椀去滓分二服臨發日

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

○

驗胎方治婦人經脈不行已經三月者

川芎
大
不見

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

○

右爲細末空心濃煎艾湯調下方寸七覺

腹內微動則有胎也

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

甘草
錢

○

急救仙方卷之一

急救仙方卷之一