

急救仙方卷之二

側二

產難諸疾品

枳殼散治婦人臨月服即合胎瘦易產

枳殼四兩各用炒甘草二兩生

右爲細末每服一二錢白湯調服

治孕婦日月未足疼痛而欲產者

菖蒲根搗汁灌喉中

又方蒲黃如棗許大井花水調下

又方知母三兩爲末蜜九桐子大每服二十

丸末飲下

如聖散治產難

紫蘇葉當歸各等分

右每服三五錢長流水煎服如無流水以

水順攪動煎服

又方以黃葵子百粒研爛酒湯住服立產

又方以好墨一寸末之水調服立產

又方取夫婦帶五寸燒末存性酒調服

又方草麻子二枚令婦兩手各把一枚即下

又方取槐樹東枝令孕婦把之易產

又方取阜角子二枚吞之立產

又方取槐子七粒新汲水吞之即產

又方取皂角少許末吹鼻中令嚏子便生

又方紫蘇煎湯調益元散服即產

治婦人臨產累日氣盡不能生兼惡露出盡

胞乾終不產者

右用赤小豆一斗水九升煮令熟去豆滓

將阿膠三兩入豆汁中溶化每服止半盞

未產再服即出

治婦人生產五七日不下及矮石女子交骨

不開者

右取自死龜殼或占卜廢骸酥炙或醋浸。

矣及用生男女多者婦人頭髮一握燒存

性以當歸川芎同煎服屢效約人行五里

生死胎俱下

烏蛇散治婦人逆產

烏蛇一條蟬蛻十四只血餘一隻麝

右三味燒爲灰分作二服溫酒調下併進

二服仰卧霎時兒即順生

又方用小絹針於小兒脚心刺三五下急用

鹽少許塗刺處即順生用鉗尖刺尤好

又方以鹽塗兒足底又可爪甲撞之并以鹽摩母腹上

又方以手中指取鍋底墨交畫兒足下即順生

又方取其父名書兒足下即順生

治婦人橫生不可出

右車前子爲末酒服二錢七

又方兔絲子爲末酒調服一錢七朱飲調亦可

治婦人橫逆生得效方

百草霜各等分香白芷不見火

右用童子小便與好醋各一合調成膏沸

湯浸服甚者二服即生

治婦人逆橫難產子死腹中

先用黑豆一合炒熱水與童便合煎眼神

效

又方艾葉半斤酒四升煮取一升服之

又方言歸爲末酒服方寸匕紫蘇湯調服亦可

奪命散治婦人產死腹中胎不下

桂二
枝 齋香宮門子一
粒

右件用爲末研酒服須臾即下

又方用鹿角屑三二方寸七煎葱豉湯和服之立出

又方用朱砂一兩水煮敷沸末之酒調服效

又方榆白皮煮汁服二升即出

又方取竈心土爲末以水調三錢七服之其

土兒富戴出

又方用瞿麥二兩剉水八盞煮三盞服一盞未出再服

○又方朴硝二錢溫童子小便調服亦治胞衣不出立效

又方用草麻子一百粒去殼雄黃末二錢一處研成膏攤紙上貼母右脚心先置冷水一椀才下急洗去亦治胞衣不下

治婦人產難已死子不出者

用水銀如彈子大幹開口灌之扶令坐少頃又扶令倚立子即出

祕方治婦人胎衣不下
取本婦裯覆井口立下

牡丹皮 白茯苓 桂心

桃仁去皮尖
赤芍藥

又方米麥赤小豆三味同煮濃汁服之即效

又方阜角刺不以多少燒灰存性爲末每服一大錢溫酒下

又方取竈下土一寸研碎用好醋調納於臍中取甘草湯服之

又方牛膝半斤以水九升煎取三升分三服

治婦人墮胎胞衣不下腹中疼痛牽引腰脊

用好墨細研每服二錢七溫酒下無時

治婦人落胎下血不止方

○又生地黃汁調代赭末一錢日三服

○取桑木中蠅蟲燒末存性酒服方寸匕日三服

治婦人落胎身下有血方

丹參十二兩以酒五升煎取三升分三服

治婦人小產下血子死增寒唇口爪甲皆青

面色白黃黑或胎上捨心則悶絕欲死冷汗

自出或食毒物傷動胎氣下血不止胎尚未

損服之可安已死者服之可下

又方紅花一兩分爲兩服酒童便各一盞煎

取一盞服

右各等分爲細末練蜜丸如彈子大每服

一丸細嚼淡醋湯下連進兩丸若胎腐爛

腹中危甚者立可取出

治婦人推腸生又名盤腸產益臨產則子腸

先出既產其腸不收

右以半夏爲末搐鼻中又以草麻子研膏

貼頂心腸上即拭去

○治婦人產後血暈不知人狂語顛倒健忘失志

○治婦人產後血暈不知人狂語顛倒健忘失志

○紫礦一
兩

右細研溫酒調二錢七服

又方用蘇合香丸童子小便煎一二沸調下

治產後血暈昏迷心氣絕

夏枯草絞汁服一盞炒

又方五靈脂二兩半生半炒爲細末每服一

錢溫酒調下口禁者幹開灌之加荆芥等分

爲末溫童便調下更妙

又方紅花一兩分爲兩服酒童便各一盞煎

取一盞服

又方半夏一兩爲末冷水和丸如豆大納鼻中即愈

又方醋磨京墨服之良

治產後血暈連心頭硬悶亂氣絕手腳煩熱及寒熱不禁

延胡索炒爲末酒服一錢七分亦治癓汗不盡脅腹脹滿

又方續斷皮二兩剉以水三升煎取一升分作三服溫服如人行二三里再服無忌雖垂死者亦愈

又方生地黃一兩當歸

赤芍藥各二兩半生地黃一兩當歸各二兩

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入

童便半盞服之

治產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者

乾荷葉 生地黃 牡丹皮

右等分煎湯調蒲黃二錢七分一服即定

治產後惡血衝心胞衣不下腹中血塊

錦紋大黃一兩研爲細末用釀醋半升熬成膏丸如桐子大用醋七分盞化五丸至七丸服之須臾即下

治產後血上心已死或胎不下

蠻金燒存性爲末每服二錢釀醋一合調

灌之立活

治產後敗血衝心脣滿上喘命在須臾

真血竭如無紫
紫代

沒藥

治產後敗血衝心脣滿上喘命在須臾

真血竭如無紫
紫代

沒藥

甘草二錢半

每服四錢水煎溫服

孤鳳散治產後閉目不語

白礬一錢

右爲細末熟水調下

治產後血不下

夏枯草絞汁每服一小盞入酒一合溫攪

勻服

又方蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

治婦人產後敗血未盡心腹脹滿

生姜切五兩

右以水五升煮三升分三服立效

治產後血癖痛

大黃一兩半當歸半兩官桂二錢

右以酒三升煮十沸頓服

治產後惡物不盡腹內疼痛

生乾地黃一兩半當歸一兩半黑

右以爲細末每服二錢姜酒調服神效

治產後心腹痛欲死

白薇湯

白薇一兩半當歸一兩半人參半兩

五靈脂 蒲黃各等分

右爲末先用鹽醋調二錢熬膏入水半盞

童便半盞煎七分食前熱服神效

治產後腹中絞痛不可忍

延胡索 川芎 當歸 茯苓

各等分

右爲細末每服三錢溫酒調下

治產後惡露不盡腰腹痛見枕痛並皆治之

延胡索 桂心 當歸

各等分

右爲細末每服三錢熟酒調服

○治產後內虛寒氣入腹腹中絞痛及兩脹當

臍急痛名曰寒疝

肥羊肉斤當歸 乾姜各等分

各等分

右咬咀以水一斗先煮取七升入藥更煮

再二升去滓分二服

治產後血瘕痛臍下脹不下食

當歸二兩桂心芍藥各半

各等分

蒲黃 同上 血竭 延胡索各一兩

各等分

腸肋膜去血碣加檀榔紫胡青木香

右爲細末每服二錢溫酒調下

治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參 一兩另蘇合香二兩

末隨多少如神效

右以水二椀煮蘇合香至一椀去滓調參

各等分

未隨多少如神效

治產後惡露不下三四日嘔逆壯熱

芍藥 二兩半 知母生地黃各一兩

當歸

○治產後心分作三服

右以水二升煎至一升去滓下蒲黃煎四

○治產後嘔吐不止

右以水二升煎至一升去滓下蒲黃煎四

○治產後嘔吐不止

右以水二升煎至一升去滓下蒲黃煎四

○治產後嘔吐不止

右以水二升煎至一升去滓下蒲黃煎四

○治產後嘔吐不止

右以水二升煎至一升去滓下蒲黃煎四

○治產後嘔吐不止

右以水二升煎至一升去滓下蒲黃煎四

右咬咀每服半兩水三盞煎至盞半去滓

食前熱服

治產後頭痛

川芎當歸荆芥穗各等分

各等分

右咬咀每服五錢水煎熱服

治產後下血不止

炙桑白皮煮水飲之良

又方菖蒲二兩以酒二升煮分作兩服止

○治產後下血虛羸殆死

蒲黃二兩水二升煮取八合頓服

○治產後子官不收

荆芥穗藿香葉各等分

右煎湯熏之子官即入

又方五倍子白凡爲末溫湯泡洗

又方草麻子搗塗頂心吸入即洗去藥

○治產後生腸不收

枳殼煎湯溫浸良久即入

○治產後陰下脫

蛇床子絹袋盛蒸熨之亦治陰戶痛

又方順火草一斤陰乾水五升煮取汁分溫服

又方以鐵爐中紫塵羊脂二味攬令稠布裹炙熱熨推納之差

治產後陰道關不閉

以石灰一斗炒黃水三斗投灰中放冷澄

清取一二升煖洗又治陰脣脫出

治產後中風寒遍身冷直口噤不識人

白朮兩 川芎一 生姜各一

當歸

○右以酒三升煎取一升頓服
○治產後中風語濶四肢拘急

羌活三 杏仁半兩去皮尖炒 官桂半兩

當歸

右爲末每服五錢酒水各半盞煎去滓溫
治產後中風煩渴

服

紅花五合微炒水一升煎取七合徐徐呷

之

治產後中風不省人事口吐涎沫手足瘓癰

當歸 荆芥穗各半兩
右爲細末每服三錢水一盞入酒煎七分灌之口噤者幹開灌小續命湯治產後中風腰強直時時反張或半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇濶防已 肉桂去皮 黃芩
芍藥 杏仁去皮尖炒 甘草
川芎 麻黃去根節 人參各一兩
防風半兩 附子去皮附 延胡索
當歸 蔡金
一方用黃芩麥門冬去心等分煎服
右並以好醋浸一宿焙乾爲細末每服二錢冷搗皮湯調下

治產後血渴不止

一方用黃芩麥門冬去心等分煎服

延胡索 蔡金
桂心 青皮
枳殼蜜炒各等分 乾薑

右咬咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分熱眼若藏寒下利者去防已黃芩
加白朮附子一倍若自汗者去麻黃杏仁
加白朮黃耆若失音者加杏仁一倍
治產後中風手足不遂語言蹇濶恍惚多忘精神不定

止

竹葉湯治產後虛渴少氣
竹葉三 甘草 人參
茯苓各一 小麥五 生姜
半夏各三 麥門冬去心十五兩 大棗十五

右咬咀以水九升先煮竹葉小麥生姜棗取七升去滓納藥再煎取三升去滓一服

五合日三服夜一服
若作丸已上皆加分兩

右㕮咀以水八升煮取二升半分爲三服

益元散治產後虛渴煎人參五味子麥門冬

亦可審丸服若有氣證加生姜一兩半若有熱加葛根五兩冷加白朮五兩若手足不穩加牛膝一兩二錢草薢三兩黃耆四兩

桂心

生姜

右同煎取二合以火先炙背摩令熱塗藥

盡妙

治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸

羸瘦

琥珀

牛膝

生地黃

當歸

桃仁

赤芍藥

當歸

赤芍藥

當歸

右爲粗末水煎服

若女蒸勞熱加地骨皮牡丹皮知母柴胡黃芩

若妊娠胎動不安下血不止者加艾十葉

阿膠黃耆葱

若血藏虛冷崩中去血過多亦加膠艾

若血崩者加生地黃蒲黃黃芩一加阿大艾黃芩

若血虛而腹痛微汗而惡風加莪朶官桂

若風虛眩運加秦艽羌活

若發熱而煩不得睡卧加黃連梔子皮

若氣虛弱起則無力眩然而倒加厚朴陳皮

若虛寒脉微自汗氣難布息清便自調加乾姜附子

若虛寒滑泄者加官桂附子

急救仙方卷之三

附三

若中濕身沈重無力身涼微汗加白朮茯苓

若筋骨節痛及頭痛增寒加羌活防風

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛加玄胡索本細辛

若經水過多別無餘證加黃芩白朮

若經水溢少加葵花紅花枳實

若虛勞氣弱咳嗽喘滿加姜製厚朴炒

若經水暴下加黃芩

若血積塊痛加莪朶三棱桂乾漆炒

若赤白帶下加香附子桂炒

若產後血痢腹痛疼加槐花黃連御米殼

若血熱相搏舌乾口渴加桔梗麥門冬

若大渴引飲加石膏知母

若藏府秘滯加大黃桃仁

若嘔吐者加白朮人參藿香生姜

若產寒滑泄者加官桂附子