

砂仁去毒 草果炒各 益智炒

丁香不見火 香附子洗 杜烏藥炒

紫蘇炒 厚朴去粗皮 桂枝不見

大腹皮四兩淨洗 右每服水一盞半生薑五片同煎七分去

滓空心服要溫切忌生冷毒物

腹疼加小茴香一撮四肢浮腫加陳蘿蔔

子炒入冷氣加吳茱萸炒入腰脚疼加川

牛膝酒洗不見火木瓜剉頭疼風證者加

防風去蘆北細辛去葉或加川烏湯炮去

皮尖生用焙姜汁煎四肢骨節痛加小茴

香炒感風惡寒者加葱白煎熱加葱白

熱退則止心氣不通喘急加麥門冬去心

每三粒或加燈心三寸作渴加烏梅每半

箇或加粉葛咳嗽加桑白皮向東取去粗

皮剉蜜炒乾再入蜜炒傷肺者加北五味

子或桑葉一皮向東取五心煩熱小便赤

加車前草節根蔗或燈心經脈來不已加

燒棕灰存性泄瀉加炒糯米一撮或肉豆

蔻催生用苧根三莖經脈敗正膠艾湯經

脈不勻加北艾葉浸洗炒乾用醋

真料濟陰丹治胎前產後百疾

淨香附子八兩二兩以咀好醋浸二兩

無灰酒浸二兩盪湯浸二兩用二三歲

童便浸一日夕長流水洗如無童便用

姜汁艾煎汁浸亦可已上共炒乾以

烏藥 當歸 澤蘭 赤芍 百草霜

陳皮 川芎 五靈脂 熟蒼木

右件共十一味為末醋煮麩糊為丸每服

三十九諸疾各湯使無孕加三稜義木白

芷各一兩桂半兩四味為末醋糊丸服產

後加百草霜或添益母草蜜浸炒乾為末

入煎藥內用

急救仙方卷之四

急救仙方卷之五

濟陰品四十一

調經

婦人經血有七七七七通行病難識非寒非

熱及頭疼次第調經不須夫

正胃湯

半夏

陳皮

右用姜煎空心服

平胃湯

人參

宿砂

右為末空心白湯調下

漏胎腹痛

漏胎下血不須醫乾熱孩兒梅莫追方內有

湯名縮住皆因妊母受災危

九婦人三兩月或五七月時下血塊多不

治曰漏胎

縮住湯

宿砂仁一 益智仁兩

樹五

右為末每服三錢空心白湯下  
安胎飲

香附子一兩去毛炒

右為末白湯下

手足疼痛

百節酸疼時復痛皆因勞役損精神梅煎散  
子加漆味溫酒時須活絡靈

九婦人四肢痛皆因先煎坐草時及經絡  
勞役受風入體

梅煎散

當歸

北柴胡

黃耆各半兩

覽甲

天仙藤

甘草各一兩

右為末熟酒調下

活絡丸

川烏

草烏各半兩

赤小豆

地龍各一兩

大蒜一貫

右為末酒煮糊丸熟酒下

腰脚痛

水觸經時經不行因而脚痛致腰疼但用流  
經調血藥治瘳速時別病生

九婦人脚疼腰痛皆因氣血凝滯多因經  
行之際水濕所觸任而不行流入脚經故  
成疾甚不轉側日夜呻吟不止或有發熱  
流經散

當歸

肉桂

川芎

威靈仙

黑牽牛各三錢

烏豆

烏藥

地黃各半兩

京芍藥四錢

牡丹皮二錢

右吹咀半酒半水煎服

頭疼

太陽頭疼血虛風漸漸疼加兩眼中先須補  
取陽經候項用麩風最有功

一字散

南星生

全蝎三錢

川芎

白芷

荆芥穗各二錢

右為末茶調下

頭暈

肝臟虛時眼堂花心中欲吐是痰邪早上起  
來痰量轉須知臟腑受寒邪

九婦人頭暈眼花不得起止心中欲吐是

肝虛受痰飲所致宜補肝行風化痰  
養金丸

茴香

香附子各半兩

草烏一兩

半夏曲兩

白茯苓

細辛各半兩

右酒麵糊為丸每服二十九食後酒下仍

以三五七散補之

腹常痛

經年積血在關元日夜呻吟不得眠青皮烏  
藥香附義木三枝方得痊

九婦人腹中常痛上下不足經年積血也  
立效散

立效散

青皮

陳皮

烏藥

乾姜

香附子

義木

三枝

右用醋煮焙乾為末空心陳皮湯下

消痛丸

乾漆

三枝各半兩

良姜一兩

斑猫三兩

右醋一升煮乾焙為末醋糊丸每服三十

丸醋湯下姜湯亦可

又方三稜

麥芽

半夏兩各四

義木

青皮

右醋六升煮乾焙為末醋糊丸每服二十丸醋湯或姜湯下

脇下刺痛

兩旁脇痛氣不通或時沖下氣連胃烏沈香附玄胡索七氣湯中加減功

九婦人兩脇痛小腹疼至胃背乃氣不順也

加減七氣湯

人參

桂各三錢

甘草

玄胡索

香附子

沉香各二錢

烏藥五錢

半夏四錢

右用姜煎不拘時煎服

小腸滿痛

血在三焦滿腹間或時淋瀝小便難萬靈散子通神用熱酒調加三兩食

九婦人小腹痛是血也熱也氣也注於三焦之內流於膀胱之中小便淋也或大小產後是遺經敗血所致

萬靈散

桂兩半

當歸兩

義木兩半

木香三錢

地黃六錢

右為末熱酒調下又以小建中湯補之小便淋瀝八正散本事方桃仁煎

手足心熱

經血行時受其濕致令心中熱來侵白朮柴

胡滋血後手足煩熱自然清

九婦人經行時手足受水觸血風所致手足心時時有煩熱先服磁石湯加柴胡

磁石湯

芍藥

地黃各二錢

白朮

甘草

地骨皮各三錢

北柴胡五錢

右吹咀水煎空心服往來寒熱

陰陽相勝致傷寒或是胎前雜病得但服柴胡加減湯一似燒湯去潑雪

九婦人寒熱往來此除陽相勝陰勝則寒陽勝則熱所受如是受胎雜病但服柴胡散

柴胡散

北柴胡

黃芩

甘草各三錢

荊芥

桂各三錢

地骨皮一錢

右吹咀水煎仍服小柴胡湯三五貼虛熱

虛熱來時日夜般兩手脈來微細看逍遙散內加香附竹葉煎時始得安

九婦人體熱脈微乃虛熱此妄血太過逍遙散

逍遙散

內加地骨皮

甘草各三錢

北柴胡五錢

黃芩

川芎各三錢

右吹咀用水煎空心服

背心疼痛

心生血者資脾養或因怒氣在於心就使背脊心相對痛烏頭丸最為靈

九婦人心能生血脾能養血或因怒氣沖犯於心致使氣血相搏在於胸膈故背脊心相對痛烏頭丸主之

烏頭丸

川烏一兩

川椒一兩

桂一兩

赤石脂兩 附子一箇 狼毒兩  
良薑兩

右為末蜜丸每服十九空心温酒米湯下

腹內脹痛

腹脹因綠氣血虛因而食積損於脾研砂丸

子頻煩眼不得消時盡有餘

凡婦人心生脹或腹內脹虛劣血氣因食

生冷傷於脾或月候不行血注於脾致使

然也若不懸脾順氣終成瘕疾難治

研砂丸

研砂三兩

川椒

右為末醋糊為丸每服三十九姜湯下

四肢腫毒

四肢腫毒便如水膚醫不識用藥餌米飲調

下當歸丸自然經脉化為水

凡婦人四肢腫痛乃經血不行流徧四肢

或腫而痛此因水濕所傷觸經而然

當歸丸

當歸兩

桂三

葶藶二

人參錢一 大黃三 赤芍藥二

白茯苓兩 甘遂兩

右用蜜丸彈子大米飲化下

皮肉如針刺

皮肉之中似針刺或時自吐嘔頻頻此是月

經傷冷得血痛元來自有因

凡婦人肌肉如針刺或時吐嘔者因月經

傷冷血痛但補胃熱方用止痛先服加乾

散次服立效散方見前

加乾散

沒藥

桂二

右為末酒調下

月候不乾

月經太過不乾時乃是氣虛之所為內補丸

中加使用鹿茸附子補三虛

歸茸丸

當歸兩

附子箇 牡丹皮

地黃三

人參三

鹿茸各三

右為末糊丸阿膠湯下

自痢下血

下痢之病有兩般赤是熱證白是寒腹痛時

時頻下痢八寶湯中服立安

凡婦人下痢赤白腹痛皆因受寒熱之邪

積於臟腑故有此證當先去熱然後調脾

胃

八寶湯

當歸兩

赤芍藥

右水煎服

調胃養中湯

人參

荳蔻各三

右為末米飲調下

喘嗽

皆因肺藏受風寒咳嗽痰涎喘不安但要安

胎調胃氣紫蘇湯點伏龍湯

凡婦人肺臟感寒邪而成嗽漸次傳脾吐

痰涎也治瘵之遲成血塊血勞也經喘不

通失音也  
伏龍湯

- 杏仁七 訶子五 陳皮
- 枳殼各三 阿膠七 麻黃二
- 青黛一

右為末蘇湯調食後再用調經散見二

產後血不乾

產後因何血不乾皆因傷損子宮寒日久漸加形體瘦弱成帶下不能安

丸婦人產後血不乾或一月之後其血黃

如灰汁者日久成帶

玉神散

- 毛頭紙十張 楮皮紙一大張
  - 荆芥穗一 半夏半
- 右用水酒同煎若有咳嗽金沸草散兼煮

煎服

小便赤澀

臍中有撮小便攻或在產前產後中葵子丸中三五服葱熨臍中宜便通

丸婦人小便赤澀腹中有熱如小便澀赤

兩津液血出多所以小便不尋常也

葵子散

- 木通兩半 當歸三 葵子二
  - 通草兩一 梔子三
- 右用水煎產後蔥熨臍中小便即通也

大便閉結

肺臟虛熱大便結此乃脾虛臟中竭薄奇湯照三四服自然通利熱須撤

丸婦人大便結肺臟受熱風血虛也

- 防風兩半 枳殼兩半 大黃兩二

右為末薄奇湯下

空腸丸

- 麻仁 厚朴 枳殼
  - 大黃 杏仁 川烏各半
- 右為末煉密丸米飲下

牙疼腫痛

牙疼腫痛是脾虛兩腭腫時風熱俱赴送散子頻頻漱續後補肝湯即除

丸婦人牙疼腭腫脾虛血弱氣不升降受

暴風熱但以祛風祛熱散灌漱

祛熱散

- 細辛 萆薢 附子皮
  - 川烏皮
- 右煎湯噙漱口滿吐之

補肝湯

- 肉苳菹生 陳皮兩半 白木兩半
  - 荆芥三 旋覆花三 良薑
  - 茯苓三
- 右為末米湯調下

腸風

大便之後血相隨名曰腸風氣有餘荆芥川烏為丸子黃著酒下便令除

丸婦人此證因房太過血不足氣有餘致有肛門澀痛

宣腸丸

- 川烏生 荆芥穗兩 枳殼兩一
- 右用米糊丸黃著酒下
- 吐血上行

經血行時反上行肺經有病熱冲然但要順

經調肺氣紅花散子善能痊

凡婦人吐血有三一經不行反上行便傷氣也二傷冲三肺經受熱隨上冲故便吐血

調肝散

三稜 莪朮各兩  
胡椒二錢 宿砂三錢 麥芽半兩  
茴香二錢 甘草三錢 川芎二錢  
陳皮三錢 青皮三錢

右為末米飲調下

通經丸

當歸一錢 桂不見 青皮去白  
大黃炮 乾漆炒令烟 乾薑炮  
川烏炮 桃仁炒 莪朮炒  
川椒各錢

右十味每味各同椒微炒放地上出汗為末一半用醋熬成膏後入一半更入雞子清同為丸陰乾醋湯下三十九

胎前腹痛

胎氣有餘腫脚經三陰受濕未能分治療先

須調去濕方可安胎治脚經

凡婦人孕七八月脚腫此胎氣流於三陰脚經至將月時經血大過氣隨血散先為去濕次與分氣飲

分氣飲

陳皮 甘草 赤茯苓各二錢  
蒼朮 木瓜 白朮各五錢  
右以姜漿煎服 筋掣發搐

風入肝經發為搐虛之太極又掣拳拳附湯中加減服要行氣脉自然痊

凡婦人氣虛太極肝經受風肝主筋受風則搐急不舒先散風

麥附湯 人參 附子生 甘草

細辛 白朮 乾姜各二錢  
右為末熱酒調服 偏身黃

面目偏身似橘黃其人經脉不尋常皆因房事其中其血若不醫之定不祥

凡婦人偏身黃疸名經水不調房事觸犯寸金散

黃臘五錢 白凡五錢 陳皮三錢  
右以黃蠟丸澀血湯調經湯吞下方上 語音不出

或時嗽後語音咽脫着傷風是亦然但用鹽湯乾與嚼血勞之病斷琴絃

凡婦人氣虛肺感風邪而失音有因嗽絕宜用脚經丸益暖姜過一宿早晨服之久失音者尤宜助桂湯

助桂湯

好真蘇子二兩 杏仁三十 訶子三  
百藥煎兩

右用熱酒調下 寒噎

氣不調和上膈寒致令寒噎吐痰涎丁香柿蒂枇杷葉自然塞去得安痊

凡婦人氣不順上膈受寒致寒噎不佳傷風者有此丁香散

丁香 柿蒂 枇杷葉

陳皮各半

右為末細嚼服

形容瘦瘠

氣不充時血不榮肌肉不長瘦其身谷重丸

子服兩月頰紅肥大長精神

丸婦人血弱血虛肌肉不長血海虛竭大

要調血氣

谷靈丸

黃芪 人參 牛膝

當歸各一兩 附子一枚

杜仲 蒼朮 白朮

桂 枸杞各三錢 茯苓五錢

右以酒糊丸人參湯下

數月懷胎經行如故

懷胎數月不能分飲食無妨經又行蘇合香

丸化水下鬼胎容忤不能逆

丸婦人懷胎三四月飲食無妨月經如常

此鬼忤怪氣在於臍腑是以滿腹宜服蘇

合香丸并花水早晨服

玉戶生瘡

玉戶生瘡時痛痒皆因房色損其元黃蔥水

洗兩三次杏仁燒灰油調瘡

丸婦人玉戶生瘡皆因月事受風房事太

過致生瘡名陰蝕宜黃蔥煎水洗吹用

杏仁散

杏仁內一

右燒灰清油調塗

身痛

右邊身痛為血逆左邊身痛氣所煎思慮風

寒於兩及此痛元來通一逆

丸婦人身痛右是血左是氣皆因受風濕

思慮交會氣血不調是氣勻氣湯是血勻

血湯

勻血湯

茴香

厚朴 甘草

桂 羌活

右等分木香湯下

勻血湯

當歸

沒藥

天仙藤

右等分為末熱酒調下

寒戰

身戰慄慄似見魔血寒之證實無他但信子

規靈有驗熱酒調和不用多

丸婦人戰慄者血寒也皆因傷風冷氣血

弱所以戰慄也

子規丸

荊芥

白芍藥

右為末熱酒調下

心酸

酸心病是脾胃寒胃中痰積致心酸陳皮麥

藥能除積養榮麥煎病日久

丸婦人有積飲痰證在脾胃間時時酸心

或吐水

茶葉丸

吳茱萸洗湯

蒼朮各一兩 陳皮白

麥芽 桂 神麴各五錢

右水煮麴糊為丸米飲下

耳聾

末後三旬耳怎聾皆因妄血受其風已戟丸中加附子更添腦麴取全功

九婦人風虛上攻如此但服已戟丸加附子溫酒下更服黃著湯已戟丸上局方

偏身麻痺

因虛受濕偏身麻不知癢痛眼生花氣血一時風毒感五補祛風大有加

凡婦人偏身麻痺謂之不仁皆因血風血虛受風濕所致

五補丸

黃耆兩一 人參錢五 附子一枚  
當歸錢三 白芍藥錢五

右煉蜜丸祛風散下

祛風散

生川烏 白朮 白芷

甘草各三錢

右溫酒調吞下五補丸

秦桂丸神澤別本得効

治婦人無子昔知金州范羅言乞以此方試令婦人服之四十九日如無子請罰臣一家以今天下何德易云雖其言自誇然實有異驗臣妻年廿七無子服此藥二十日便有孕殘藥以與石門縣令妻年三十四斷產已十六年服此便有娠又將殘藥與太子中守文季妻年四十無子服此速有娠其效如神不可具述乃仙方也

秦桂 桂心 杜仲

防風 厚朴各三錢 附子生一兩半

茯苓兩一 白薇 乾薑

沙參 牛膝 半夏各五錢

人參兩一 細辛一分

右十四味並生碾為末煉蜜丸如菘豆大每服三十九空心米飲任下未效更加數丸已覺有孕便不可服

急救仙方卷之五

急救仙方卷之六 捌六

仙授理傷續斷秘方序

此方唐會昌間有一頭陀結草庵于宜春之鍾村貌甚古年百四五十歲買數畝墾畝種粟以自給村氓有彭叟者常常往來其廬願情甚稔或助之耕一日彭之子升木伐條誤墜于地折頸挫肱呻吟不絕彭許于道人道人請視之命買數品藥親製以餌俄而痛定數日已如平時始知道人能醫求者益眾道人亦厭之乃取方授彭使自製以應求者且誓之以無苟取母輕售毋傳非人由是言治損者宗彭氏彭史之初識道人三十許今老矣然風采無異前時問其姓名曰蘭道者問其氏曰長安人也始道人閉門不通人事人亦少至惟一節先生州六每春暗秋乘攜稚過之必載酒散從馬道人縣一柳縣壁間鄰至則取瓢更酌彭或過之亦酌二人皆談笑竟醉醉則高歌其詞曰經世學經世學成無用者山中樂山中樂土堪耕鑿塵有酒同君