

麥芽 桂 神麴各五錢

右水煮麴糊為丸米飲下

耳聾

末後三旬耳怎聾皆因妄血受其風已戟丸中加附子更添腦麴取全功

九婦人風虛上攻如此但服已戟丸加附子溫酒下更服黃著湯已戟丸上方

偏身麻痺

因虛受濕偏身麻不知癢痛眼生花氣血一時風毒感五補祛風大有加

凡婦人偏身麻痺謂之不仁皆因血風血虛受風濕所致

五補丸

黃耆兩一錢 人參錢五 附子一枚  
當歸錢三 白芍藥錢五

右煉蜜丸祛風散下

祛風散

生川烏 白朮 白芷

甘草各三錢

右溫酒調吞下五補丸

秦桂丸神澤別本得効

治婦人無子昔知金州范羅言乞以此方試令婦人服之四十九日如無子請罰臣一家以今天下何德易云雖其言自誇然實有異驗臣妻年廿七無子服此藥二十日便有孕殘藥以與石門縣令妻年三十四斷產已十六年服此便有娠又將殘藥與太子中守文季妻年四十無子服此速有娠其效如神不可具述乃仙方也

秦桂 桂心 杜仲

防風 厚朴各三分 附子生一兩半

茯苓兩一 白薇 乾薑

沙參 牛膝 半夏各五錢

人參兩一 細辛一分

右十四味並生碾為末煉蜜丸如棗豆大每服三十九空心米飲任下未效更加數丸已覺有孕便不可服

急救仙方卷之五

急救仙方卷之六 捌六

仙授理傷續斷秘方序

此方唐會昌間有一頭陀結草庵于宜春之鍾村貌甚古年百四五十歲買數畝墾畝種粟以自給村氓有彭叟者常常往來其廬願情甚稔或助之耕一日彭之子升木伐條誤墜于地折頸挫肱呻吟不絕彭許于道人道人請視之命買數品藥親製以餌俄而痛定數日已如平時始知道人能醫求者益眾道人亦厭之乃取方授彭使自製以應求者且誓之以無苟取母輕售毋傳非人由是言治損者宗彭氏彭史之初識道人三十許今老矣然風采無異前時問其姓名曰蘭道者問其氏曰長安人也始道人閉門不通人事人亦少至惟一節先生附六每春暗秋乘攜稚過之必載酒散從馬道人縣一柳縣壁間鄰至則取瓢更酌彭或過之亦酌二人皆談笑竟醉醉則高歌其詞曰經世學經世學成無用者山中樂山中樂土堪耕鑿塵有酒同君

酌醉卧草廬誰喚覺松陰忽聽雙鳴鶴起  
 來日出穿林薄彭踏朴不知所言為何惟  
 熟聽其歌亦得其腔每歸對人歌之人亦  
 不省居久鄧先生不至彭問道人道人云  
 已仙去彭卒不悟後江西觀察使行部至  
 袁州聞彭所歌異之詰其詞得道人姓氏  
 遂遣人同彭叟至其廬邀之至則行矣惟  
 畚存馬廉大以為恨謂彭傳其治損諸方  
 因易其村曰肇道人有書數篇所授者持  
 其最後一卷云

理傷續斷方

醫治整理補接次第口訣

一煎水洗二相度損處三拔伸四或用力收  
 入骨五捺正六用黑龍散通七用風流散填  
 倉八夾縛九服藥十再洗十一再用黑龍散  
 通十二或再用風流散填倉口十三再夾縛  
 十四仍用前服藥治之

凡腦骨傷碎輕輕用手搏令平正若皮不  
 破用黑龍散敷貼若破用風流散填倉  
 口絹片包之不可見風著水恐成破傷

風若水與風入腦成破傷風則必發頭  
 疼不復可治在髮內者須剪去髮傳之  
 凡腦骨傷碎在頭骨上則可治在太陽穴  
 乃是命處斷然不可治矣

凡肩甲骨出相度如何整用荷當圍住脇  
 仍以軟衣被或草使一人捉定兩人拔  
 伸却墜下手腕又著曲著手腕絹片縛  
 之

凡金井骨在脇之下有損不可夾縛只是  
 捺平令安貼平正用黑龍散貼絹片縛  
 兩脇骨亦如此

凡跨骨從臀上出者可用三兩人捉定腿  
 拔伸乃用脚踏入如跨骨從檔內出不  
 可整矣

凡手骨出者看如何出若骨出向左則向  
 右邊拔入骨向右出則向左拔入  
 凡手脚骨皆有兩脛若一脛斷則可治兩  
 脛俱斷決不可治矣凡手脚骨傷甚者  
 不可治

凡傷損重者大藥要拔伸捺正或取開捺

正然後傳貼填塗夾縛拔伸當相近本  
 骨損處不可別去一節骨上

凡拔伸且要相度左右骨如何出有正拔  
 伸者有斜拔伸者

凡認損處只須揣摸骨頭平正不平正使  
 可見

凡左右損處只相度骨縫子細撫捺付度  
 便見大藥要骨頭歸舊要搏捺皮相就  
 入骨

凡拔伸或用一人或用兩人三人看難易  
 如何

凡皮破骨出差及拔伸不入搏捺相近爭  
 一二分用快刀割些捺入骨不須割肉  
 肉自爛碎了可以入骨骨入之後用黑  
 龍散貼倉之四圍腫處留倉口別用風  
 流散填所用刀最要快剝刀離刀皆可  
 凡捺正要時時轉動使活

凡骨碎斷須要本處平正如何大抵骨低  
 是骨不曾損左右看骨方是損處要拔  
 伸捺正用藥貼夾縛要平正方是

凡腫是血作用熱藥水泡洗却用黑龍散  
傳貼

凡傷重必用藥水泡洗然後塗藥如傷輕  
不必洗便塗藥

凡夾縛夏三兩日冬五三日解開夾縛處

用熱藥水泡洗去舊藥洗時切不可驚  
動損處了仍用黑龍散傳夾縛蓋傷重  
者方如此

凡皮破用風流散填更塗末破用黑龍散  
貼須用杉木及夾縛之

凡板伸捺正要軟物如絹片之類真之

凡皮裏有碎骨只用黑龍散傳貼後來皮

肉自爛其碎骨必然自出來然後方愈  
凡骨破打斷或筋斷有破處用風流散填  
塗却用針線縫合其皮又四圍用黑龍  
散傳貼

凡夾縛用杉木皮數片周回緊夾縛留開  
皆一縫夾縛必三度縛必要緊

凡半處骨碎皮不破用藥貼用密夾縛大  
緊看曲轉處脚凹之類不可夾縛恐後

伸不得止用黑龍散貼帛片包縛庶可  
曲轉屈伸有數處如指骨斷止用苧麻  
夾縛腿上用苧麻繩夾縛繩如錢繩許  
大

凡貼藥用版子一片將皮紙或油紙以水

調黑龍散攤勻在上然後卷之貼損處  
凡用杉皮浸約如指大片疎排令周匝用  
小繩三度緊縛三日一次如前淋洗換  
塗貼藥

凡曲縛如手腕脚凹手指之類要轉動用  
藥貼將絹片包之後時時運動蓋曲則  
得伸得伸則不得屈或屈或伸時時為  
之方可

凡傷損其初痺而不痛應拔伸捺正復用  
刀取開皮皆不痛三二日方痛

凡損一月尚可整理久則不可

凡損不可喫草藥喫則所出骨不能如舊

凡跌損腸肚中汗血且服散血藥如四物  
湯之類  
凡損大小便不通未可使服損藥蓋損藥

用酒必熱且服四物湯更看如何又服  
大成湯加木通如大小便尚未通又加  
朴硝待大小便通後却服損藥

凡傷重者未服損藥先服氣藥如勻氣散  
之類

凡澤身無故損痛是風損當服風損藥如  
排風湯之類

凡服損藥不可喫冷物魚牛肉極冷尤不  
可喫若喫牛肉痛不可治

凡損藥必熱使生血氣以接骨耳

凡服藥不拘在紅酒無灰酒生酒皆可

凡藥三四月鍊不可多合五月尤甚存散  
藥隨時旋丸

凡收藥丸子末子並用罐子收入厨子內  
以大培之

凡損用大矣則醫不得服藥不效矣  
諸藥惟小紅丸大活血丹最貴蓋其間用  
乳香沒藥楓香可代乳香三之一血竭

難得合大活血丹欠此亦可若有更佳  
合藥斷不可無乳香沒藥若無沒藥以香

降真代血竭無亦用此代

凡所用藥材有外道者有當土者如當歸

土與川不同九子可用土當歸土藥材

未子須用外道者

凡傷重者用此方煎湯洗之然後傳藥

生蔥切斷一本 荆芥剉

土當歸

右三味煎湯溫熱淋洗

黑龍散治跌撲傷損筋骨碎斷差又出舊

先煎葱湯或藥汁淋洗拔伸整擦令骨相續

○平正後却用生薑汁或生地黃汁和水調稀

却將熟帛或皮紙量損處大小薄攤於上貼

之次以木皮約如指大片疎排令周匝將小

繩三度縛之要緊三日一次再如前淋洗換

藥貼裏不可去夾須護毋令搖動候骨生穿

穩方去夾則復如故若被刀箭傷蟲獸傷噉

成瘡爛肌肉不生跌磕腫痛並用薑汁和

水調貼有破則留口以風流散填塗

川山甲六兩炒黃 丁香皮六兩

枇杷葉根去毛 枇杷根一土當歸

百草霜半斤

右培碾為細末薑汁水調或研地黃汁調

用

大活血丹治撲損傷折骨碎筋傷疼痛浮腫

腹有瘀血灌注四肢煩滿不安癰疽發背筋

肉壞爛諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人

血風諸疾產後敗血不行流入四肢頭面浮

腫血氣疼痛渾身痠痺經脈湛濁風勞發動

百節酸疼並宜服之每服半丸用無灰酒磨

化微煎三五沸溫服不拘時不限多少此藥

將紗葛袋收掛淨處經久不壞可備急用孕

婦莫服損在上食後服在下空心服傷重不

拘餘做此

天南星一斤薑汁

骨碎補一斤

大栗一斤

自然銅一斤

細辛一斤

木鼈一斤

川牛膝一斤

芍藥一斤

黑豆一斤

川烏一斤

血竭一斤

白芷一斤

沒藥四兩

乳香三兩

青桑皮一斤

炭為

右桑葉豆補星藥六味為末和餘藥研為

細末用米醋附六者糯糊拌入曰搗千料方聚

束人急下手九下手稍緩則拆陰乾半月

然後用大培或晒一日大丸重六文濕中

丸重三文濕乾則以漆抹在手取兩三

丸柳漆為衣每服半丸合此藥勿令四眼

見之更忌雜犬婦人見之則折矣

○小紅丸治跌折傷損皮破骨出手足碎斷筋

肉壞爛疼痛甚至晝夜叫呼百治不止手足

久損筋骨差支舉動不得損後傷風濕支節

攣縮遂成偏廢勞傷筋骨肩背疼痛四肢疲

乏動用無刃常服壯筋骨治經絡生氣血每

服三十丸用生薑煎酒或鹽湯吞下不拘時

候孕婦莫服

土當歸六兩 川烏六兩 白楊皮六兩

肉桂四兩 不殺木二兩 丁香二兩

乾姜二兩 川芎一兩 細辛四兩  
 沒藥三錢 附子三兩 乳香三錢  
 芍藥六兩 骨碎補六兩  
 右補藥歸楊四味用當土者餘八味研為細末乳沒別製和醋糊為丸如菜豆大信未為衣每服三十丸溫酒下傳用生姜自然汁煎酒或鹽湯皆可不拘時候

大紅丸治撲損傷折骨碎筋斷疼痛痺冷內外俱損瘀血留滯外腫內痛肢節痛倦應諸損痛不問年深日近並宜服之常服補損整筋固骨滋血生力神驗不可具述每服三十丸溫酒醋湯任下不拘時候孕婦莫服

天南星一斤 芍藥一斤 土當歸十兩  
 牛膝十兩 細辛八兩 赤小豆二斤  
 赤斂一斤 川烏一斤  
 青桑皮五斤 骨碎補一斤  
 自然銅四兩 骨碎補一斤  
 右欲星芍藥歸補膝辛七味並用當土者同餘藥羅為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大朱為衣每服三十丸溫酒下醋湯亦可

損在上食後服在下空心服傷重不俱時服或與小紅丸互用亦可

黑丸子治打撲傷損驢馬跌傷骨斷筋碎百節疼痛瘀血不散浮腫結毒一切風疾四肢麻痺筋力乏渾身倦怠手足緩弱行步不前婦人諸般血風勞損並宜服之每服二十丸三十丸用煨葱酒或茶任下孕婦莫服

白斂一斤 白芨四兩 南星六兩  
 芍藥十兩 土當歸四兩 骨碎補八兩  
 川烏三兩 牛膝六兩 百草霜十兩  
 赤小豆一斤

右除星芍藥歸補膝豆用土產者草霜釜上取同為末醋糊為丸如梧子大每服三二十九

當歸散治打撲傷損皮肉破碎筋骨寸斷瘀壅滯結腫不散或作癰疽疼痛至甚因損後中風手足痿痺不能舉動筋骨縫縱縮不舒及勞役所損肩背四肢疼痛並宜服之此藥大能續筋接骨翹日取效

澤蘭 川當歸 牛膝

川續斷十各 芍藥 白芷  
 川芎 肉桂各五兩 川烏  
 川椒三兩 各結梗 甘草各四  
 白楊皮亦不用 細辛俱要好者  
 右為極細末每服二錢熱酒調下不拘時候

乳香散治跌撲傷損皮肉破綻筋骨寸斷敗血壅滯結腫爛壞疼痛至甚或勞役所損背肩四肢疼痛損後中風手足痿痺不能舉動筋骨垂縱攣縮不舒大能續筋接骨卓有奇驗常服結血止痛生力每服二錢溫湯調下不拘時候

肉桂 乾姜各三 牛膝  
 羌活 川芎 細辛  
 姜黃 芍藥 草烏  
 川烏各四 白芷二  
 當歸四兩 蒼朮 碎補  
 沒藥五兩 何首烏十四 赤小豆一斤  
 乳香斤 桔梗十  
 乳香沒藥別研一方去木鱉  
 右焙碾為末續入乳沒末和湯使調服如

前

驚甲散治五勞七傷四時傷寒渾身增寒壯熱骨節煩疼咳嗽痰涎酒色傷德四肢倦怠及治山嵐瘴癘一切積氣心腹膨脹嘔吐泄瀉應是風疾並宜服之

肉桂 川芎 白芷

蒼朮 驚甲醋炙三次

紫苑淨洗 麻黃節不去 羌活獨活

當歸尾 乾姜 紫蘇大過

橘皮四兩 天台烏藥 烏藥

柴胡 五味子略 蒼朮

桔梗三兩 川烏詳雙

右培礮為細末每服二錢水一盞姜三片

烏梅一箇同煎至七分熱服傷寒加葱白

煎勞損入鹽熱酒調下

小紅丸

烏頭煎 何首烏 蒼朮

蛇床子 五靈脂 牛膝

赤小豆 白膠香 當歸各一兩

乳香錢

右為末好酒煮糊為丸如菜豆大每服三十丸溫酒下

小黑丸

白欬 白芨 南星

芍藥各十兩 當歸五兩 細辛三兩

赤小豆升 百草霜兩

右為末醋糊為丸如梧子大每服三十丸

溫酒下

搜風丸治風損腰痛頭疼治効與凡子同

何首烏 南星 骨碎補

川烏各半 土牛膝 芍藥各五兩

細辛三兩 當歸兩 白鮮皮

右為末醋糊為丸如梧子大每服三十丸

溫酒鹽湯不拘時吞下

驅風丸治効同凡子

骨碎補五兩 川烏 川芎各一兩

草烏 川當歸 牛膝

木鱉各二兩 何首烏四兩 烏金四兩 百華兩

京墨

右為末醋糊丸如梧子大每服三十丸空

心鹽湯下或荆芥茶湯食後下

黑虎丹治男子婦人手足麻痺

川烏 木鱉各一兩 地龍兩

黑豆升 五靈脂兩 松墨兩

右四味為末五靈脂醋研碎煮麵糊為丸

龍眼大每服一丸或二丸細嚼酒下薄荷

茶亦可不拘時

首烏丸治風損寬筋

何首烏升 黑豆半 牽牛子兩

牛膝 薄荷各兩 川烏兩

青木香兩 皂角性一斤 煨用

右為末酒糊丸如梧子大每服三十丸葱

湯或薄荷湯不拘時下

勻氣散凡傷重先下此藥調氣然後服損藥

茴香 青皮 厚朴製

白芷 烏藥 杏仁去皮

陳皮 麥藥 前胡

桔梗 蒼朮 粉草各一兩

右為末每服二錢水一盞姜棗煎至八分空心服

四物湯凡傷重腸內有瘀血者用此

白芍藥 川當歸 熟地黄

川芎

右等分每服三錢水一盞半煎至七分空心熱服一方只用當歸大黃二味

七氣湯

半夏五兩 人參 肉桂

甘草一兩

右每服三錢水一盞姜三片煎至七分食前熱服

前熱服

五積散治五勞七傷凡被傷頭痛傷風發寒姜煎二錢仍入葱白食後熱服

蒼朮 枳殼

陳皮 麻黃各二兩

白芷 川芎 川歸

甘草 肉桂 茯苓

半夏三兩 厚朴 乾姜各四兩

右除枳殼桂兩件外餘細剉用慢火炒令色變攤冷入枳殼令勻每服三錢水一盞姜三片煎至中盞熱服

大成湯一名大承氣湯

應傷損極重大小便不通者方服此可加木通煎如未通加朴硝俟大小便通方可服損藥損藥不可用酒煎愈不通矣然亦須量人肥弱用如孕婦小兒莫服

大黃 枳殼各四兩 川芒硝

甘草 陳皮 蘇木 木通各二兩

當歸 厚朴許

右件咬咀每服二錢水一盞半煎至一沸去相溫服不拘時此乃專治男子傷重瘀血不散腹肚膨脹大小便不通上攻心腹悶亂至死者急將此藥通下血瘀後方可服損藥

小承氣湯 大黃四兩 芒硝二錢 枳實二枚

厚朴八兩

右治效同大成湯比較力輕不拘婦人女子小兒皆可服

排風湯治諸風疾損

白鮮皮 白木 芍藥

肉桂去粗 川芎 杏仁去皮

川當歸去 防風 甘草各二兩

獨活 麻黃各三兩 白茯苓三兩

右每服二錢水一盞半姜四片煎至八分不拘時服更宜續命湯消風散

接骨藥下窠烏一名鷄用骨燒存性用古銅錢一箇煨醋淬七次為末等分骨斷夾縛訖用藥一錢酒調下不可過多病在下空心服在上食後服此方極驗

常用整骨藥用大草烏刮去皮為細末每服逐半錢溫酒調下如未覺再添二分藥酒下又方用乳香沒藥各二兩別研次用血竭自然銅無名異醋煮黃木鼈子各一兩地龍二兩並為末蜜丸如龍眼大嚼爛熱酒嚥下俟了用生蔥嚼解

至真散治打破傷損破腦傷風頭痛角弓反張一名命

天南星炮 防風去蘆

右等分為末凡破傷風病以藥傅貼瘡口

即以温酒調一錢服如牙關緊急以童便調二錢服垂死心頭微温童便調二錢并進三服

急救仙方卷之六

急救仙方卷之七

治傷損方論

例七

如傷重者第一用大承氣湯或小承氣湯或四物湯通大小便去瘀血也惟婦人別有陰紅湯通下第二用黃末藥温酒調不拘時病在上食後服在下空心服遍身痛臨卧時服第三服白末藥熱酒調其法同黃末服婦人產後諸血疾並皆治之第四服烏丸子第五服紅丸子第六服麻丸子用温酒吞下婦人艾醋湯下孕婦不可服第七服活血丹當歸散乳香散二散方見前方內並用酒調不拘時與黃末白末服法同惟乳香散參之山泉方則又加六味白楊皮一斤生芥子十箇澤蘭一斤檀香六兩沉香二兩川芎一斤餘方條具如後大承氣小承氣四物湯並見前方內黃末藥治跌撲傷損皮肉破綻筋肉寸斷敗血壅滯結癰爛壞痲瘋痛至甚或營役所損肩背四肢疼痛損後中風手足痿痺不能舉動筋骨乖張掣縮不伸續筋接骨卓有奇功常

服活血止腫生力

川烏炮 草烏燻 楓香別研各  
當歸一宿酒浸 赤芍藥各半  
川獨活 川芎湯泡 細辛淨洗  
香白芷 山桂皮粗 白姜炮  
黃姜 五加皮淨洗 桔梗去  
碎補 蒼朮 醋煮  
何首烏 牛膝酒浸七日焙  
知母 沒藥 研  
右件為細末每服二錢鹽酒調病在上食後下空心服遍身痛臨卧服孕婦莫服  
白藥末治打破傷損皮肉破綻碎筋骨寸斷瘀血壅滯結腫不散或作癰疽痲瘋痛至甚或因損後中風手足痿痺不能舉動筋骨偏癱掣縮不伸及勞傷破損肩背四肢疼痛並宜服之此藥大宜續筋接骨刻日取効婦人產後諸血疾並治之  
桔梗 白芷 甘草  
川芎 山桂 細辛  
川烏 斷續 牛膝