

七里又進一服至天明更進一服並溫喫如瀉不止用龍骨黃連等分為末熱水調下五錢次喫白梅粥補之

論已試功效

崑崙自老叟處得此神方應驗非一今連一

二事書于篇後庶使來者知用藥之功效焉

一職方郎中游烈者邵武寧人也其子之

婦年十六得病渾身壯熱咳嗽痰涎月候

不通飲食減少不歲餘衆醫不救用天靈

蓋散服之取下蟲一枚如蜈蚣之狀當時

針入沸油鼎中煎之投於江遂瘥

一有一男子三十歲餘患病懶飲食倍

多而不生肌肉每日常須肉食如或稍飢

腹內疼痛倦怠遂以天靈蓋散服之取下

赤小蟲其數有十內有一蟲其色微紫大

於衆蟲頭有細毛自後用藥補理遂安兼

進真蘇合香丸 一有男子一人年五十

每日須酒數升空心未飲則兩手與脚並

皆振動得酒一升飲之少減若至醉則手

足不動俗謂酒疾醫議之是振風累日針

急救仙方卷之十

灸服藥無效疑其蟲遂服天靈蓋散取下
一物如烏梅之狀撥之有足正類蜘蛛其
疾頓愈不復飲酒前効如此問病之士宜
加審焉



急救仙方卷之十一

上清紫庭追癆仙方品

惻士

麝香散治男子婦人傳屍骨蒸食熱五癆

天靈蓋

麝香

柴胡

犀角屑

阿膠

東引桃枝

青蒿

東引柳枝

石榴皮

甘草

長男左女右

薤白

葱白

右件為末用童便二升半浸藥一宿明日早晚煎至升半去渣服之若男子病女人

煎女病男煎忌狗雞犬驢馬僧尼孕婦生

人孝子並不令見之煎成飲後分為三服

入檳榔末三錢溫服初服約人行三五里

速便再進一服慮有惡心以白梅與他舍

止之服三五服病止即瀉出異物若蟲如

頭髮馬尾身赤口黑身上如蟻行不可名

狀瀉後葱粥飲補之同時藥煎補五臟伏

神散 忌風一月忌食油膩濕麵鹹味并

牛猪雞鴨犬等物服此藥無不當日差丸

天下治勞服之亦須累日及年猶未全去

病源者不似此方至遠年重病不過兩劑
如病未多即一劑飲子便當服此
伏神散不問遠年近日取效下蟲紅色便可
治肚下黑差成否肚下白色是食髓也萬不
一塵補方服伏神散

白伏神 茯苓 人參
連志去 龍骨 肉桂

甘草 陳皮炒各 當歸
五味子各一兩 黃耆二兩 大棗五十

右件為散分作八服細末每服入棗七箇
生姜二錢用水一升半煎至一升越前藥
後契亦空心服神效此是神人所授靈妙
秘方此方前後活數百人也
神效散治諸傳屍癆氣殺蟲此方得之于河
極多功
不可量

川椒二斤擇去子合
口者炒出汗

右為末每服二錢空心米湯調下或酒糊
丸如梧桐子大每服三五十粒

神仙秘方取癆蟲
青桑皮 楊柳枝 梅枝

石榴枝一方無 桃枝正東引者各
此味 阿魏一握 安息香具者
葱白七 青蒿一握如葉
并去石 以子代之
右八味除魏香外餘用童子便一升半煮
藥煎及一半去滓將藥汁化魏香再煎十
數沸去滓候溫分作二次調服

辰砂研 檳榔研末各 麝香少許
右研極細末分為二服五更初一服三點
時一服至已暖必取下蟲紅者可救青者
不治但有所下即用熱油煎殺即進飲粥

飯溫暖相息不用性及食生冷毒物仍先
服紙丸于法見後合此藥時須擇良日焚
香祝告天地令病人設榻於福德方服即
有神效不可令病人先知氣味亦不得令
猶犬孝服穢惡婦人等見之

金明散補肝臟勞極

人參 知母 茯苓
丁香 秦芫去 甘草去

石膏各 石青各
右件為細末每服二錢水一盞葱白三寸

同煎至八分通口服
守靈散補心臟勞極

白茯苓 丁香 訶子各一
桔梗 芍藥 羌活

右件為細末每服二錢水一盞入銀耳環
一隻葱白三寸同煎至八分通口服

寬停散補脾臟勞極

白藥子 桔梗 人參
訶子皮 茯苓 甘草去

右件為細末每服二錢水一盞入蜜一匙
同煎至八分通口服

虛成散補肺臟勞極

枳實去 秦芫去 白茯苓
芍藥 麻黃去 玄胡索
當歸洗 茴香炒各 甘草去

右件為極細末每服二錢水一盞銀耳環
一對蜜五點同煎至八分通口服
育嬰散補腎臟虛勞

香附子炒 附子炮

白茯苓去角

甘草炙

右件為細末每服二錢水一盞姜七片葱白同煎至七分空心服

龍胆丸治積熱癆瘦不食屢熱壅滯瘡腫解肌骨散解毒滯

草龍胆 柴胡

黃芩一方不用此

桃仁去皮 山梔子

當歸 大黃

右為細末鍊蜜為丸梧桐子大每服二十丸空心用溫熱水吞下如小兒加減丸數無比丸治傳屍癆服至一月愈其餘癆瘦之疾數服取效

紫河車二兩煮曬侵一宿增乾為末 芍藥

龍甲半兩 桔梗

大黃炮 甘草炙

苦參 黃藥子

貝母心去 枳石

知母 草龍胆

致心炙

義木

砒石

犀角屑

右件為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫酒吞下如腸蟲熱食前服膈上熱食後服

奪命散

龍龜甲醋炙

柴胡去

甘草

葱白一握

右以天靈蓋龍龜甲為末次下人參知母柴胡甘草又同搗次下葱白青蒿桃仁阿魏杵成餅子慢火焙乾為末稱二錢用童子小便二盞煎至一盞去滓露星斗下一宿至五更三點暖服半盞服了衣被蓋卧天明又煖半盞扶行病人服強行五七步三日更不得洗手面指頭候生毛為驗每日早晨先喫白湯投之

天竺黃飲子

天竺黃

麥門冬去心

天竺黃

天竺黃

天竺黃

天竺黃

人參

茯苓

防風

大腹子十一

右父咀為末用水二升半煎至一升分作三服溫服忌一切毒物如治久卧床枕此藥先着十指毛色如藕白者可治紫黑色者難治

麝香散治婦人室女一切蓄熱腹內悶着骨蒸室女經脉不行瘦勞肌熱

威靈仙四兩

乾漆一兩

右件為末再研每服一大錢水八分盞煎至六分空心渣溫服當有惡穢毒物下並是病根此藥頗難服可以蒸餅糊為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九茶湯任下次服桃仁散

桃仁散

桃仁湯泡去皮

赤茯苓各一兩

人參各三

積柳四

積柳

積柳

積柳

積柳

積柳

積柳

陳皮三分 犀角 安息香各一分
麝香二

右為細末研勻每服二錢薑五片水一盞
煎至六分早晚食前服若取下其蟲頭亦
便服天竺黃飲子補護心臟未取下蟲亦

須先服之護心

柴胡散治重積骨蒸熱解傷寒後肌熱

柴胡 川大黃 乾漆炒

秦朮 甘草 常山各一兩

龍腦三兩

右吹咀每服一錢用水一盞入小麥一撮
同煎七分冷服

取蟲藥取啄木禽一隻朱砂四兩精猪肉四
兩銀木禽一晝夜飢甚將朱砂作菜豆大相
和在切碎肉片子肉若無啄木禽豈將繫禽
用鹽泥固濟入禽在內用剛火煨一夜來日
不見太陽取出不得打破同固濟鹽泥入地
埋二尺許一晝夜取出銀器內研作細末以
無灰酒作一服調下入麝少許在藥內同調
置病人在帳中四下緊閉用鐵鉗候病人口

中蟲出即鉗之於沸油中煎殺可預置烈火
沸油於病人左右如蟲出後便令煎嘉禾散
與病人服進粥又煎藥悉如前夜服呪云
啞摩喝囉吽吽吒
釣蟲丸

磁石一兩半有塊 龍骨半兩
硃砂一兩 麝香一錢 膩粉半兩

右用蠟為丸如小嬰桃大每服一丸以藥
上針穿一小窠子以青紅線貫之稍頭繫
一大古錢早晨令病人向破方正坐用溫

水吞下候藥下咽喉中合口以牙咬定古
錢等候惡心便吐出其蟲狀不一急以熱
油煎殺如不吐出蟲只吐得血絲子或涎
一二合皆是安謐更服尋常和氣理中諸
藥三兩日決取痊瘥其治過藥可用溫水

浴過更可醫一二人若是傳屍癆一九可
活兩人

釣蟲神功奪命散

母丁香一錢 酒蠟半兩 龍腦一錢
水磨硫黃二錢 石燕一箇 火煨
和散

右為細末用蠟為丸如菜豆大每用一丸
裝鈎子上繫緋線一條長一丈二尺用雪
膏少許圓藥丸以蠶絲一截穿於線上蓋
之令病人先喫膏後一口同藥吞下良久
線動用力拽出有蟲用沸油煎殺此藥於

端午日日出時修合先服紙九次同神
仙秘法服
服紙九子法

九醫傳屍先當齋戒志心對聖焚香服紙
九子用雞子清塗紙上令乾剪作錢樣大
丸服之然後服前件九散

通神散治屍癆
附子一兩 大黃一兩 牛黃二錢

右件為末加桃柳枝青蒿各七握剉碎用
童子小便半碗浸一宿來日五更初煎數
十沸濃滓調散子一半喫服了以衣被蓋
便睡取下惡物自住不用利下時用盆子
盛看何物在其中蟲類有四一頭如馬尾
二似亂髮三似蜈蚣四如雞子或破綿絮
後要有一人來別此忌硬物茶炙博喝蟹

血生冷油膩酸腐等物後服藥

甘草 黃連 當歸

木香各半

右將酒二升甕器內煎取五合傾出煎四味熬着軟硬和丸如梧桐子大空心晚後酒或益湯下三十九

紫河車丹治飛屍鬼症虛勞羸瘦喘嗽氣

其法取男子首經兒先以皂水洗淨次以

銚子內用米醋堞洗控乾將一小小焙籠以低周圍密糊不令失火氣或無小焙籠

只用小籃子去繁密糊安紫河車於上用烈火焙更將參子蓋之培令極乾約只有

十二三文重候極乾至乾了更入後藥

人參一兩 木香兩半 白木抄
白茯苓 伏神 當歸

熟地黃各一兩 乳香別 沒藥各四

朱砂二錢 麝香二

右件為細末用諸藥和勻紅酒糊為丸如梧子大每服五十九煎人參湯下空心日午四服鍊蜜丸亦得

明目丹又傳追下屍蟲治傳屍癆

白兔糞中藥度年四十 硃砂

右研為細末鍊蜜丸梧子大每服七丸用甘草半兩生搥碎以水一盞搽取濃汁若

患人瘦弱即更過甘草五更空心服預戒

患人不得心燥冷服不妨小瘥兩日再服下蟲為准須上旬服

青蒿飲治癆疾

青蒿赤根者取子一 桃枝三兩

柴胡升葉五兩陰乾 甘草各一 柳枝三兩

地骨皮二 梔子仁一兩量 白茯苓

右咬咀每服三錢水一盞烏梅兩箇煎至七分溫服不拘時

柴胡散補虛勞 柴胡 人參 白茯苓

桔梗 芍藥 青皮去

川當歸酒洗 麥門冬去 川芎

升麻 赤白皮 白木米泔浸

甘草各一 右件為細末每服二錢水一盞煎至七分

通口服

龍甲煎補虛勞

龍甲一枚 柴胡去 川當歸

甘草去 桔梗 赤芍

人參各一 麝香半 杏仁去皮

胡黃連 地骨皮 宣連各一

木香兩半 真酥 白沙蜜各三

官桂半兩去粗

右件為細末用青蒿一斤童便五升熬青蒿汁約二升濾去滓入酥蜜再熬成膏疾

冷入藥末搜和為丸如梧子大每服十五丸溫酒下未飲亦可日進三服如秋冬時

更入桃柳心七箇與前藥同煎服

貫眾丸去三屍五蟲 貫眾五分 白茯苓三分 蜀漆三分

厚朴三分 狼牙子四分

礞石四分 雷丸六分 雄黃三分

無名五分 右揀淨焙乾炒令黃色搗為細末鍊蜜為丸如梧子大川水下五丸三服可漸加至

十九二十九服之二十日百病皆愈三屍九蟲自滅服者須齋戒禁教婦人絕孕服之有子

桂心丸神仙去三屍九蟲

熱地黃兩三 乾漆半兩 桂心兩一

右為細末鍊蜜為丸如梧子大每服七丸

未飲送下

雄黃丸又去三屍九蟲

雄黃兩一 松脂各一兩

右溶脂為丸如蓮子大平旦吞一丸服七

日三屍盡去

輕骨散治勞嗽

烏梅 龍胆草 胡黃連

貝母 知母 鱉甲兩一

桔梗 秦艽 柴胡

甘草文 山梔子去 人參

青蒿兩一 阿膠炒 杏仁去皮

右件晒乾為末用好京墨一寸以井花水磨調前藥末作餅子如大指頭大透風處膏乾二七日方用每服一餅并水磨化又

用沒藥五十磨成一盞於五更又用黃皮末二錢同煎數沸却入盞內頻打轉通口於五更更前輕輕起吃纔服了便睡令病人仰卧甚者不過三服

蛤蚧散又治勞瘦

白茯苓一兩 桑白皮二兩 杏仁六兩

知母兩一 貝母兩一 甘草兩一

人參兩一 熟乳兩一

右件為末每服二大錢水一盞煎七分服忌油膩冷毒物如久患嗽者初服此藥必服開飲加甚須勤服久則可安須自保惜

治虛勞方

右用生薑六兩剉碎嗽者加入人參四兩剉碎同置於新沙鍋內用無根河水一斗燒木炭文武火熱水盡為度去生薑茶滓放冷每服五七箇杏仁頻服之

治傳屍勞瘵方

右童子便一盞無灰酒一盞以新甕瓶貯之取全猪腰子一對於內塞封泥日晚時以慢火養熱至中夜止待五更初更以火

為妙

治勞熱止損止咳

蛤蚧一對 胡黃連 秦艽 甘草

生地黃 熱地黃 青蒿 黃芩

人參 柴胡 麻黃 貝母

知母 杏仁 桔梗 鱉甲

龍胆草 木香

右件為細末用烏梅葉煎服

溫之發瓶飲酒食腰子病篤者只一月效
平日瘦怯者亦可服此蓋以血養血絕勝
金石草木之藥也

又方以獺肝一具陰乾杵末方寸七日三服
有效

又方以赤抱兒俗名王焙乾為末溫酒調服即
有效

黃帝灸二十一種癆圖分序

夫人含靈受氣稟於五常攝之乖理降之
大疾至若岐黃廣記抑有六舊經法單行
顯靈斯術骨蒸病者亦名傳屍亦名瘡瘵
亦名伏連亦名無辜丈夫以元氣為根本
婦人以血海為根源其病狀也髮乾而短
或聚或分或腹中有塊或腦門結核或卧
盜汗夢見鬼交雖目視分明而四肢無力
上氣食少漸至沈羸終延歲月遂至殞滅
餘昔忝任洛州司馬三十日灸活一十三
人前後差者數通二百里至於狸骨獺肝
徒聞囊說金牙銅鼻罕見其能未如此方
扶危救急非止單攻骨蒸兼亦療風或瘴

或勞或邪或僻患狀既廣矣愈亦多不可
具錄聊述大槩又恐傳說訛謬以誤將來
今具圖形庶令覽者易於悉使所在流傳
頗用家藏未暇明醫旁求立業返魂還魄
何難之有遇斯疾者可不謹歟



肺俞二穴在第三椎下兩傍相去一寸半是
穴理顛癩嬰氣上氣吐逆返滿脊強寒熱不
食內痛皮痒傳屍骨蒸肺嗽針三分留七分
呼得氣即灸三壯 厥陰二穴在第四椎下
兩傍相去一寸半是穴理逐氣吐嘔心痛學
結胃中煩悶針入三分留七分得氣可灸三
壯 心俞穴在第五椎下兩傍各一寸半是
穴理心中風狂癩氣亂語悲啼心腹坎滿汗
不出結積寒疝嘔逆不食食物即吐效腫目
痛不灸通針三分留七分呼得氣即瀉灸三

壯 肝俞穴在第九椎下兩傍各一寸是穴
理口乾中風肢滿短氣不食食物不消吐血
目不明開塞胃痛有痰寒疝針入三分留七
分呼得氣灸三壯 脾俞二穴在第十一椎
下兩傍各一寸半是穴理腰身脹滿腹肚泄

瀉痢身重四肢不收黃疸邪氣積聚腹痛寒
熱針入三分留七分呼氣灸三壯 腎俞二
穴去第十四椎下兩傍各一寸半上一膈對
是穴理虛勞耳聾腎虛水狀脹急腰痛小
便濁陰中疼溺血精出五勞七傷冷嘔脚膝
酸疼拘急好獨卧身腫如水針入三分留七
分呼氣可灸三壯 大杼二穴在第一椎
膈俞二穴在第七椎 膽俞二穴在十一椎
三焦二俞二穴在十三椎 胃俞二穴在
十三椎 旋俞二穴在第二十椎 仍列灸
四花膏膏為妙 師令患者平身正立以
細繩子一條令脚底豎踏男左女右其頭上
大姆指端高順脚踵引直上至曲脈中大橫
文處截斷患者取穴去處一依銅人又令患
人平坐解髮分開兩邊從髮路沿項直下至

脊繩子頭椎骨上以骨點記之患人亦依銅人坐也又取繩子中鈎起至鼻住按定截口吻兩頭了却將此量

取穴法



口繩子於點記處平摺拖兩頭勿令少有偏邪直要端正兩頭記處是穴中心於點處非穴莫灸又法令患人平身正坐稍縮膊取小繩子一條拖其兩垂向前繩兩頭高至鵝尾穴穴在心上頰骨下也便截斷却翻繩子向背拖繩停心於喉結骨上其繩兩頭雙垂當脊上中繩子頭便點記 又法取一繩令患人平坐合口橫量准前取繩子兩頭是灸穴此通前四穴各灸七壯至二十一壯須加至百五十壯仍停候瘡欲發又將先量口繩子

於前春椎上垂繩子點處停心堅量以繩子兩頭是穴點記灸之如前法此名四穴穴須是離日灸之用三月三日採艾極妙灸疾若了於百日內却慎飲食房室且安心靜眼如一月覺末全安常如初法於舊穴上再灸之永除害也灸後仍服藥製方在後餘切讀老叟自序論傳屍之候已詳如灸心俞穴中取蟲按銅人經云則不可用正如此高高嗣照世稱良醫雖取穴針灸上古治法不同豈神聖之功殆不可云

一法當於癸亥日夜二更時六神皆聚之時解去下體衣服直身平立用筆於其腰上兩傍微陷處點定鍼家謂之腰眼然後上床合面而則每灼小艾炷七壯兩腰眼共一十四壯勞蟲或吐出或瀉下即可平安斷根更不傳染

灸後服藥

- 生地黃片 青蒿片 薄荷片
- 童便 好酒各二升同
- 柴胡去 蠶甲炙 秦艽各一

麝研 硃砂各半
右五味為細末入前膏為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸溫酒下忌生冷毒物

又取蟲方

凡取勝蟲可於三節骨上一穴膏膏二穴每穴灸七壯然後喫飲食調理方下藥取蟲其蟲或如亂絲或如紅線者是也
春用雄黃 硫黃 巴豆一粒 豆豉七

右同前藥共和研為丸如梧子大次用童子不喫飯的小便一合酒一盞下

夏用蘆伏子 鶴蟲 硫黃 巴豆一粒 豆豉七

右同前藥丸如前湯使下
秋用錫灰 雄雌二黃 葶豆粉 豆豉七

巴豆一粒 去油
右同藥為丸用前湯使下

冬用雄雌二黃 錫灰 巴豆七 豆豉七

右為丸同前湯使下
淨明法中治勞瘵方

度師王真先生傳 其方須先鍊度如法
次以南木香五錢重切碎用新潔瓦器慢
火煎出濃汁分作二處留出木香渣將在
一處調朱砂書符用一處調青蒿用青蒿
九斤重切碎用新潔鐵鍋水煎一日去渣
取濃汁入前木香渣再煎去渣以前木香
濃汁一處慢火熬成膏 朱砂五錢重為
細末用前一處木香汁調書五炷符及鍊
度中五炷符燒化入木香汁內就用此化
開書蒿膏子與患人服切戒勿令患者知
之務在志誠而為也仍忌一切外人畜類
等見之無不神效此方行是法者用之尤
為妙也

急效仙方卷之十一

十九

仙傳外科集驗方序

造一

余少讀書嘗聞先哲云為人子者不可不知
醫於是遇好方書輒喜傳錄累至數十帙見
有疾者如切已身常製藥施與一日先君子
訓曰施人以藥不若施人以方則所濟者廣
從而有所已驗之方必與樂善之士共及冥棲
方外悉棄推昌學既經塵劫煨燼無遺僅外科
集驗方一帙迺禾川楊清叟所編述以授吳
寧極寧極之子有章以授西平善觀李先生
先生以授於宜真者其方簡要惜未版行故
獨存之昨來遊金精福地道經雲都吾徒蕭
天倪鳳岡本西昌望族自幼學道於紫陽觀
二十載前嘗從予遊亦能召風雨濟旱澇蓋
道緣深重履踐端恪之所致也其師弟劉致
柔順川數年間徧身苦瘡癩服荆黃湯敗毒
散諸藥俱不効予因以外科方授之用返魂
湯未終劑而愈天倪乃欣然捐已質繡梓散
施流通其惠濟之意如此則雨暘之應禱也
宜哉雖然予有故人曾嘗鼓椎風往來寒熱
數月伏枕諸醫不能療最後一醫士診之曰

雖成痼疾而有客邪在少陽經未解若曾服
五積散則誤矣詢之果然因投小柴胡湯數
服寒熱頓除却用本科追風丸等藥理其風
證而全瘳矣夫雜病有方傷寒有法二者兼
盡其道迺為良醫若以大方外科各專其一
正恐或有所誤而不自知則又豈能全美乎
此外科論證處方雖極其造理校於諸方為
獨優在圖機之士臨證之時尤當加審焉昔
洪武戊午九月朔日浚儀趙宜真原陽子序

醫之為藝高矣自神農氏始嘗百草辨溫涼
寒熱之性以濟民於天枉其功莫大焉厥後
扁鵲華佗最精於技治療之法效驗如神惜
其術不盡傳今之外科迺其緒餘也外科之
證癰疽為甚蓋疽有陰陽虛實之不同用藥
稍差則立至危殆其次如疔瘡咽喉之屬尤
易以殺人世之工外科者因為不少求其能
精類不多見浚儀原陽趙鍊師以通儒名家
學於老氏道行高潔超邁羣流處心切於濟
人以平昔所獲奇異方書彙聚成帙中經兵