

一此方加南星草烏二味三分之二熱酒調

敷諸癰可以潰膿不痛若單王龍要洪寶丹蘸住不若此法妙

一猢犬咬人單用紫交沙糖調塗留口金丹退腫膏杏仁置口中去毒

一法加南星草烏二味與此方各一半熱酒調敷可治久損至妙至妙

一小兒軟節用此方加軍姜酒調敷若初發只用此方酒調敷成膿而止若初發之時用紫荆皮木蠟酒調敷可以必消切不用

○洪寶丹

一熛疽心火熱毒也見於五心痛不可忍其狀如泡瘡而血赤外形雖小內有熱毒在心脣者難治在乎足心者可療然治之須早稍遲或在心脣則薦肉粉碎神仙莫管凡有此疾在手心則用洪寶丹於手心環圓敷之以截其血却用沖和於手心留口收功在脚心則用洪寶丹在脚脛交骨四圍一二寸長以沖和收功如前

仙傳外科秘方卷之二

仙傳外科秘方卷之三

造三

○回陽玉龍膏
○敷貼熱藥品第四
○草烏三兩
大赤芍藥一兩
不見南星一兩
大軍姜二兩
見大白芷一兩

○波儀原陽子趙宜真集

○敷貼熱藥品第四

○草烏三兩
大赤芍藥一兩
不見南星一兩
大軍姜二兩
見大白芷一兩

○波儀原陽子趙宜真集

造三

○此方治陰發背冷流注鼓椎風久積痛冷者足頑麻婦人冷血風諸陰證之第一藥也用法詳具子後用熱酒調塗

○洪寶丹
夫雜病雖見於皮膚手足之間而因必本於五臟六腑蓋臟腑之血脉經絡一身晝夜運行周而復始一臟受病必見於本臟脉息所經之處即陰陽分手足之所屬也其爲病有

之病從可知矣但當斟酌用之不可大過則爲全美治法加減疏舉如左

○一發背發於陰又爲冷藥所誤又或發於陽而誤於藥冷陽變爲陰滿背黑爛四圍好肉上用洪寶丹把住中間以此藥敷之一夜陽氣回黑者皆紅察其紅活即住此藥

却以沖和收功如不効欲作膜又以南星草烏加於沖和用之如陽已回黑已紅惟中間一點黑爛不能紅者蓋血已死可以補消明礬又云白丁香硼砂乳香用蜜調

屬表裏相應萬無失一此藥有軍姜肉桂足以爲熱血生血然既生既熱而不能散又反爲害故有草烏南星足以破惡氣驅風毒活死肌除骨痛消結塊喚陽氣又有赤芍白芷足以散滯血住痛苦生肌肉加以酒行藥性

之焰回枯木之春大抵病分則肌肉陰爛不知痛痒其有痛者又多附骨之痛不除則寒根透髓非尋常之藥所能及惟此藥大能逐去陰毒迎回陽氣住骨中痛且止肌肉皮膚

勾於黑紅交處作一圓上用沖和蓋之至明早起藥自然去黑肉如割却以藥洗之換以生肉合口收功

○流注冷證多附骨肉硬不消骨寒而痛筋縮不伸若輕用刀針並無臘血若止有乳汁清流或有瘀血宜用此藥敷之若稍緩止以軍姜白芷肉桂草烏等分熟酒調敷骨寒除而痛止則氣溫和而筋自伸肉硬自消矣然治流注不可無木臘以其性能破積滯之氣消堅硬之腫最妙又不可多

○多則能解藥性蓋此證主於溫藥故也

○一鼓椎風起於中濕或傷寒餘毒又或起於流注之壞證或起於風濕虛痺此證有三一是兩膝相撞行步復掉膝腔脛骨微腫二是膝腔脛骨交接處大如椎腿股肉消皮縮裹骨三是上腿腫大下股冷消蓋足膝屬肝肝經有風寒濕氣則血脉不流而作此遂為膝寒所滯凝流不動下股之血脉有去而無返是以愈瘦愈冷而筋急縮上腿之血脉有積而無散是以愈腫愈熱

○一男子婦人久患冷痺血風手足頑麻或不能舉動可用綿子夾袋此藥在中心却以長纏在痛處用紗袋繫定此藥能除骨痛附在肉上覺皮膚如蠟樣即其功也如痺可加丁皮吳茱萸沒藥大川烏等分然後金在追風丸表裏交攻去病如神

○一風脚痛不可忍內用追風丸外用此方加生面姜汁調熱敷欲得立止可依法加乳香沒藥化開酒調爲妙

○一久損入骨者蓋因墜壓跌撲傷折不曾通

而肉愈瘦其原若起於流注則肉癰者爲爛爛則冷毒齶骨腐骨一出神仙無術未破則肌肉尚未死急以此藥熱酒調敷膝腔骨上腿處以住骨痛回陽氣又以沖和塗下腿冷處引其血氣使流動而下通貫血脉又以此方敷胫骨交處以接所引之血脉以散所積之陰氣內則用追風丸倍加乳香以伸筋如法服之無不愈者如人欲出方可用五積散加姜桂芷歸又加大川烏牛膝檳榔木瓜或茶或酒調

○一女子婦人久患冷痺血風手足頑麻或不能舉動可用綿子夾袋此藥在中心却以長纏在痛處用紗袋繫定此藥能除骨痛附在肉上覺皮膚如蠟樣即其功也如痺可加丁皮吳茱萸沒藥大川烏等分然後金在追風丸表裏交攻去病如神

○一法只用南星草烏加少肉桂能去黑爛潰

○一治石癬用此方熟酒調敷外却用洪寶霜謂之小玉龍

○一治石癬用此方熟酒調敷外却用洪寶霜謂之小玉龍

○一婦人乳癰多因小兒斷乳之後不能回化又有婦人乳多孩兒飲少積滯凝結又有經候不調逆行失道又有邪氣內鬱而後結成癰腫初發之時切不宜用涼藥外之蓋乳者血化所成不能溝泄遂結實腫核其性清寒若爲冷藥一冰凝結不散積久

血以至死血在所患之處久則如雞肺之附助輕者苦蘚之葦石年少之時血氣溫和尤且不覺年老血衰遇風寒雨濕其病即發宜以此方熱酒調敷內則用搜搜毒藥元表裏交攻爲妙雖然血氣虛弱之人病在督脈腰背之間者謂之脫瘻不除變爲血結勞不論老少遠年近歲大而偏身小而一拳半肘醫之則一此等乃根蒂之病此非一劑可愈磨以歲月方可安未成勞者易已成勞者難

而外血不能化乳者方作熱痛蒸逼乳核而成癰其苦異常必爛盡而後已故病乳癰者既愈則失其乳矣蓋乳性最寒而又滯以涼劑則陰爛宜也然涼藥亦未嘗不用於既破之後則佳如初發之時宜於此方中用南星姜汁酒兩停調勻熱敷即可內消欲急則又佐以草烏此藥味性烈能破惡塊逐寒熱遇冷即消遇熱即潰如已成癰腫則又從沖和依常法用之或加此草烏南星二味亦可破後觀其原原於

○冷用沖和收功原於熱用洪寶生肌且須用乳沒住痛以減其苦至於藥只用瓜蔓散隨人虛實參以通順散十宣相間服之多口者爲乳發乳房堅硬者爲乳石正在乳管處腫者爲吹乳在乳癰囊下爲乳漏以肉懸垂而血易滿故也故爲難治一囊一口爲乳癰五十歲老人無治法外有老人乳節又爲可治蓋在囊肉上爲癰若近脣則爲節矣

○宿疾失道癰腫無膿者可用此藥點頭病

必旁出再作爲佳不然則元陽虛耗此爲敗證如元陽虛耗敗證者急用全體玉龍敷之拔出成膿服藥則通順散加桔梗半夏當歸肉桂等藥若病紅活熱驟則當歸沖和爲佳切不可誤投涼劑此方但能拔毒作膿病回即止不可過若能參用踏脈神劑尤妙出外科精要

○一肚癰一證十有九死蓋胃屬陰外寒裏熱凡氣血朝聚起熱避寒故多爲內癰不能外現間有微影欲出則又爲冷藥所觸及服涼劑雖有神仙莫施其巧醫者可不慎乎凡有此證初覺腹痛且以手按之痛苦走閃移動則爲氣塊若根不動外面微有紅腫則爲內癰急以此方拔出毒氣作成外癰然後收功沖和內則用通順散加忍冬藤治法如前若癰自能外現者不必用此方只用沖和爲妙不可輕用針刀如犯鐵器口不能合只用玉龍貼癰頭上四邊以沖和圓之依法自破若膿流不快依法

用洪寶三分姜汁七分茶調數之膿皆出盡內用十宣平補生肌外則依然收功沖和此證陰多陽少損入最害將安之際倍服內補以生氣血庶幾易愈否則消而復脹口不合既安之後尤宜多服內補加附子否則氣弱難平證分者未破之先尤宜先服附子方好既破之後切不可用急瀉欬口之藥恐食毒不散服藥力到自然合口至於內癰已成不能拔出只用沖和外貼使在外溫和成膿自腋腋而出不至內癰死生所係全在服藥之功治法見前最忌毒食食毒即發反覆難療又有孕婦病此者又與此異內用紫蘇飲安胎勿輕與他藥若臨月則兒與臍俱下若尚遠則臍自大腑中下若初萌只服藥可消若癰在外面其證必熱惟可用沖和收功亦須審輕重用之恐有誤也