

仙傳外科集驗方卷之九

卷九

洪儀原陽子趙宜真集

發背形證品

癰發于背廣一尺深可一尺雖潰至骨不穿膜不死



○此證因餘食而感其毒在脾肚之間急宜

○用藥治脾肚中之毒內外夾攻之然脾易作臭急服喫藥初發用追疔牽命湯以能內消方見未後化毒消腫托裏散內托千金散

蓮子發

卷九



此證發于右脾中恐其毒奔入心大要

用喫藥散之數點藥截住不令攻心如在

通背督腫不可救之消者可療諸瘡痛癰

皆生於心以心主血而行氣走痛諸瘡皆有王瘡敷就上可打火針三四針為妙

用前化毒消腫托裏散加南星草烏木鱉貝母大蒜生姜米醋調敷留口二三日夜即消盡矣長長以醋潤濕

蜂窠發



此證頭在上發最不宜治乃是反證却要仔細用藥此名蜂窠發全在喫藥托裏生

肌定痛散血見血恐毒氣攻心入膜必難治療因心大未散故也

散走流注發



此俗謂蠻影之證殊不知醫方即無此說

蠻證生子之說背上不為蠻影之實毒氣乘風熱而走是也此證因風盛而生熱之

極氣因熱之極氣因熱而走于四肢急宜時風定熱則氣自然而息此藥用之如用兵治之流注於手腳腿者必死無疑矣

腎俞發



此證因受濕并怒氣飲熱酒而得之傷於內腎之間流毒在腎俞急宜用藥敷喫解散內腎之毒見更用生肌藥內外夾攻之若陰發傷腎膜者則有難治之患切戒怒氣行房稍或有犯決不可治慎之慎之

腎俞變發及脾癰





此證發於左搭肩骨上生者以動之處可治難安串於右搭肩者必難治也可用雞黃皮及梨焙乾爲末濕則乾擦乾則用清油調擦之

對心發



攻心必然死矣
頭後蜂窠發

此證發於頭後如是蜂窠者急宜救之若挾赤腫痛起者好療癰發者必難治矣宜用藥服數急療之若感流於兩肩者決不可療也

背發兩頭



此證乃對心發因心火盛而熱氣會生於此處其毒愈壯盛走之急用疎導心火之藥解之然後以生肌藥愈矣

蜂窠發



此證發於右搭肩骨上生者以動之處可治難安串於左肩者必難治也用藥搽捲

依後左搭肩發



此證發於左搭肩骨上生者以動之處可治難安串於右搭肩者必難治也用藥搽捲

依後左搭肩方



此證下腎俞雙發因飲熱酒行房事怒氣受濕而得也陽發於外可治發陰發傷於腎膜瞼稀者爲虛難以治之必定死矣脾癱發於左肺之間初發可用燈火點破追疔湯汗之即散

右搭肩發

此證發於左搭肩骨上生者以動之處可治難安串於右搭肩者必難治也可用雞黃皮及梨焙乾爲末濕則乾擦乾則用清油調擦之

對心發



此證乃對心發因心火盛而熱氣會生於此處其毒愈壯盛走之急用疎導心火之藥解之然後以生肌藥愈矣

蜂窠發




此證發於右搭肩骨上生者以動之處可治難安串於左肩者必難治也用藥搽捲

兩頭癰疽發

此證兩頭小者四邊散攻乃是因飲食之所致也而氣食相關合因虛而成之氣虛而散所以開口而闊急服內消藥亦宜補陽也

兩頭癰疽發




此證兩脇下成離直因虛而氣虛切不可服補陽之藥益虛中而得決不宜受熱劑倘受熱劑則虛熱愈盛易於傷骨膜切宜慎之

兩邊髮際發



此證於頸後兩邊左右鬚髮邊發生者急宜救之如核發者急宜取去病根如腦心發者熱氣上攻于腦四畔邊道九燃赤腫硬連於耳項寒熱疼痛若不急療毒入於血肉多腐壞爲膿水頭中而出血氣及癰發者難治主死矣

腦後發



此證名天疽其狀大而紫黑色若不急療則熱入淵腋前傷任脈內薰肝肺十餘日死急用前化毒消腫托裏散及內托千金散生肌定痛等藥取効

耳後發



此證耳後一寸三分至命之處發之必死故銳毒不治銳毒者堅銳其毒名曰發頭道九乃熱上蒸連順而穿口者必主穿喉死矣

用藥子後

破結散專治石瘻氣瘻筋癰血瘻等證急服此藥及後藥數之

海藻洗 龍膽 海蛤



此證發于眉者名曰井疽狀如大豆三四

通草 貝母去心各三錢重昆布洗
半夏各一錢重 石楠
松蘿各三錢重 麥麯

右總爲細末每服二錢重南酒溫調服之忌食一切毒物及甘草雞魚五辛生冷果

木等方効

南星膏專治皮膚項面上生瘡瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輒用針灸只宜從順點破慎之

藥用南星大者一枚細研稠粘滴好醋爲


膏如無生者乾者亦可爲末醋調如膏小點破令氣透出却以藥膏攤紙上象瘤大小貼之覺痒則不可以手動撥則頻貼取効紙上藥乾又換濕的貼上爲妙

智發

日起若不早療下入於腹入腹不療十日

當死急服內固清心散方見前外發可治內發傷膜主死無疑

九發



此證發爲肺疽心疽肝疽腎疽脾疽胃疽大腸疽三焦疽小腸疽右驗其人所膜依。據此候審定癰疽淺深病從何臟腑發先曾食何乳石又驗其氣虛實穿潰出外者可治發於內傷膜者流膿大便出者必難治參詳而療之。

婦人乳發



乳癰證有兒者名爲外吹亦有孕者名爲內

吹始可以急治敷散不然出膿即用生肌定痛藥見効

喫藥即效散

白芷

貝母去心等分

右爲細末南酒調服若無乳行者加漏蘆

右總爲末熱酒調服

金銀花兩

青皮一兩

陳皮一兩

甘草生熟各一兩

川山甲一錢

木薑根各三錢

連翹一兩

又方

青皮一兩 陳皮一兩 甘草生熟各一兩
川山甲一錢 木薑根各三錢 連翹一兩

煎酒調服即行
治初發乳及內外吹乳敷藥用酵子一勺以麪五錢炒搗爛酵素發面如蜂窠發過上青色無妨焙乾爲末用井花水調敷如乾日夜以水濕之或不退加白芷貝母爲末。○疼痛加乳香沒藥末立効

乳癰乳疽二證在內結核不散急服復元通氣散以前敷藥及化毒拔毒敷藥奪命湯汗。
番花石搗發乳者此二證不可治之三十二。三者可治四十之上者宜早治用藥喫藥如不生肌者難治之必死也。

人面瘡



此證皆是冤可以作善事解之須在真誠懺悔然後方可用藥喫藥用流氣飲久不

右咬咀水煎入酒服亦可

連丸

復元通氣散治發乳癰疽及一切腫毒
木香 茴香 青皮
川山甲一錢 陳皮
甘草各等分 貝母去心等分 加漏蘆

連復用內消散及生肌定痛散敷之用膏

藥貼更服前秘傳流氣飲

下瘡瘍 祕傳一味千金散專治瘡瘍立効

右單用黑蜘蛛一箇過江者爲妙入在碗

中研爛鑑熱南酒于碗中攪勻通口服之

隨病左右側卧如不退再用一箇即効

數藥

先用葱白炒熟剝之如斧再炒熟以剝三

四次後敷藥用前化毒消腫藥加用大蒜

木鱉南星草烏數之如破用前生肌定痛

○藥

○後用丸子藥青木香丸一貼用班貓大箇同
丸子炒熟去班貓熱南酒送下如不退再
○進一二服

又方用栗子樹根南酒煎服立効

○下瘡瘍搽藥

○黃連 黃柏等分

○右先用猪膽二箇以汁浸二藥溫却用瓦

一片或磚於火上燒紅放藥在上焙乾加

乳香 没藥 血竭 苦參

○右烏未乾以清油調搽濕則乾擦之如腫

不退用益元散加防風荆芥何首烏煎水

當歸尾

大黃 山梔子

又方

細辛

乳香

沒藥

連翹

川山甲

枳殼

大黃

甘草節

天花粉

牽牛

雄黃

貝母等分

川練子

黃連

黃柏等分

黃柏

金銀花 牡礪 車錢

防風 甘草 油胡桃

右㕮咀水煎熟加南酒五更溫服

偏腎氣即効如神先服五芩散加 茵陳
燈草 木通 白木 朱苓

澤瀉 赤茯苓 官桂 車錢

右㕮咀白水煎空心服即依後法矣之爲
妙

○宴陀僧 黃連 黃柏 輕粉

右爲末摻之以鹽艾煎湯洗之

○瘡瘍墜藥用赤葛根生姜一塊同搗爛鑑熟
酒服之汗出爲度滓上

○偏腎氣以本人口爲則於腰上灸偏在左灸
○追疔奪命湯祕方速効能內消腫

消丸各一貼以生小酒加少鹽空心吞下

○右在右灸左然後服走馬茴香丸茱萸內

○消丸各一貼以生小酒加少鹽空心吞下

○右先用猪膽二箇以汁浸二藥溫却用瓦

○一片或磚於火上燒紅放藥在上焙乾加

○乳香 没藥 补消 白礬

○百藥煎 血竭 苦參

○無名異 加河車 姜虧 金銀花

○右烏未乾以清油調搽濕則乾擦之如腫

○不退用益元散加防風荆芥何首烏煎水

○青木香 大黃 橋子牽牛

溫洗之

○瘡瘍下疳腫不消用

○防風 荆芥 草節 牛膝等分

○右煎湯薰洗之即消

○天蛇瘡方

○宴陀僧 黃連 黃柏 輕粉

○瘡瘍墜藥用赤葛根生姜一塊同搗爛鑑熟
酒服之汗出爲度滓上

○偏腎氣以本人口爲則於腰上灸偏在左灸
○追疔奪命湯祕方速効能內消腫

消丸各一貼以生小酒加少鹽空心吞下

○右在右灸左然後服走馬茴香丸茱萸內

○消丸各一貼以生小酒加少鹽空心吞下

○右先用猪膽二箇以汁浸二藥溫却用瓦

○一片或磚於火上燒紅放藥在上焙乾加

○乳香 没藥 补消 白礬

○百藥煎 血竭 苦參

○無名異 加河車 姜虧 金銀花

○右烏未乾以清油調搽濕則乾擦之如腫

○不退用益元散加防風荆芥何首烏煎水

○青木香 大黃 橋子牽牛

○瘡瘍下疳腫不消用

○防風 荆芥 草節 牛膝等分

○右煎湯薰洗之即消

○天蛇瘡方

○宴陀僧 黃連 黃柏 輕粉

○瘡瘍墜藥用赤葛根生姜一塊同搗爛鑑熟
酒服之汗出爲度滓上

○偏腎氣以本人口爲則於腰上灸偏在左灸
○追疔奪命湯祕方速効能內消腫

○消丸各一貼以生小酒加少鹽空心吞下

○右在右灸左然後服走馬茴香丸茱萸內

○消丸各一貼以生小酒加少鹽空心吞下

○右先用猪膽二箇以汁浸二藥溫却用瓦

○一片或磚於火上燒紅放藥在上焙乾加

○乳香 没藥 补消 白礬

○百藥煎 血竭 苦參

○無名異 加河車 姜虧 金銀花

○右烏未乾以清油調搽濕則乾擦之如腫

○不退用益元散加防風荆芥何首烏煎水

○青木香 大黃 橋子牽牛

在脚加 木瓜

右咬咀每服五錢重先將一服加澤蘭葉

少用金銀花各一錢生姜一兩重同藥搗

爛好酒燉熱服之如不飲者水煎加少酒

服亦妙然後用酒水各一盞半生姜十片

煎熱服以衣被蓋覆汗出爲度病退減後

再以前藥加大黃二錢重煎熱服或利一

兩次以去餘毒爲妙此方以藥味觀之甚

若不切然累用累効萬無一失矣如別有

它證出後宜隨證加減治之

○心煩嘔吐加 甘草節一豆粉(酸棗水下已)

嘔逆惡心加 乳香 豆粉(甘草湯下)

又用 紫荷草 老姜米醋一口磨下

心煩嘔名加 心煩嘔暑用 疏砂五苓散

嘔逆加母丁香 石蓮因前藥煎服又不
止用不換全正氣

○心煩嘔吐加 甘草節一豆粉(酸棗水下已)

嘔逆惡心加 乳香 豆粉(甘草湯下)

又用 紫荷草 老姜米醋一口磨下

心煩嘔名加 心煩嘔暑用 疏砂五苓散

嘔逆加母丁香 石蓮因前藥煎服又不
止用不換全正氣

○心煩嘔吐加 甘草節一豆粉(酸棗水下已)

嘔逆惡心加 乳香 豆粉(甘草湯下)

又用 紫荷草 老姜米醋一口磨下

心煩嘔名加 心煩嘔暑用 疏砂五苓散

仙傳外科秘方 卷九

潮熱加 北柴胡 黃芩 淡竹青

絲茅根

眼花加硃砂

雄黃 麻香少許

腹脹加薏苡仁

寒水石

自利加 白朮

茯苓 肉豆蔻 櫻栗殼

腹痛不止加

南木香 乳香

喘嗽加 知母

貝母

頭疼加 川芎 白芷

葱白

痛不止 蘿蔔子 川芎 葱白

太陽穴

痰涎多 生艾尾葉米醋搗取汁嗽去痰

太陽穴

咽喉痛 山豆根靈消根山梔子淡竹葉

太陽穴

大便祕 赤芍

枳殼

小便祕 赤芍

赤茯苓 木通

無脈服 二十四味流氣飲

飛龍奪命丹

專治療瘡發背膿疽乳癰附

骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛

者服之疼痛已成者服之立愈此乃惡證藥

中至寶病危者服之亦可矣萬無一失不可

輕忽

蟾酥

老酒化者

血竭

乳香

威靈

沒藥

威靈

雄黃

威靈

麝香

威靈

膽礬

威靈

輕粉

威靈

蟾酥

威靈

海羊

威靈

天龍

威靈

海羊

威靈

寒水石

威靈

硃砂

威靈

麝香

威靈

膽礬

威靈

海羊

威靈

天龍

威靈

蟾酥

威靈

○手心男左女右將丸子裹在葱白內用無

灰熱酒三四盞送下於避風處以衣被蓋

覆約人行五里之久再用熱酒數杯以助

藥力發熱大汗出爲度如汗不出重者再

服二丸汗出即効初覺二丸即消三五病

重者再進二丸如疔瘡走黃過心者難治

汗出冷者亦死如病人不能嘴惹搗碎裹藥酒吞瘡在上食後在下食前服服後忌冷水黃瓜茄子油麪豬羊雜肉魚一切發風發瘡毒等物及婦人洗換狐臭百發百

中

背瘡

血見愁一
乳香一分
赤石脂一錢半
水銀一錢半
水粉一錢半
大枫子一錢半
油胡桃一錢半
輕粉一錢半
井泉石一錢半

酸棗草半錢
當歸二錢
設藥一錢半
右瘡乾爲末每服七錢重熱酒調服如有生藥可用搗酒熱服留滓以敷瘡上○腰疼用黑豆炒熟以絇或布包綁腰上以姜搗成酒飲醉出汗爲度如無汗依前再作二三次必有神効

杖瘡

赤石脂生一錢半
水銀先微火燒三分
右三味用麻油杵成膏以羊紙敷之貼上繫縛如肉陷可用此膏填滿然後貼上立効
瘡瘻亦可治惡瘻

信 甘草 白礬生

右各爲末用碗一隻先將信末敷一層甘草末一層礬末一層用火燶之再依前敷藥燶三次掃下爲末冷水調敷瘡上不免少疼飲酒以醉爲度經宿其瘡自脫矣

拔疔諸疔不出者用巴豆半粒去殼研石爲末用葱涎同蜜爲膏以敷瘡上疔自出矣

凡諸腫毒用生姜面東過藥落地者就將於本地上陽日畫○圓陰日畫口圓一箇以姜蘸好米醋於圈內磨取地上泥括在鉢內入大黃芒硝末同姜儘研爛敷於毒處留開瘡口毒自出矣

蛇瘡瘻 輕粉 韶粉 打和搽之
亦瘡亦可治輕癬

大楓子 黃連 甘草
油胡桃 川椒
輕粉 白礬
井泉石

之藥到即効 小兒乳癬

右用粉草擦之後用油薑抹急慢驚風

右用冷坑中青青水一呷與之服即愈

仙傳外科集驗方卷之九