

仙傳外科秘方卷之十

造十

流儀原陽子題宜其集

治諸雜證品

救自縊死

自旦至暮雖已冷可活心下微溫者雖一

日已上可活急抱起死者使繩寬解去繩

切不可割斷繩也却與之微微捩正喉嚨

放倒卧用被蓋急用竹管吹其兩耳一人

急牽其髮不放手就用脚踏其兩肩一人

摩其背及屈伸其手足摩持之如活即以

粥飲與之此法殺人無不活者

救水溺死

先以刀斡開溺者口橫放筋一隻令其牙

齧之使可出水或覆甕或立甕以溺者腹

肚覆其上令頭垂出水如無甕橫腹圓

木上亦可水出後令徒夫屈死人兩足著

肩以上背相貼倒乾之而行令出其水盡

仍先打取壁土一堵置地上以死者仰卧

其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣

俞入土中其人或甦仍急用竹管各於口

耳鼻膈裏門內更透吹之令上下氣相通

又用半夏末少許搗其鼻如哈活用清粥

飲灌之

又孫真人救溺死法急解去死人衣帶艾

炙臍中即活

救冬月墮水凍死

凡四肢冷口不能言只有微氣者不可使

以大艾用布袋盛熱灰放在心頭冷即換

熱者待眼開却用溫酒或未飲灌之

救伏暑死

不可使冷冷之即死宜用溫湯常摩洗其

心腹間如路途急切用路上熱土置臍膈

間令人更尿其臍中即活

救暑渴死

用路上熱土大蒜等分爛研水調去滓飲

之即活

救卒中風不省人事多因痰壅

用白礬二錢重生研末生薑自然汁調粉

開口灌下其涎或吐或化下便醒

救卒中急不省者

用韭菜研汁灌入鼻中

救睡卧中不省死

用韭菜汁滴鼻中冬月用韭和根搗汁灌

之

治從高墮下瘀血沖心欲死

右豆豉一大盞水兩碗煎三沸去滓服若

便覺氣絕不能言取藥不及擊開口以熱

小便灌之

凡墮死縊死溺死癡死產後暈絕此名

右可用半夏一味為末如豆大吹納鼻中

須臾即活

神醫華陀云

十般危證急如風雨故選名方救之

一危證霍亂吐瀉或因飲冷或冒寒或失飢

或大怒或乘車船傷動胃氣令人上吐下瀉

不止頭旋眼花手足轉筋四肢逆冷方用

吳茱萸餅 木瓜餅 食鹽餅

右同炒焦先用瓦瓶水三升煮令百沸却

入煎三味同煎二升以下服之

一方用枯白礬為末每服一大錢百沸湯點

服

又方用鹽一撮醋一盞煎七分溫服或鹽梅  
鹹酸等物亦可煎服

二危證纏喉風閉腫痛手足厥冷即時氣閉  
不通用皂角三皮椰子一盞灌下立愈

一方皂角一皮百草霜一錢同研為末冷水  
調加清油數點灌之

又方升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌之即  
愈

三危證吐血內損或因酒色損傷心肺血氣  
妄行口鼻俱出

右用荆芥一握燒灰置地上出火毒細研  
每服三錢陳米飲調下

一方百草霜研細每服三錢濃米飲調三服  
妙

四危證中砂毒煩燥心腹絞痛頭旋欲吐不  
吐面青黑四肢冷

右用青蓋一握細研以井花水調下一碗  
灌之

一方麻油二升灌下

一方地漿水濃服三碗水傾入覆濁服之  
五危證尸厥奄然死去不省人事腹中氣走  
如雷鳴

右用生姜自然汁半盞和酒一盞煎令百  
沸并灌服之仍灸丹田百會氣海穴

六危證中鬼氣忽倒地四肢冷手握拳鼻口  
出血

右用雄黃為末一錢許煎桃葉湯調下  
一方故汗衫衣或觸衣久漆汗者男用女衣

女用男衣燒灰每服二錢七沸湯調服神效

七危證脫腸小腹急痛腎縮面黑氣喘冷汗  
自出

右用連鬚葱白三莖砂盆中研爛以酒五  
升煮取二升作二服仍用炒鹽充熨臍下

氣海穴處勿令氣冷為佳  
八危證鬼魔鬼擊房中被鬼打作聲叫喚不  
省

右用蠶心上槌碎為末每服二錢新汲水  
調下更挑半指甲吹入鼻中又灸兩足大

拇指聚毛中三七壯

又方用桃柳東生枝各三七寸煎湯三盞候  
溫灌服

九危證孕婦逆生  
右用槐子七粒研細新汲順流水下

又方用烏蛇連十一條燂退二七箇頭髮一束  
共燒灰溫酒調下三服仰卧片時即生

又方用小絹針就兒足心各刺三五針急用  
鹽塗刺處即順行矣

十危證胎衣不下急血湊心迷悶胎衣逆上  
右用赤小豆一升炒過水三升煮取二升

去豆取汁溫服立下  
又法以婦人自身手足指甲燒灰酒調下一

服却令有力婦人抱起將竹筒於心上趕  
下為妙

又婦人產方  
凡婦人臨月腰腹痛時未可使服催生符

藥亦不可使坐草常宜行立不可荒忙如  
果在殼中氣足自脫苟日月未足用藥一  
催即有橫生逆產之患如此死者乃自殺

之耳今列驗方于後

紫蘇飲治婦人胎前諸證此藥能安能催安胎順氣功効神異難述

紫蘇葉一兩大腹皮炒焙乾人參兩陳皮炒兩鹽川芎錢八甘草錢兩

北白芍藥四錢 川當歸錢一兩

右以咀每服三錢生姜三片葱白三寸水煎空心服胎前七八月宜加枳殼汁兩錢

煨砂仁三錢每日服臨產用順流水煎服

臨產腰腹陣作痛時取好滴乳香一

塊如小指頭大滾磨水一合盪溫服候破

水後却進催生藥

催生方

右用柞生枝一握長一尺淨洗甘草五寸

並剉碎水七盞沙瓶內紙密封之慢火煮

至一半候產母腹痛甚時溫飲一杯不過

二兩服覺下重即生此方亦治橫生逆產

死胎爛脹經日不下者屢驗

一方百草霜白芷等分為末童子小便和少

醋打成膏熱湯調下

又方木鬻頭或參處木鬻燒灰存性為末急流水調下

產難湊心不下者

右用蛇皮燒灰同麝香少許研細溫酒調下立產

胎衣不下

右用雞子清三箇去其黃以酸醋一合和之吸入口中即下

一法令產婦嚼自己髮尾於口中令嘔噦衣即下

又方草麻子十四粒去殼研塗兩脚心衣即下可洗去如不去則腸頭出如此時就以

此藥貼頂心縮回其腸多用此藥不妨如

腸入則洗去神効

產後敗血上衝發為血暈頃刻死人用陳艾煎湯入醋服之

婦人血崩

右用黃芩為末每服二錢先用紅鐵秤錘

置酒候沸定用酒調服

一方乾蓮房燒灰存性酒調每服二錢妙

又方好綿棕榔頭髮共燒灰存性用百草霜同研為末無灰酒調服

濟陰丹治婦人萬病

香附子 烏豆 乾姜 蒼朮

右各四兩重用黃子醋浸二七蒼朮止浸

一七後切作片子再浸一七取出烏豆再

炒過香附子搗碎加當歸一兩重萊葉半

兩重醋煮過同培乾為末糯米糊為丸如

梧桐子大空心溫酒或醋湯吞下每服二

三十九治證同局方

救解諸毒傷寒雜病一切等證

解百毒及諸食應子毒

右用甘草二兩生剉水三盞煎減半去滓

停冷每服半盞細細飲之未効更服或吐

無害

一方加大豆同煎尤驗

解百毒及開廣桃生金蠶蠱毒

右用甘草長七寸四十九莖浸煎坑中四

十九日淨洗為末蜜團紙收過中每時口

中嚙化即解

解砒毒

右用早禾稈燒灰新汲水淋汁絹濾過冷服一碗毒下利即安

一方白扁豆末新汲水調下

又方青黛甘草高豆煮水三碗服又濃煎豆

豉湯灌下又用錫器粗石上磨水服錫器

磨水尤妙單用楊梅皮煎湯二三碗服可

解諸藥毒死此證只有心間暖不妨乃是熱物犯之

右用防風一味搗冷水與服

一方白扁豆花搗水

又方豆粉調水末糖調水生姜搗水服皆可

解鼠莽毒

右用木藍根搗水數碗服神藥二

又方烏柏根搗水服之安鏡面草一味搗自

蒸汁小酒一盞許清油對攪攪勻服之即

下毒物三五次以肉粥補不可違

解巴豆毒煮黃連汁飲之

解家汗毒飲冷水即安

解蠱毒石菖蒲一味焙乾為末甘草煎湯下

病退為度

仙傳解毒毒呪

凡入蠱毒人家方入先開念呪三遍或七偏云父為蚯蚓蟲母為羅蛇女春屬七千人吾盡識得汝

右入門先開通蠱毒萬福舉眼從左手直

上數屋椽一偏却低頭如有茶酒食物來

即左手潛入衣服內拽取陰毛一莖於盤

內稱歸就主如前開念呪三偏如有藥盤

上自有蟲物出來却將毛繫之方知本主

自中

又方垢膩散

右用白礬一塊令病人咀之如覺馨甜即是蠱毒乃用梳齒內垢膩不拘多少食之即吐出惡物

解附子川烏天雄毒煮大小黑豆汁飲之

解斑蝥毒 大小黑豆汁飲之玉簪花根搗

水亦能解諸毒

解食野菌毒掘開黃土地窟以冷水傾攪令

濁少頃飲之名曰地漿可解上毒

又方用甘草節不拘多少用麻油一盞煎一

次勿令黑冷服油即解

解食河豚魚毒倉卒無藥急以清油多灌之

吐出毒物即愈

解毒散不以其何毒藥服之盡皆吐出神効

右以白礬石菖蒲等分為末新汲水調下

二錢兩服見効

神仙解毒丸方

青黛 自然銅 野茨菇 胡椒

貫眾 川芎 麝粉 壁土

黃連 桃根 培去 乾別 研 檳榔

赤小豆 萊豆 新傳

新瓦 磚 瓦 須 用 新 出 米 經 水 者 先 置 煎

三 味 研 以 上 十 重 甘 草 節 兩

右研為末訖用錫器磨水和藥却用糯米

粉煮湯搗搗和為丸煮極時以在水中

浮為度搗三千杵每丸如彈子大磨水服

神授太乙散治傷寒陰陽二證不問陰陽兩

感表裏未分皆效

川升麻 白芍藥 紫蘇葉

乾葛 陳皮 川芎

青皮 甘草 香附子

白芷

右等分為散每服三錢水一盞半生薑三片煎八分連進二服如頭痛加連翹葱白

三莖氣痞中滿加枳殼產婦嬰兒老人皆可服神効

治傷寒結胸

大黃連托 巴豆十四粒

右研為末津唾調餅子置臍中以艾炷灸其上候熱透腹中方止不拘壯數灸了即以溫湯浸手帕拭之去毒此法屢常救人

治瘧

好常山七 檳榔三

右為細末用雞子清圓如梧桐子大每服三十丸溫酒或醋湯吞下未發先夜一服發日五更初又一服必効若久病則多服取効

一方常山切片子用雞子清攪勻飯上蒸三次去雞子清以常山晒乾為末搗飯為丸

臨卧清早酒吞下二十九不吐不瀉即愈

又方青蒿薄桂二味各為末寒多多桂少蒿用老生薑二兩重連皮搗汁和熱酒調服以衣被蓋卧即愈一熱多多蒿少桂亦依前法服桂蒿三七分用

又方不問久年近日神効

右用常山一兩重瘦如雞骨者剉碎用好醋浸一宿瓦器內煮乾剉為散每服二錢重水一盞煎至半盞去滓停冷五更初服之不吐不瀉神効

又方知母貝母常山檳榔等分剉碎酒水各一盞煎至半盞去滓用綿蓋定露一宿五更來冷面東方服之不問寒熱瘧人久年不瘥一服見効但不可令婦人煎

治赤白痢方

右訶子六 醋炒去核取肉焙乾為末赤痢用生甘草煎湯調下白痢用炙甘草煎湯下只空心服之甚者不過再進

治痢九子

大半夏二 巴豆七粒 百草霜錢

京墨半粒如

右並碾為末用黃蠟三錢重清油少許溶和為丸如菜豆大每服七丸紅痢甘草湯下白痢乾姜湯下裏急後重枳殼湯下失食感冷泄瀉乾姜湯冷吞下暑瀉冷熱水吞下神効難盡

治禁口痢其證有冷有熱有冷熱不調皆須先發散表裏如手心熱目赤是熱宜用敗毒散加陳米煎服如手心冷及純下白痢者是寒宜以蓮肉不去心為末用米飲調每服三錢重候進飲食然後隨證冷熱治之

又方用紅木槿花不用蒂陰乾為末先用麩煎餅兩箇以花末糝其上食之食時先以湯灌開口為末

又治熱痢柴胡黃芩等分半酒半水煎七分浸冷空心或早服若血痢多加黃芩

又方鹽梅除核一箇合好春茶末用醋湯調服

轉筋泄瀉陳艾木瓜二味水煎入醋少許鹽

一檢服之

一方吳茱萸三錢重同艾煎湯一碗半分作三服即効又如藥不使只用艾葉生薑環同煎熱服

攪腸沙證發即腹痛難忍但陰沙腹痛而手足冷者其身上紅點以燈草<sup>連十</sup>熱油點火燒之

陽沙則腹痛而手足暖以針刺其十指背近爪甲處一分半許即動爪甲而指背皮肉動處血出即安仍先自兩臂將下

其惡血令聚指頭出血為好 又痛不可忍須臾禁令人死古方名乾霍亂急用鹽一兩熱湯調灌入病人口中鹽氣到腹即定又將石沙炒令赤色冷水淬之良久澄清水一二合服

又方陳樟木陳皮陳壁土各等分水濃煎去滓連進三四服即安

治霍亂吐瀉諸藥不納  
菜豆 胡椒各四十粒  
右二味研碎水煎服如渴甚研為細末新汲井水調服其効如神

又霍亂洞瀉不止  
右新艾一把水二碗煎一碗頓服若無新艾舊艾葉濃煎湯服

又方 木瓜 甘草

右到每服四錢水一盞半姜三片紫蘇十葉煎空心服

治癰疽發背初生灸法累試有驗  
凡入初覺癰疽背發已結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視候其紙先乾處即是結疽頭處取大蒜切成片如當三錢厚安在頭上用大艾壯灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方位最要早覺早灸為上方發一二日者十灸十愈三四日者六七愈五六日者三四愈過七日則不可灸矣若有十數頭作一處生者用大蒜研成膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦能安也若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者即用獨蒜切片如前灸法治之次日去痂膿自潰已

竹筒吸毒方  
竹筒去青皮似紙薄為佳其大小隨瘡斟酌應毒瘡初發時用  
白羨藜 蒼朮 烏柏皮 厚朴 鉅紅  
右四味咬咀用水一銚同煎竹筒煎煮以藥將乾為度乘竹筒熱以手按之於瘡上頃之其筒自粘在瘡上不必手按也仍更用前藥分兩再煮一筒候前竹筒冷以手拔去再換熱者如前法其膿自吸入筒中而瘡愈矣

十宣散治癰疽

凡癰疽皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散風邪流行氣血排膿止痛生肌長肉未成者速散已成者速清五毒不試而坐收功効許學士云昔有若背湯者請藥不痊乃用此方熱酒一升下藥五六錢少頃頓減七分數服後瘡潰膿出半月瘡口遂合又有婦人股間腫如碗服此而安又有腦發者服藥醉飲寐臥醒而病去但選藥精妙服藥者多服至瘡口合更服所以補前

損柱後患不飲者濃煎木香湯調下亦可  
仍略用酒為佳藥品于後

人參新羅者去當歸制神效如馬尾

黃耆用綿者如箭射長尺餘不開又者

厚朴厚而紫者去粗皮 甘草

桔梗漸心味苦者洗 白芷

桂用春薄者去

右十味取淨極乾方秤人參當歸黃耆各

二兩餘七味各一兩除桂外一處為末入

桂令勻每服三錢加至五六錢桂須多買

取淨未秤凡信心精合多服必効

黃蠟圓治發背癰疽諸般惡瘡皆効有人偏

身生瘡如蛇頭狀服之亦効

右白礬不拘多少生用為末每礬一兩重

用黃蠟七錢重溶開出大傾入礬末和勻

如梧桐子大每服十丸至二三十丸不拘

時米湯或溫熱水吞下如未破則內消已

破則便合不過十數服必効如因服金石

藥毒所致亦宜服此又只喫白礬末一二

十匙以溫湯咽下亦効黃蠟須是山蠟色  
黃者為佳不動臟腑止痛不問老少虛  
弱皆可服之大能護膜救心防熱毒內攻  
令人危困妙難盡述

柞木飲子治發背癰疽已成未成並宜服之

荳草根 甘草節 地榆四味各

右剉為散每服半兩水二碗煎至半碗分

作二服服之早晚常進病愈為度成膿者

自潰未成者自消忌一切毒食

又治癰疽難籠櫻葉研爛入鹽少許傳之留

出癰當立効

治瘰癧不問已破未破用烏雞子頂上開竅

攪青黃勻却以線繫班貓一箇去頭翅足

入雞子中紙糊蓋之飯上蒸熟剝去殼去

貓空心喫雞子一日一箇以瘰為度

又方不蛀皂角三十條作一束以棕桐裹之

縛定於廁坑內浸一月取出於長流水內

再浸一月切不可用死水浸去棕曬乾不

可培搗羅為末每皂角末一兩入麝香半

錢全蝎七箇研細拌勻每服二錢溫酒或  
湯飲任調服之不過二三兩重即安

治疔瘡凡疔瘡不破則毒入腸胃不治

右用蟬退一味為末蜜水調半碗飲之及

用其末津唾調塗瘡上瘡口自潰

一方烏梅三四箇取肉打爛以絹片緊縛在

瘡上却將菊花及根苗插酒飲之不飲酒

者用湯次日晚拔去烏梅自潰

又方生蜜與隔年葱一處研膏先刺破後上

藥用帛縛住如人行五里久覺疔出後以

熱醋湯洗去

治膿瘡血蝎一味研末傳瘡上以乾為度

一方谷丹無名異細研清油調搽濕則乾傳

其上

又秘方蜜窰內黃土累經燒過者研細入黃

柏赤石脂黃丹輕粉末拌勻清油調油絹

或藥貼瘡上外以布絹縛定其瘡縱痒不

可以手開動直至數十日後瘡愈去之

治疔瘡疥瘡雄黃硫黃黃連蛇床子剪刀草

各等分為末用巴豆七粒麻油煎黑

為度去豆倅油冷入好輕粉用前藥末調塗之

合掌散治諸般疥癩瘡

馬兜鈴子一兩半白礬二錢硫黃三錢  
研

右以清油勻調塗手上搓熱呵之以鼻嗅  
翕其氣其瘡自安

治急瘡腫如梅李小豆者用

吳茱萸兩 小蒜兩

右研合傳之日三換以好為度

治多年瘡口不乾冬瓜葉焙研末貼累効

治妳癩蛇蛻一錢甘草一錢吳溫酒調下如已破用前藥以生油塗

一方皂角燒灰蚌粉二味和勻酒調服仍用手搽散之

一方收五月五日粽箬燒灰調酒服即散累效

有功

又方馬鞭草酒搗炒如椎碎姜一塊帶熟服

一二碗就以滓治患處

治水衝瘡梳子一箇去穢入白礬一塊於內

大中燒之連殼礬為末塗瘡上仍先用水洗淨瘡藥

治疔瘡爐乾石火煅醋淬為末油調搽加香

茶孩兒泥尤妙

一方生銀杏槌碎亦可治

一方黃栢雞子清和炒三五次為末清油調搽濕則乾瘡

又方橄欖一箇全用燒灰油調搽

治一切頭上瘡熟煮雞子黃炒令油出以油將輕粉和勻傳之

一方半胃散一貼入輕粉清油調傳之

治口瘡甘草白礬等分為末噙化又研吳茱萸醋調塗脚心

又方五倍子為末搽之

又方治三焦有熱口舌生瘡疼痛不可忍者效

用

右以朴硝五味子滑石黃蘗黃白礬枯黃

丹炒寒水石煨玄胡索等為末搽瘡上良久立愈

治諸腫毒癰疽已潰令愈未潰令消用

右用草烏一味為細末并花水調塗腫處留瘡頭勿塗破者不可塗瘡口或加芙蓉葉尤妙

治腎風陰囊痒手又白

用糯草將皂角在草內燒烟薰之十餘偏即愈喫藥可服清心蓮子飲

治纏蛇丹竈心上乾研清油調塗

一方糯米粉和鹽同嚼唾患處

一方上綉鐵丁磨水搽

又方馬蘭丹草搗醋搽之即痊

蛇頭指痛不可忍是不可聞

右用蜈蚣一條培乾為末猪膽汁調搽

又方黑豆生用為末却將黃梔子殼一箇納豆末於內籠縛在指頭上即安

懸眉瘡猪腿筒骨五根或七根生打開取髓入銅銚溶却旋旋隨多少入白膠香末攪勻成膏為則取出於新磚上去火毒一時研末入輕粉隨骨數幾貼油調搽濕則乾

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡



治咽喉用川升麻一兩重煎水一碗口含一時許却吞下三服愈

又方用白礬枯託置地上少時出火毒以口噙化妙

治纏喉風肥皂角一條去子細剉用清水一大盞浸研絞取濃汁入生麻一呷筋攪勻頓服以鴉毛頻攪咽中吐涎為度然後用解散風毒藥治之

又方白藥磨醋噙吐毒涎妙

治重舌白卷生谷丹<sup>五</sup>倍子為末用蜜調塗舌上少頃用水漱之再塗以安為度

又方蒲黃少許搽舌上即消

治舌腫硬閉塞悶亂百草霜食鹽等分并花水調塗舌上愈

又治喉閉重舌朴消白礬為末糝入口中

又用好醋磨膽礬噙吐涎妙

治反胃反胃之疾十有九死非藥不効良因輒強以食或飲以羹湯是速其吐今得其說不強以食絕其羹湯先投來復丹暑藥知其非伏暑證遂投養正靈砂之類飢則以飯炒

香乾咳之一點湯水亦不與三日後竟不復吐飲食如初治方用

右以甘蔗搗汁七升生姜搗汁一升打和分作三服

一方棗子一箇去核裹全班猫一箇用文武火煨畢去猫用棗空心服之白湯送下

又取鹽瀉汁每日服一盞妙

治反胃九仙餅

人參<sup>二錢</sup> 南木香<sup>不見大甘草錢</sup> 南星<sup>二錢</sup> 半夏<sup>五錢</sup> 枳殼<sup>一兩</sup> 白礬<sup>一兩</sup> 厚朴<sup>五錢</sup> 豆豉<sup>一兩</sup> 右九味各依等分製過為細末候夜間晴時露過以人參厚朴煎湯糊作餅子小平錢大慢火焙乾每服一餅用姜一大塊切

作兩片夾餅子藥用紙裹浸濕慢火熟煨連姜及餅子齧碎以真料平胃散調湯吞下切忌諸般生冷仍令病者寬心開懷服藥調理方可見効

治反胃久藥不効及小兒吐不止者

右用好硫黃半兩細研入水銀二錢半同研無星每服三錢先取生姜汁酒一盞煎熱調藥空心服調時逐漸著酒緩調令勻服了用被蓋汁出安

治消渴神効散

白芍藥 甘草<sup>炙</sup> 右等分為粗散每服三錢重水一盞半煎至八分去滓服不拘時日三服疾止則已

治消渴神効圓

蜜陀僧<sup>二</sup> 黃連<sup>去</sup> 右為細末蒸餅糊為丸梧桐子大濃煎蜜皮鹽湯或酒或茄根湯吞下一日五九日增五九至三十九止不可多渴止勿服昔旅店有客患此病夜求水不得酌釜中湯飲之而愈旦往視之乃饅頭湯也

又方用雄牛<sup>半</sup>穿鼻木燒灰存性為末酒調服或剉碎煎湯服之數服見効

治小便不通烏柏木皮煎湯調下五苓散立通如無藥處只以柏皮煎湯亦可

又方荆芥九錢大黃一錢煎服妙

治大便不通及老人風虛秘結

右用陳皂角燒灰存性以碗蓋在地下一宿空心酒下立通或以雞篋子搗冷水下即通

又方大黃九錢重荆芥一錢重空心水煎服即効

又治大小便不通經三五日者用不蛀皂角燒灰以米湯調下五錢即効

治小便出血以車前子根葉多取淨洗取汁頻服可通五淋

治沙石淋痛不可忍

右凡助斃甲一箇天酥令脆研為末酒調服一匙以効為度

又方土牛膝淨洗一握水五盞煮至一盞以滓以麝香乳香少許研細調服

又方黑豆一百二十粒粉草豆寸剉新水煎乘熱入滑石末一錢空心服

治血淋多因虛損得之

右用干胃散每服五錢重加龍骨一錢同煎空心服之數服見効

又方白梅燒灰存性為末入麝香少許酒糊

九桐子大熟水吞下五十九

治白濁小便濁頻甚者

右用陳冬瓜仁炒為末空心米飲調下五錢許多服見効

又方白茯苓四兩猪苓一兩水一碗煮至半

去猪苓用茯苓培乾為末溶蠟丸彈子大每服一丸早晨細嚼用燈心棗子麥門冬煎湯送下或服草解分清飲

治久患脾泄生薑四兩黃連一兩二味剉碎

一同慢火炒令姜乾脆深赤色去姜用黃連為末每服二錢空心茶清調下或服前

黃蠟圓亦効觀禮

治水腫黑豆煮去皮培乾為末米飲調服每服二錢重

推車圓治黃腫水腫

白麩碎 明礬碎 青礬碎

右三味同炒令赤色醋煮末糊為圓棗湯下三十九

又黃腫方

三棱糊 莪米糊 蒼米糊

厚朴煨汁 陳皮去白各甘草碎

青礬碎

右前六味為末後將青礬同占米粉和研作糊為丸每服五六十丸米湯吞下忌猪

母雄雞鴨牛羊等肉毒食

秘方治黃腫水腫酒黃積痛並皆治之

青礬碎 或之末醋一大盞和勻瓦

平胃散 烏藥順氣散略詳

不忘口可加錫灰

右為末打和煮醋糊丸每服大丸用九圓

十一圓者多至三十九丸空心南酒或姜鹽湯送下

又秘方無名丸治水腫病心腹堅脹偏身腫痛咳嗽喘急並治之

赤茯苓 大戟 甘遂各一兩切

先花碎 檳榔碎 青皮碎

黑牽牛碎

右總為末薄麩糊為丸如梧子大每服三十丸隨病虛實加減丸數用之湯使如後

水腫海藻破故紙白朮煎湯下面腫陳皮煎湯下肚腫升麻煎湯下腰腫葶藶子煎湯下四肢腫桑白皮煎湯下脚腫生末一撮將水洗過米次擦洗搗碎用沸湯泡飲送下如苦大便來多不住用冷水浸脚手便住婦人胎前產後切不可服此藥並要五更空心服之如脚膝腫服藥後當聞起兩足而卧令水流至脚間從大小便出則腫自消其日不可他服別藥更忌甘草併斷鹽半年即不發矣此藥不可多服又不

○可日日服如一次取水不盡當三日一次用藥其餘二日可服生料五苓散嘉禾散相和用姜棗煎服以能理脾進食清利水道腫自消矣

治便紅烏梅燒存性不拘多少醋煮末糊為圓湯酒任下

一方黃連栢葉培二味為末空心酒調

一方荆芥穗砂仁為末每服三錢糯米飲調下日進三服

又方五倍子為末鹽梅搗膏凡梧子大母服

五十九酒湯任下

又治瀉血百藥煎不拘多少研生肌研末軟飯丸每三十丸未飲下

治腸風痔漏等疾白芷一味以米泔浸一宿取出切片用火煨地令熱掃去灰將紙放在地上以白芷鋪上翕乾為末每日酒調下

一方皂角去子及皮蜜炙為末末糊丸未飲吞下

一方蒼耳葉或子培乾為末蜜調服

○塗洗藥朴消并花水調洗如要塗用蜜和雞蘇丸并朴消調搽上

一方銅青蜜陀僧各一錢麝少許為末津液和調搽之

痔瘡突出坐立不便効速如神韭菜淨洗以沸湯煎泡於瓦木器內薰之通手沃洗最佳也

一方西瓜皮煮熟聞香氣以上法薰洗

又法生薑切薄片放在痔上痛甚處以熱艾作炷於姜上灸三壯黃水即出自消若肛

門上有兩三箇痔三五日後如前法逐一灸之屢試甚効

治脫肛馬龍尾坤膠同鼠糞和之燒烟於桶內令坐其上薰之數徧即不脫矣

治咳嗽

人參 鹿 防風 薑 半夏 湯  
甘草 陳皮 枳 椴 性 產  
杏仁 去 皮 麻 黃 性 桑 白 皮 性 粗  
紫 蘇 兜 苓 性 去 筋 膜 炒 加 無 灰 東  
烏 梅 性 半 箇 服

○右等分吹咀每服三錢重生姜五片煎至七分去滓睡至一更盡通口服或併滓或留滓次夜服量證輕重勞嗽加五味子五心煩熱加地骨皮口乾加人參門冬痰多加南星地腹脹加枳殼炒胃滿加枳殼肺脈加桑白皮炒大便秘結加大腹皮夜睡多驚加人參遠志鼈頭不得加苦亭陸喘急腰疼脚膝無力加木瓜烏藥手足麻痺加烏藥防己感冷咳嗽加乾姜肉桂細辛夫聲加訶子薄奇發則咳嗽不已別煎

九寶飲加重使水煎服吐紅加茅花雞節吐咳紅綠加蒲黃茅花燒灰入藥咳粉紅者加百合五倍子茅花三件同燒灰存性飲食不進加白芍藥白朮姜棗同煎暴咳紅者及五心發熱別煎茯苓補心湯加茅花蒲黃煎咽乾口燥加人參乾葛傷寒惡風喘急咳別煎小青龍湯四時感冒金沸草散加桑白皮寒熱感風咳嗽頭疼加川芎白芷姜蔥煎傷寒發熱咳嗽去寒殼加柴胡黃芩潮熱咳嗽者參蘇飲徐徐煎服孕婦只服百合散

凡燒灰者只入在盞內傾藥同服服此藥後平老凡米飲空心下

凡咳嗽切忌生冷鹹酸燒煎炮油膩酒麩羊肉子鴨魚腥豆腐房事

人參交龍散治諸嗽不愈者

人參 阿膠炒 款冬花 東棘味

右等分每服三錢烏梅一箇煎半夜服

二母散治喘急倒頭不得痰涎湧盛

知母 貝母

右二味為末臨睡白湯溫調服如喘急加苦葶歷末久嗽不止加兜苓末如無以粟殼代去筋膜不製

黑龍丸化痰治嗽不問老少逐年近日諸般咳嗽

明礬 枯 池礬 枯 南星 炮 二 百藥煎 錢 五倍子 錢 末 油 豬牙兒 錢 去烏梅肉 錢 半 夏 錢 二

右為末麩糊丸梧子大每服三十九丸冷嗽淡姜湯臨睡下熱嗽茶清睡時下

化痰圓

明礬 錢 一 南星 錢 半 夏 泡 右為末姜汁煮糊丸小梧子大每服二三十丸食後姜湯下

舊本一檢金

知母 一 貝母 一 巴豆 一 粒 右研細和前藥令勻每服一字用姜三片兩面藥藥卧床上細嚼咽下使睡即定次日必利小兒止用一半

治失聲

皂角一挺去皮蘿蔔三兩切

右水一碗同煎至半碗以下服之不過三服能語聲出

治鼻衄蘿蔔自然汁半盞酒半盞和勻湯內溫過服効

又方婦人髮燒灰香附子末搗勻同煎湯服一方梔子不拘多少燒存性為末搗入鼻中立安

又方鬱金末白茅花煎湯調服又車輪上垢膩丸成塞孔中妙

如神丹治頭風頭疼不可忍

光明硫黃 一 硝石 一

右同研細水圓如指頭大空心茶嚥下

又方三靈散治八般頭風草烏細辛等分黃丹少許為極細末搗入鼻中

紫虛元君頭風丹

大川烏 兩 兩者以河水煮一沸去水於砂黃色 連細辛 四兩 重法磨香許 為皮色 高細茶芽 研

11 046 14 10-6

右為末每服三錢食後臨卧茶清調下少時更以熱湯催汗出或鼻出涕為度治心脾氣痛桂心為末白湯煎服酒調亦可一方晚露沙不以多少用滾湯泡過取清水服之立止

又方玄胡索胡椒末酒調服神應散治小腸氣痛

玄胡索 胡椒

右為末每服二錢酒水各半蓋煎服

小腸膀胱腫脹香附子末海藻煎湯調下

又方四聖散治疝氣外腎腫脹

茴香炒 川山甲炒 全蝎炒

南木香

右等分為末酒調二錢一服痛住甚妙

又方燈籠草連梗葉搗一握許入罐內又入槌碎生薑一塊大及生酒同煎空心熱服

又方五苓散去肉桂加黑牽牛桔梗車錢子名蟠葱散數服妙

又方食茴香乳香末猪苓桔梗木通甘草等

分加燈心一握淡竹葉勻煎多服取効

治偏墜氣方先服復元通氣次五苓散各

三錢去桂加黑牽牛吳茱萸湯等分如脈

加陳枳殼吟狀痛甚加八角茴香煎服

治紫癍風疎黃煎一兩醋海蝶峭餅同研為末

浴後以生薑煎藥熱擦患處須謹風少時

數度斷根

又方知母磨醋擦

吐血咯血側柏葉瓦上焙乾為末末飲調下

三錢三五服効

一方連葉焙乾為末末飲調下二錢許

又方服自通新熱小便

又方鍋底墨煨過研細并花水調下

骨鯁乳香二錢研細水調吞數口

一方沙糖喻化細細咽之其鯁自下又芋根

神神同所鯁骨之內煎湯下又宿砂仁甘

草乾嚼咽下又朴硝咽之若治魚骨以魚

骨置頭項心即下

又方不問雞魚骨鯁朴硝研細對入雞蘇丸

如彈子大仰卧喻化三五圓自然化去

誤吞針磁石一塊呵之即出又多食猪羊肥

肉自瀉出

小兒誤吞錢用炭燒紅急搗為末煎湯呷之

立効

誤吞鐵石骨刺不下危急者用羊不留行黃

柏柏等分為末浸蒸餅丸如彈子大青

黛為衣以線穿掛當風處每服一丸冷水

化開灌下

毒蛇傷急飲好醋一二碗令毒氣不隨血走

或飲清油一二盞亦可然後用藥或用頭

繩扎定傷處兩頭次用白芷為末白水調

下半兩許服之頃刻咬處黃水出盡腫消

皮合

一方雄黃為末塗之又用水調服亦可

又方白礬雄黃黃蠟等分為末成丸如指頭

大每過者傷處於香匙上溶熱滴於瘡上

或以竹管按上滴入則毒不散尤妙

治百蟲入耳搗韭菜汁和醋灌耳中又以大

髮梳葉塞耳立出又清油灌耳中即出又

割雄雞冠血滴入耳

耳中血出龍骨末吹入耳中或白礬枯為末

入鼻吹之即止

耳中常潤濕及出膿或黃水者

黃丹一錢 赤芍藥二錢 凌消花二錢

右總為末吹入耳中如不退加白礬一錢

臘脂一錢 五倍子二錢 全蝎三錢

右為末同吹入即乾

耳聾久不聞聲

紫磁石一豆 麝香一 駝鷄油竹筒收

右用新綿裹了塞於所患耳內口中嚼少

生鐵覺耳內風雨聲即愈須作三五次方

可

惡蟲叮咬大紙燃一箇麻油點燈照重傷處

其毒盡入油烟內

誤吞馬蝗蟻致腹痛者用田泥為丸以水吞

下其蟲必隨上瀉出也

蜘蛛瘡用羊乳敷其上或用清油搽之即安

顛狗咬韭菜根搗汁多服又桃白皮煎服或

灸傷處三五壯又真膽礬為末貼瘡上立

愈

蜈蚣咬嚼菜葉搽之又雞糞塗又生姜汁調

并粉搽又以刀斫桑樹皮取汁塗立愈好

又疼痛不可忍用艾火灸傷處三五壯又

以清油燈草點燈以燈烟熏之亦止不問

其他毒蟲傷亦可用此熏極驗

黃蜂蟻以熱酒洗之立効或用清油搽上

虎傷先喫清油一碗次用油洗瘡口又以乾

葛煎水洗又沙糖水調塗仍服沙糖水一

兩碗

蛇傷服藥

細辛五錢 白芷五錢 雄黃二錢

右為末入麝香少許每服二錢溫酒調下

又方貝母為末酒調冷服能飲者盡量飲之

須久酒因傷處為流清水候出水盡却以

藥滓敷瘡上即愈矣

湯火傷水磨炭末塗或磨土朱塗或用真桐

油塗又用栢葉搗爛敷痛處黃蜀葵花葉

搗敷

凡湯火傷急向火灸雖痛強忍一食頃即

不痛又不可以冷水冷物搗之熱氣不出

必爛入肉切宜保之

刀斧傷損血不止痛難忍者用葱白鍋內炒

熱搗爛乘熱縛定痛與血隨止蔥冷再換

盒痛處葱葉杆碎炒熱盒又用多年石灰

研細加大黃為末等分炒粉紅色為度傳

傷處

又方鍋底黑殿研傳之又白炭石膏炒同為

末糝瘡上亦可收口

又方無名異末搽

治閃脚手足疼痛生薑爛搗和麴炒熱盒之

加葱白炒

物入眼中不出清水磨好墨點眼角即出

耳出膿水生白礬末吹入耳中日三次立効

針織竹木刺入肉不出者乾烏羊屎十數粒

為末水調厚敷其上痛即住刺自出

一方嚼栗子黃傳之

一方竹木刺入肉黑豆研爛水調塗之

又方單麻子仁爛研先以絹帛襯傷處然後

傳藥時時看之若見刺出即放之恐藥緊

努出好肉或加白梅肉同研傳妙

冬月手足皸裂白炭末水調塞之忌三五日

不犯水

治寒足跟凍爛五月五日午時用姜葱艾搭

一時詩更不再發矣

治牙痛青蒿一握水一碗煎至半碗待溫漱

之疼即止

一方良姜草烏二件為末楷齒有涎即吐不

可吞吐涎舉以鹽湯漱口

又方蟲牙風牙喫藥有陰陽虛實服之

春正氣散 夏敗毒散加大黃枳殼 秋冬

五積散消風散

去蟲積檳榔一味為末蜜水調下令患者先

日少喫飯臨晚亦勿食次早五更服之

穿掌毒新桑葉研爛包盒上即愈

仙傳外科秘方卷之十

仙傳外科秘方卷之十一

卷十一

後儀原陽子趙宜真集

治諸雜證品

小兒五心煩熱渴欲飲水者煮黑豆與食之

安

小兒慢驚昏沉時或搐掣為藥磨水暖熱與

服

小兒急慢驚風震靈丹二十米復丹樹白圓

子樹三味研勻糯米糊丸如菘豆大大者

五丸小者三丸慢驚用北棗陳皮煎湯吞

下急驚用生薑自然汁百沸湯下

小兒十種丹瘤許學士云此十種丹毒如三

日不治攻入腸胃則不可治也宜逐一子細

辨認依此方治之萬不失一

一飛竈丹從項頭起腫用葱白研取

二吉竈丹從頭上紅腫痛用葱心研取

三鬼火丹從面起赤腫用葱心研取

四天火丹從背起赤腫用葱心研取

五天竈丹從兩臂赤腫黃色用葱心研取

六水丹從兩脇虛腫用葱心研取

七胡火丹從臍上起黃腫用糯米調

八野火丹從兩脚赤腫用糯米調

九烟火丹從兩脚有赤白點用糯米調

十胡漏丹從陰上起黃腫用糯米調

小兒頭瘡胎毒諸風熱急瘡瘡瘡用

黃柏 黃連 白芷 五倍子

右四味等分研細末用井花水調稀稠得

所塗開在碗內覆架兩磚上中空處灼艾

烟熏蒸以黑乾為度仍取下煎藥再研作

末清油調塗如有蟲則用煎油調搽

又方五倍子白芷等分為末有膿水乾滲其

上其膿水即收如乾痂以清油調塗

小兒痘眼以谷精草為末以白柿或猪肝或

錫糖點喫

生犀復明散治諸般眼疾

赤芍藥 黃芩 木通

桑白皮 龍膽草 防風

羌活 當歸尾 大黃

枳殼

右吹咀每服五錢水一盞半新煎桑白皮