

又方黃芩一兩杏仁二十枚牡蠣一兩水三

升黃取一升頓服

治厥逆煩滿常欲嘔方小草桂細辛乾薑椒

各二兩附子二兩炮搗蜜和丸服如桐子

大四丸

治卒吐逆方灸乳下一寸七壯即愈

又方灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各

一壯又灸兩手中央長指下一壯愈

此本雜治中其病亦是痰壅霍亂之例兼宜

依霍亂條法治之卒在此上條患者亦少

皆因他病兼之耳或從傷寒未復或從霍亂

吐下後虛燥或是勞損服諸補藥痞滿或觸

寒熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各

循其本源為治不得專用此法也

附方

陸一

千金方治心腹脹短氣以草豆蔻一兩去皮

為末以木瓜生薑湯下半錢

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不

得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿方

厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑

為度搗篩如麵以陳米飲調下二錢七日

三服良亦治反胃止瀉甚妙

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胃

滿悶

不蛀阜角去皮子塗好醋炙令焦為末一

錢七巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研

好墨為丸如麻子大每服三丸食後陳橘

皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度

如常服消酒食

梅師方治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下

部中冷即易之

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半

蓋和蒸令軟時時含一棗大燕津

葛仙翁肘後備急方卷之一

陸一

手七

葛仙翁肘後備急方卷之二

陸三

治卒霍亂諸急方第十二

凡所以得霍亂者多起飲食或飲食生冷雜

物以肥膩酒醢而由風履濕薄衣露坐或夜

卧夫覆之所致

初得之便務令細以炭火布其所卧下大

熱減之又並蒸以微絮若衣絮自苞冷易熱

者亦可燒地令熱水沃敷薄布席卧其上

厚覆之亦可作灼灼尔熱湯著甕中漬足

令至膝并銅器貯湯以著腹上衣藉之冷

復易亦可以熨斗貯火著腹上如此而不

淨者便急灸之但明案次第莫為亂灸須

有其病乃隨病灸之未有病莫預灸灸之

雖未即愈要萬不復死矣莫以灸不即而

止灸霍亂艾丸苦不大壯數亦不多本方

言七壯為可四五十無不便火下得活服

舊方用理中丸及厚朴大豆豉通脉半夏

湯先輩所用藥者難得今但疏良灸之法

及單行數方用之有效不減於貴藥已死

未艾者猶可灸

餘藥乃可難備而理中丸四順厚朴諸湯可不預合每向秋月常買自隨

卒得霍亂先腹痛者灸臍上十四壯名太倉在心厭下四寸更廣之

先洞下者灸臍邊一寸男左女右十四壯甚

者至三十四壯名大腸募洞者宜瀉

先吐者灸心下二寸十四壯又并治下痢不

止上氣灸五十壯名巨關正心厭天頭下一寸是也

先手足逆冷者灸兩足內踝上一尖骨是也

兩足各七壯不愈加數名三陰交在內踝尖上三寸是也

轉筋者灸臍心當指大聚筋上六七壯名

涌泉又灸足大指下約中一壯神驗

又方灸大指上爪甲際七壯

轉筋入腹痛者令四人捉手足灸臍左二寸

十四灸股中大筋上去陰一寸

若宛者灸手腕第一約理中七壯名心主當

中指

下利不止者灸足大指本節內側寸白肉際

左右各七壯名大都

乾嘔者灸手腕後三寸兩筋間是左右各七壯名間使若正厥嘔絕灸之便通

小品方起死

吐且下利者灸兩乳連黑外近腹白肉際各

七壯亦可至二十七壯

若吐止而利不止者灸臍一夫納中七壯又

云臍下一寸二十七壯

若煩悶濇滿者灸心厭下三寸七壯名胃管

又方以鹽內臍中上灸二十七壯

若達臍痛急者灸臍下三寸三七壯名關元

良

治霍亂神祕起死灸法以物橫度病人人中

屈之從心鳩尾飛度以下灸先灸中央畢

更橫灸左右也又灸脊上以物圍令正當

心厭又夾脊左右一寸各七壯是腹背各

灸三處也

華他治霍亂已死上屋喚魂又以諸治皆至

而猶不差者

捧病人腹肘之伸臂對以繩度兩頭肘尖

頭依繩下夾背脊大骨宗中去脊各一寸

灸之百壯不治者可灸肝椎已試數百人皆灸畢即起坐他以此術傳子孫代代皆

祕之

右此前並是灸法

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

鹽二升以水五升煮取二升頓服得吐愈

又方生薑若乾薑一二升以水六升煮

三沸頓服若不即愈更可作無新藥煮滓

亦得

又方飲好苦酒三升小老羸者可飲一二升

又方溫酒一二升以蠟如彈丸一枚置酒中

消乃飲無蠟以鹽二方寸七代亦得

又方桂屑半升以煖飲二升和之盡服之

又方濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處

又方取楠若樟木大如掌者削之以水三升

煮三沸去滓令灼之也

又方服乾薑屑三方寸七

又方取藜若葉細切二升水五升煮三沸頓

服之煮乾蘇若生蘇汁即亦佳

又方小蒜一升以水三升煮取一升頓服之

服之

又方以煖湯漬小蒜五升許取汁服之亦可

又方以人血合丹服如梧子大二九

又方生薑一斤切以水七升煮取一升分為

三服

又方取賣解家机上垢如雞子大温酒服之

差

又方飲竹瀝少許亦差

又方乾薑二兩甘草二兩附子一兩水三升

煮取一升內猪膽一合相和分為三服

又方蘆蓬茸一大把濃煮飲二升差

若轉筋方燒鐵令赤以灼腫白肉際上近後

當縱鐵以隨足為留停令成瘡兩足皆爾

須更間熱入腹不復轉筋便愈可脫刀燒

燬尾用之即差

又方煮苦酒三沸以摩之合少粉尤佳以絮

胎縛從當膝下至足

又方燒梔子二七枚研末服之

又方桂半夏等分末方寸七水一升和服之

差

又方生大豆屑酒和服方寸七

又方燒蜈蚣膏傳之即差

若轉筋入腸中如欲轉者

取雞矢白一寸水六合煮三沸頓服之勿

令病者知之

又方苦酒煮衣絮絮中令温從轉筋處裏之

又方燒編薦索三撮仍酒服之即差

又方釜底黑木酒服之差

若腹中已轉筋者

當倒擔病人頭在下勿使及也腹中平乃

止

若兩臂脚及胃脇轉筋

取鹽一升半水一斗煮令熱灼耐滑手

足在胃脇者湯洗之轉筋入腹中倒擔病

人令頭在下腹中平乃止若極者手引陰

陰縮必死猶在倒擔之可活耳

若注病不止而轉筋入腹欲死

生薑二兩累擘破以酒升半煮令三四沸

頓服之差

治霍亂吐下後心腹煩滿方

梔子十四枚水三升煮取二升內豉七合

煮取一升頓服之嘔者加橘皮二兩若煩

悶加葱一升甘草一兩蜜一升增水二升

分為三服

治霍亂煩躁卧不安穩方

葱白二十莖大棗二十枚水三升煮取二

升頓服之

治霍亂吐下後大渴多飲則熱人方

以黃米五升水一斗煮之令得三升清澄

稍稍飲之莫飲餘物也

崔氏云理中丸方

甘草三兩乾薑人參白朮各一兩搗下篩

蜜丸如彈丸覺不住更服一枚須臾不差

仍温湯一斗以麩肉中服之頻頻三五度

令差亦可用酒服

四順湯治吐下腹乾嘔手足冷不止

乾薑甘草人參附子各二兩水六升煮取

三升半分爲三服若下不止加龍骨一兩

腹痛甚加當歸二兩胡洽用附子一枚桂

一兩人霍亂亦不吐瀉但四支脉沉肉冷汗出渴者即差

厚朴湯治煩嘔腹脹

厚朴四兩炙桂二兩枳實五枚炙生薑三兩以水六升煮取二升分為三服

凡此湯四種是霍亂諸患皆治之不可不合也霍亂若心痛尤甚者此為挾毒兼用中惡方治之

附方

孫真人治霍亂

以胡椒三四十粒以飲吞之

斗門方治霍亂

用黃杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之

外臺秘要治霍亂煩躁

燒亂髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服

又方治霍亂腹痛吐痢

取桃葉三升切以水五升煮取一升三合分溫二服

梅師方治霍亂心煩利無汗

取梨葉枝一大握水三升煎取一升服

又方治霍亂後煩躁卧不安穩

葱白二十莖大棗二十枚以水三升煎取二升分服

兵部手集救人霍亂頗有神效

漿水稍酸味者煎乾薑屑之夏月腹肚不調煎呷之差

孫用和治大瀉霍亂不止

附子一枚重七錢炮去皮臍為末每服四錢水兩盞並半錢煎取一盞溫服立止集效方治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛

風不省人事服此四肢漸暖神識便省

回陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚水一盞半同煎至八分溫服未省再服聖

惠方治霍亂轉筋垂死

敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁溫溫頓服

又方治肝虛轉筋

用赤藜莖葉切三合水一盞酒三合煎至

四合去滓溫分二服

又方治肝風虛轉筋入腹

以鹽半斤水煮少時熱漬之佳

孫尚藥治脚轉筋疼痛掣急者

松節一兩細剉如米粒乳香一錢石件藥

用銀石器內慢火炒令焦只留三分性出

火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應時筋病皆治之

古今錄驗方治霍亂轉筋

取麥一手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

治傷寒時氣溫病方第十三

治傷寒及時氣溫病及頭痛壯熱脉大始得一日方

取青兪根葉合搗三升許和之真丹一兩

水一升合煮絞取汁頓服之得吐便差若

重一升盡服厚覆取汗差

又方小蒜一升搗取汁二合頓服之不過再作便差

又方烏梅二十七枚搗五合以水三升煮取一

升去滓頓服之

又方取生仔木削去黑皮細切裹白一升以

水二升五合煎去滓一服八合三服差

又方取木九子二十七枚以水五升按之令熟

去滓盡服汁當吐下愈

又方雞子一枚著冷水半升攪與和乃復煮

三升水極令沸以四所和水投湯中急攪

令相得適寒溫頓服取汗

又方以真丹塗身令遍面向火坐令汗出差

又方取生薑荷根葉合搗絞取汁服三四升

又方取乾艾三斤以水一斗煮取一升去滓

頓服取汗

又方益一升食之以湯送之腹中當絞吐便

覆取汗便差

又方取比輪錢一百五十七枚以水一斗煮

取七升服汁盡之須臾復以五升水更煮

令得一升以水二升投中合令得三升出

錢飲汁當吐毒出也

又方取猪膏如彈丸者溫服之日三服三日

九服

又方烏梅三十枚去核以豉一升苦酒三升

煮取一升半去滓頓服

又傷寒有數種人不能別令一藥盡治之者

若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作葱

豉湯用葱白一虎口豉一升以水三升煮

取一升頓服取汗不汗復更作加葛根二

兩升麻三兩五升水煎取二升分再服必

得汗若不汗更加麻黃二兩又用葱湯研

米二合水一升煮之少時下豉後內葱

白四物令火煎取三升分服取汗也

又方豉一升小男溺三升煎取一升分為再

服取汗

又方葛根四兩水一斗煎取三升乃內豉一

升煎取升半一服搗生葛汁服一二升亦

為佳也

若汗出不歇已三四日胃中惡欲令吐者

豉三升水七升煮取二升半去滓內蜜一

兩又煮三沸頓服安卧當得吐不差更服

取差秘法傳於子孫也

又方生地黃三斤細切水一斗煮取三升分

三服亦可服藜蘆吐散及苦參龍膽散

若已五六日以上者

可多作青竹瀝少煎令減為數飲之厚

覆取汗

又方大黃黃連黃藥梔子各半兩水八升煮

六七沸內豉一升葱白七莖煮取三升分

服宜老少

又方苦參二兩黃芩二兩生地黃半斤水八

升煮取一升分再服或吐下毒則愈

若已六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起

走

用乾茱萸三升水二升煮取一升後去滓

寒溫服之得汗便愈此方恐不失必可用

也秘之

又方大唎一升破去以人溺煮令熟去滓服

之直生絞汁及水煎之並善又絞糞汁飲

數合至一二升謂之黃龍湯陳久者佳

又方取白犬從背破取血破之多多為佳當

及熱以薄膏上冷乃去之此治垂死者活

無白犬諸純色者亦可用之

又方取桐皮削去上黑者細擘之長斷令四寸一束以酒五合以水一升煮取一升去滓頓服之當吐下青黃汁數升即差

又方雞子三枚芒消方寸七酒三合合攪散消盡服之

又方黃連三兩黃檗黃芩各二兩梔子十四枚水六升煎取二升分再服治煩嘔不得眠

治時氣行垂死破棺千金煮湯苦參一兩以咀以酒二升半舊方用苦參酒煮令得一升半去滓適寒溫盡服之當間苦寒吐毒如溶膠便愈

又方大錢百文水一斗煮取八升內麝香當門子李子大末稍稍與飲至盡或汗或吐之

治溫毒發斑大疫難救黑膏生地黃半斤切碎好豉一升猪脂二斤合煎五六沸令至三分減一絞去滓末雄黃麝香如大豆者內中攪和盡服之毒從皮中出即愈

又方用生蝦蟇正爾破腹去腸乃搗吞食之

得五月五日乾者燒末亦佳矣

黑奴丸胡洽小品同一名水解丸又一方加小麥黑奴一兩名為麥奴丸支同此注

麻黃二兩黃芩二兩芒消一兩

釜底墨一兩竈突墨二兩梁上塵二兩搗

蜜丸如彈丸新汲水五合末一丸頓服之

若渴但與水須更寒寒了汗出便解日移

五赤不覺更服一丸此治五六日胃中大熱口噤名為壞病不可醫治用此黑奴丸

又方大青四兩甘草膠各二兩豉八合以水

一斗煮二物取三升半去滓內豉煮三沸

去滓乃內膠分作四服盡又合此治得至

七八日發汗不解及吐下大熱甚佳

又方大黃三兩甘草二兩麻黃二兩杏仁三

十枚芒消五合黃芩一兩巴豆二十粒熬

搗蜜丸和如大豆服三九當利毒利不止

未飲止之家人視病者不可先服取利則

不相染易也此丸亦可預合置

麻黃解肌一二日便服之

麻黃甘草升麻芍藥石膏各一兩杏仁三

十枚貝齒三枚末之以水三升煮取一升頓服覆取汗出即愈便食鼓粥補虛即宜也

又方麻黃二兩芩桂各一兩生薑三兩以水六升煮取二升分為四服

亦可服葛根解肌湯葛根四兩芍藥二兩麻

黃大青甘草黃芩石膏桂各一兩大棗四

枚以水五升煮取二升半去滓分為三服

微取汗

三日已上至七八日不解者可服小柴胡湯

柴胡八兩人參甘草黃芩各三兩生薑八

兩無者乾薑三兩半夏五兩湯洗之大棗

十二枚水九升煮取二升半分為三服微

覆取汗半日須更便差若不好更作一劑

若有熱實得汗不解復滿煩躁欲謬語者

可服大柴胡湯方柴胡半斤大黃二兩黃

芩三兩芍藥二兩枳實十枚半夏五兩洗

之生薑五兩大棗十二枚水一斗煮取四

升當分為四服當微利也

此四方最第一急須者若幸可得藥便可不

營之保無死憂諸小治為防以窮極耳若病失治及治不差十日已上皆名壞病唯應服大小龍甲湯此方藥分兩乃少而種數多非備急家所辦故不載凡傷寒發汗皆不可使流雅過多一服得微汗汗即便止未止粉之勿當風初得傷寒便身重腰痛煩悶不已脉浮面赤斑斑如錦文喉咽痛或下痢或狂言欲走此名中陽毒五日可治過此死宜用此方

雄黃甘草升麻當歸椒桂各一分水五升

煮取二升半分三服温覆取汗服後不汗

更作一劑

若身重背強螻蟻如被打腹中痛心下強短

氣嘔逆脣青面黑四肢冷脉沉細而緊數此

名中陰毒五日可治過此死用此方

甘草升麻各二分當歸椒各一分煎甲一

兩以水五升煮取二升半分三服温覆取

汗汗不出湯煮更作也

陰毒傷口鼻冷者乾薑桂各一分末温酒三

合服之當大熱差凡陰陽二毒不但初得便

尔或一二日變作者皆以今藥治之得此病多死治熱病不解而下痢困篤欲死者服此大青湯方大青四兩甘草三兩膠二兩豉八合赤石脂三兩以水一斗煮取三升分三服盡更作日夜兩劑愈

又方但以水五升豉一升梔子十四枚韭白

一把煮取三升半分爲三服

又方龍骨半斤搗碎以水一斗煮取五升使

極冷稍飲其間或得汗即愈矣

又方黃連當歸各二兩乾薑一兩赤石脂二

兩蜜丸如梧子服二十九日三夜再

又方黃連二兩熟艾如鴨卵大以水二斗煮

取一升頓服立止

天行諸痢悉主之黃連三兩黃檗當歸龍子

各二兩以水六升煮取二升去滓入蜜七

合又火煎取一升半分爲三服效

天行毒病熱腹痛下痢升麻甘草黃連當

歸芍藥桂心黃檗各半兩以水三升煮取

一升服之當良

天行四五日大下熱痢黃連黃檗各三兩龍

骨三兩艾如雞子大以水六升煮取二升分爲二服忌食猪肉冷水

若下膿血不止者赤石脂一斤乾薑一兩粳

米一升水七升煮米熟去滓服七合日二

又方赤石脂一斤乾薑二兩水五升煮取三

升分二服若絞臍痛加當歸一兩芍藥二

兩加水一升也

若大便堅閉令利者大黃四兩厚朴二兩枳

實四枚以水四升煮取一升二合分再服

得通者止之

若十餘日不大便者服承氣九大黃杏仁各

二兩枳實一兩芒消一合搗蜜和丸如彈

丸和湯六七合服之未通更服

若下痢不能食者黃連一升烏梅二十枚炙

燥並得搗末蠟如棊子大蜜一升合於微

火上今可丸九如梧子大一服二丸日三

若小腹滿不得小便方細末雌黃蜜和丸取

如棊核大內漏孔中今半寸亦以竹管注

陰令痛閉之通

又方末滑石三兩葶藶子一合水二升煮取

七合服

又方搗生葱薄小腹上參易之

治胃腸痞滿心塞氣急喘急方人參朮各一

兩枳實二兩乾薑一兩搗蜜和丸一服一

枚若嗽加括萆二兩吐加牡蠣二兩日夜

服五六丸不愈更服

毒病攻喉咽腫痛方切當陸炙令熱以布藉

喉以熨布上冷復易

又方取真蘭茹爪甲大內口中以牙小嚼汁

以漬喉當微覺異為佳也

毒病後攻目方煮蜂窠以洗之日六七度佳

又方冷水漬青布以掩之

若生翳者燒鼓二七粒末內管鼻中以吹之

治傷寒嘔不止方甘草一兩升麻半兩生薑

三兩橘皮二兩水三升煮取二升頓服之

愈

又方乾薑六分附子四分末以苦酒丸如梧

子大一服三九日三服

治傷寒嘔不止方甘草三兩橘皮一升水五

升煮取三升分服日三取差

又方熟洗半夏末服之一錢一服

又方赤蘇一把水三升煮取二升稍稍飲

又方乾薑六分附子四分末苦酒丸如梧子

大服三九日三服

比歲有病時行仍發瘡頭面及身須更周匝

狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即治劇者

多死治得差後瘡癢紫黑彌歲方滅此惡毒

之氣世人云永徽四年此瘡從西東流遍于

海中煮葵菜以蒜薑噴之即止初患急食之

少飯下菜亦得以建武中於南陽擊虜所得

仍呼為虜瘡諸醫悉詳作治用之有效方

取好蜜通身上摩亦可以蜜煎升麻并敷

敷食

又方以水濃煮升麻綿沾洗之苦酒漬彌好

但痛難忍

其餘治猶依傷寒法但每多作毒意防之用

地黃黑膏亦好

治時行病發黃方茵陳六兩大黃二兩梔子

十二枚以水一斗先煮茵陳取五升去滓

內二物又煮取三升分四服亦可兼取黃

疸中雜治法差

比歲又有虜黃病初唯覺四體沉沉不快須

史見眼中黃漸至面黃及舉身皆黃急令瀉

白紙紙即如藥染者此熱毒已入內急治之

若初覺便作赤帶赤豆散吹鼻中鼻中黃汁

出數升者多差若已際應看其舌下兩邊有

白脉弥弥處蘆刀割破之紫血出數升亦歇

然此須慎解剖者不解割忽傷亂舌下青脉

血出不止便然人方可燒紡輪鐵以灼此脉

令焦兼瓜蒂雜巴豆搗為丸服之大小便亦

去黃汁破灼已後禁諸雜食又云有依黃坐

黃復須分別之方

切竹煮飲之如飲

又方搗生瓜根絞取汁飲一升至二三升

又方醋酒浸雞子一宿吞其白數枚

又方竹葉切五升小麥七升石膏三兩末綿

裹之以水一斗五升煮取七升一服一升

盡喫即差也

又方生葛根汁二升好豉一升梔子三七枚

茵陳切一升水五升煮取三升去滓內葛

汁分為五服

又方金色脚雞雌雞血在治如食法熟食安

飲汁令盡不過再作亦可下少鹽豉佳

治毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉煮

適寒溫以漬足令踝上有赤許水止之

又方以稻穰灰汁漬足

又方酒煮苦參以漬足差

又方鹽豉及羊屎一升搗令熟以漬之

又方細剉黃蘗五斤以水三斗煮漬之亦治

攻陰腫痛

又方作坎令深三赤少容兩足燒坎令熱以

酒灌坎中着履踞坎中蓬勿令泄

又方煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好

又方煮馬矢若羊矢汁漬

又方猪膏和羊矢塗之亦佳

又方以牛肉裹腫處腫消痛止

又方搗常思草絞取汁以漬足

又方猪蹄一具合葱煮去滓內少鹽以漬之

毒病下部生瘡者燒鹽以導之不過三

又方生漆塗之綿導之

又方大丸艾灸下部此謂窮無藥

又方取蛭三升以水五升得二升半盡服之

又方煮桃皮煎如粉以綿合導之

又方水中荇菜搗綿裹道之日五易差

又方檉皮槲皮合煮汁如粘糖以導之又濃

煮桃皮飲之最良

又方搗蛇莓汁服三合日三水漬烏梅令濃

并內崖蜜數數飲

若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤憤不知

痛痺處或下痢急治下部不曉此者但攻

其上不下為意下部生蟲食其肛

爛見五臟便死治之方

取雞子白內漆合攪還內教中仰頭吞之

當吐蟲則愈

又方燒馬蹄作灰細末猪脂和塗綿以導下

部日數度差

又方桃人十五枚苦酒二升鹽一合煮取六

合服之

又方燒艾於管中薰之入煙入下部中少雄

黃雜妙此方是溪溫以尔兼取彼治法

又有病醫下不止者烏頭二兩女萎雲實各

一兩桂二分蜜丸如桐子水服五九一日

三服

治下部卒痛如鳥喙之方赤小豆人豆各一

升合鵝兩囊貯蒸之令熟更平坐即愈

此本在雜治中亦是傷寒毒氣所致故凡治

傷寒方甚多共有諸麻黃葛根桂枝柴胡青

龍白虎四順四逆二十餘方並是至要者而

藥難盡備且診候須明悉別所在撰大方中

今唯載前四方尤是急須者耳其黃膏赤散

在辟病條中預合初覺患便服之傷寒時行

溫疫三名同一種耳而源本小異其冬月傷

於寒或疾行力作汗出得風冷至夏發名為

傷寒其冬月不甚寒多暖氣及西風使人骨

節緩愴受病至春發名為時行其年歲中有

癘氣兼挾鬼毒相注名為溫病如此診候

相似又貴勝雅言惣名傷寒世俗因號為時

行道術符刻言五溫亦復殊大歸終止是共

途也然自有陽明少陰陰毒陽毒為異耳少

陰病例不發熱而腹滿下痢最難治也

附方

必效方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘梳然後服粥厚覆取汗於夜最佳

梅師方治傷寒汗出不解已三四日胃中悶吐豉一升鹽一合水四升煎取一升半分服當吐

聖惠方治傷寒四日已嘔吐更宜吐以苦參末酒下二錢得吐差

又方治時氣熱毒心神煩燥用藍澱半大匙以新汲水一盞服

又方治時氣頭痛不止用朴消三兩搗羅為散生油調塗頂上

又方治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜

一合今勺分二服

金方治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆差

博濟方治陰陽二毒傷寒黑龍丹船上硫黃

一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼

記箇數用二升鑄子一口先安硫黃鋪鑄底次安巴豆又以硫黃蓋之醃醋半升已來燒之蓋子蓋合緊密更以濕紙周回固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文

武火熬常著人守之候裏面巴豆作聲數已半為度急將鑄子離火便入臼中急搗

令細再少少米醋并蒸餅少許再搗令冷可丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九粒

葱白二莖水一盞煎至六分服一九陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎

吞一九不得嚼破

孫用和方治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一早莢子別細研二味同為散每服用醋漿水一盞同煎三沸

溫服

孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾方

川烏頭乾薑等分為散炒令轉色放冷再搗為細散每一錢水一盞鹽一撮煎取

半盞溫服

又方治陰勝隔陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存性為末蜜水調下為一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以吳茱萸一升酒和勻濕絹袋二隻貯蒸令極熱

熨脚心候氣通暢勿暖即停熨累驗

唐崔元亮療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大括樓一枚黃者以新汲水九合浸

不差更應服之

又方針大樞旁一寸五分又刺其下停針之又方礬石桂末綿裹如棗內舌下有唾出之又方燒馬勒銜鐵令赤內一升苦酒中破一鷄子合和飲之

若卒中冷聲嘶啞者甘草一兩桂二兩五味子二兩杏仁三十枚生薑八兩切以水七升煮取二升為二服服之

附方

經驗後方治中風不語獨活一兩對酒二升

煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋
良久温服三合未差再服

又方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫

取藜蘆一分天南星一箇去浮皮却臍子
上陷一箇坑子內入陳醋一椀牛子四面

用火逼令黃色同一處搗再研極細用生

蜜為丸如赤豆大每服三丸温酒下

聖惠方治中風以大聲咽喉不利以藜荷根

二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計

時候温服半盞

治風毒脚弱痺滿上氣方第二十一

脚氣之病先起嶺南稍來江東得之無漸或
微覺痠痺或兩脛小滿或行起忽弱或小腹
不仁或時冷時熱皆其候也不即治轉上入
腹便發氣則殺人治之多用湯酒摩膏種數

既多不但一劑今只取單效用兼灸法

取好豉一升三蒸三曝乾以好酒三斗漬
之三宿可飲隨人多少欲預防不必待時
便與酒煮豉服之脚弱其得小愈及更營
諸方服之并及灸之

次服獨活酒方獨活五兩附子五兩生用切
以酒一斗漬經三宿服從一合始以微痺
為度

又方白礬石二斤亦可用鍾乳末附子三兩

豉三升酒三斗漬四五日稍飲之若此有

氣加蘇子二升也

又方好硫黃三兩末之牛乳五升先煮乳水

五升仍內硫黃煎取三升一服三合亦可

直以乳煎硫黃不用水也辛無牛乳羊乳

亦得

又方法先煎牛乳三升令減半以五合煎服

硫黃末一兩服畢厚蓋取汗勿令得風中

間更一服暮又一服若已得汗不復更取

但好將息將護之若未差愈後數日中亦

可更作若長將亦可煎為丸北人服此治

脚多效但須極好硫黃耳可預備之

若脛已滿捏之沒指者但勒飲烏犢牛溺二

三升使小便利息漸漸消當以銅器取

新者為佳無烏牛純黃者亦可用之

又方取牽牛子搗塞丸如小豆大五丸取合

一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛
堪著嘗之甘美瓶置井中令冷徹如水白
蕪器及銀器中貯似茶啜之時人呼為冷
飲子又且尊於若能破女子經候不通搗
以酒浸常服有孕人勿服破血

治時氣病起諸復勞方第十四

凡得毒病愈後百日之內禁食猪犬羊肉并
傷血及肥魚久臑乾魚則必大下痢下則不
可復收又禁食苑食胡蒜韭薤生菜蝦鮑鱉
食此多致復發則難治又令到他年數發也

治篤病新起早勞及食飲多致欲死方

燒鱉甲服方寸七

又方以水服胡粉少許

又方粉三升以暖水和服之厚覆取汗

又方乾蘇一把水五升煮取二升盡服之無

乾者生亦可用加生薑四兩豉一升

又方鼠矢兩頭尖者二七枚豉五合以水三

升煎半頓服之可服温覆取汗愈有麻子

人內一升加水一升彌良亦可內枳實葱

白一虎口也

又方取伏雞子殼碎之熬令黃黑細末熱湯服一合溫覆取汗

又方大黃麻黃各二兩梔子人十四枚豉一升水五升煮取三升分再服當小汗及下痢

又方濃煮甘皮服之蘆根亦佳

覺多而發復方燒飯篩末服方寸七良

治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹中絞痛或便絕方

燒婦人月經衣服方寸七

又方取狔子一枚撞之三十六放於戶中逐

使喘極乃刺脇下取血一升酒一升合和

飲之若卒無者但服血慎勿便冷應用狔狔

又方取所交接婦人衣覆男子上一食久活

又方取狔純腥及血和酒飲之差

又方刮青竹茹二升以水三升煮令五大沸

然後絞去滓以竹茹湯溫服之此方亦通治勞後

又方礬石一分消三分末以大麥粥清可方寸七一服熱毒隨大小便出

又方取參子一大把水按取汁飲一升乾者濃取汁服之慈頭搗以苦酒和服亦佳

又方蚯蚓數升絞取汁服之良

若差後病男接女病女接男安者陰易病者發復復者亦必死

卒陰易病男女溫病差後雖數十日血脉未和尚有熱毒與之交接者即得病曰陰易殺

人甚於時行宜急治之

今人身體重小腹急熱上腫曾頭重不能舉

眼中生膜膝脛拘急欲死方

取婦人禪親陰上者割取燒末服方寸七日三小便即利而陰微腫者此當愈得童

女禪亦良若女病亦可用男禪

又方鼠矢兩頭尖者二七枚鹽一把水五升

煮取二升盡服之溫覆取汗

又方蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升一服仍取汗並良

又方未乾薑四兩湯和頓服溫覆取汗得解

止

又方男初覺便灸陰三七壯若已盡甚至百壯即愈眼無妨陰道瘡復常

兩男兩女並不自相易則易之為名陰陽交換之謂也

凡欲病人不復取女人手足爪二十枚又取

女中下裳帶一尺燒灰以酒若米飲服之

大病差後小勞便鼻衄

左顧牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸

七日三四亦可蜜丸服如梧子大服之

大病差後多虛汗及眼中流汗方

杜仲牡蠣分等暮卧水服五七則停不止

更作

又方甘草二兩石膏二兩搗末以漿服方寸

七日二服差

又方龍骨牡蠣麻黃根末雜粉以粉身良

又差復虛煩不得眠眼中痛疼懊懷豉七合

烏梅十四枚水四升先煮梅取二升半內

豉取一升半分再服無烏梅用梔子十四枚亦得

又方黃連四兩芍藥二兩黃芩一兩膠三小
挺水六升煮取三升分三服亦可內乳子
黃二枚

又方千里流水一石揚之萬度二斗半半夏
二兩洗之秫米一斗茯苓四兩合煮得五
升分五服性二 二十八

附方

梅師方治傷寒差後交接發動困欲死眼不
開不能語方

梔子三十枚水三升煎取一升服

治瘴氣疫癘溫毒諸方第十五

辟瘟疫藥干散大麻人栢子人乾薑細辛各
一兩附子半兩炮搗篩正旦以井華水舉
家各服方寸七疫極則三服日一服
老君神明白散木一兩附子三兩烏頭四兩

桔梗二兩半細辛一兩搗篩正旦服一錢
七一家合藥則一里無病此帶行所遇病
氣皆消若他人有得病者便溫酒服之方
寸七亦得病已四五日以水三升煮散服
一升覆取汗出也

赤散方牡丹五分阜莢五分炙之細辛乾薑

附子各三分肉桂二分貝珠四分躑躅四
分搗篩為散初覺頭強已昏便以少許內

鼻中吸之取吐溫酒服方寸七覆眼得汗
即差晨夜行及視病亦宜少許以內粉粉

身佳牛馬疫以一七著舌下滿灌日三四
度甚妙也性二 二十九

度瘴散

辟山瘴惡氣若有黑霧鬱勃及西南
溫風皆為疫癘之候方

麻黃椒各五分烏頭三分細辛木防風桔

梗桂乾薑各一分搗篩平旦酒服一盞七

辟毒諸惡氣冒霧行尤宜服之

木乙流金方雄黃三兩雌黃二兩礬石鬼箭

各一兩半殺羊角二兩搗為散三角絳囊

貯一兩帶心前并門戶上月旦青布裏一
刀圭中庭燒溫病人亦燒燻之即差

辟天行疫癘雄黃丹砂巴豆礬石附子乾薑

分等搗蜜丸平旦向日吞之一丸如胡麻

大九日止令無病

常用辟溫病散方真珠肉桂各一分貝母三

分熬之雞子白熬令黃黑三分搗篩咸旦

服方寸七若歲中多病可月月朔望服之

有病即愈病人服者當可大效

虎頭殺鬼方虎頭骨五兩朱砂雄黃雌黃各

一兩半鬼臼阜莢蕪荑各一兩搗篩以蠟

蜜和如彈丸絳囊貯繫臂男左女右家中

懸屋四角月朔望夜半中庭燒一九一方

有莖蒲菴蘆無虎頭鬼臼阜莢作散帶之

趙泉黃膏方大黃附子細辛乾薑椒桂各一

兩巴豆八十枚去心皮搗細苦酒漬之宿

臘月猪膏二斤煎三上三下絞去滓密器

貯之初覺動色便熱如梧子大一丸不差

又服亦可火炙以摩身體數百遍佳并治

賊風走遊皮膚並良可預合之便服即愈

也

單行方術西南社中栢東南枝取暴乾未服

方寸七立差

又方正月上寅日搗女青角三角絳囊貯繫

戶上帳前大吉

又方馬蹄木搗屑二兩絳囊帶之男左女右

又方正月朔旦及七月吞麻子小豆各二七

枝又各二七枝投井中又以附子二枚小

豆七枚令女子投井中

又方冬至日取雄赤雞作腊至立春煮食盡

勿分他人二月一日取東行桑根大如指

懸門戶上又人人帶之

又方埋鵲於園前

斷温病令不相染著斷髮仍使長七寸盛著

病人卧席下

又方以繩度所住戶中壁二屈繩結之

又方密以艾灸病人床四角各一壯不得令

知之佳也

又方取小豆新布囊貯之置井中三日出舉

家男服十枚女服二十枚

又方桃木中蟲矢末服方寸匕

又方鮑魚頭燒三指撮小豆七枚合末服之

女用豆二七枚

又方熬豉雜土酒漬常將服之

又方以鯽魚窠致卧下勿令知之

又方栢子人細辛擦米乾薑三分附子一分

末酒服方寸七日服三服十日

又方用麥蘗服擦米乾薑又云麻子人可作

三種服之

附方

外臺秘要辟瘟方

取上等朱砂一兩細研白蜜和丸如麻子

大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物

面向東立各吞三七丸永無疾疫

葛仙翁肘後備急方卷之二

葛仙翁肘後備急方卷之三

陸三

治寒熱諸癘方第十六

治癘病方鼠婦豆豉二七枚合搗令相和末

發時服二丸欲發時服一丸

又方青蒿一握以水二升漬絞取汁盡服之

又方用獨父蒜於白炭上燒之末服方寸匕

又方五月五日蒜一片去皮中破之刀割令

容巴豆一枚去心皮內蒜中令合以竹挾

以火灸之取可熱搗為三丸末發前服一

丸不止復與一丸

又方取蜘蛛一枚盧管中密塞管中以縮頸

過發時乃解去也

又方日始出時東向日拜畢正長跪向日

叉手當閉氣以書墨注其管兩耳中各七

注又丹書舌上一言子日死畢復再拜還去

勿顧安卧勿食過發時斷即差

又方多煮豉湯飲數升令得大吐便差

又方取蜘蛛一枚著餅中合丸吞之

又方臨發時搗大附子下篩以苦酒和之塗

背上