

又方臯莢刺灸令黃剉三升酒一斗漬不器

蕷令沸服一升日三服盡更作

若腫偏有所起處者

以水和灰以塗之塗復更塗

又方赤豆麻子合搗以傅腫上

又方水蕷巴豆以布沾以拭之姚云巴豆三

十枚合及咬咀水五升蕷取二升日五拭

腫上隨手即減勿近目及陰療身體裹服

如吹者

若但是腫者

剉葱蕷令爛以漬之日二四度

又方兔絲子一升酒五升漬二三宿服一升

日三服差

若腫從脚起稍上進者入腹則然人治之方

小豆一斛蕷令極爛得四五斗汁溫以漬

膝已下日二爲之數日消盡若已入腹者

不復漬但薑小豆食之莫雜與飯及魚鹽

又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用如此

之病十死一生急救之

又方削橘或桐木蕷取汁以漬之并飲少許

加小豆妙

又方生猪肝一具細切煩食之勿與盐乃可

用苦酒妙

又方蕷豉汁飲以滌傳脚

附方

備急方療身體暴腫滿

榆皮搗屑隨多少雜米作粥食小便利

楊氏產乳療通體遍身腫小便不利

猪苓五兩搗篩煎水三合調服方寸七加

至二七

○到葱蕷令爛以漬之日二四度

又方兔絲子一升酒五升漬二三宿服一升

日三服差

若腫從脚起稍上進者入腹則然人治之方

小豆一斛蕷令極爛得四五斗汁溫以漬

膝已下日二爲之數日消盡若已入腹者

不復漬但薑小豆食之莫雜與飯及魚鹽

又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用如此

之病十死一生急救之

又方削橘或桐木蕷取汁以漬之并飲少許

葛仙翁肘後備急方卷之四

治卒大腹水病方第二十五

附

水病之初先目上腫起如老蠶色挾頭脉動
股裏分脛中滿按之沒指腹內轉側有節聲
此其候也不即治須臾身體稍腫肚盡脹按
之隨手起則病已成猶可爲治此皆從虛損
大病或下痢後婦人產後飲水不即消三焦
受病小便不利乃相結漸漸生聚遂流諸經
絡故也治之方

葶苈一升熬搗之於臼上割生雄鷄雞合

○血共頭共搗萬杵服如杵子五丸稍加至

十九勿食鹽常食小豆飯飲小豆汁鱠魚

佳也

又方防風甘草葶苈各一兩搗苦酒和丸如

梧子大三丸日三服常服之取消平乃止

又方雄黃六分麝香三分甘遂芫花人參各

二分搗密和丸服如豆大二丸加至四丸

即差

又方但以春酒五升漬葶苈子二升隔宿稍

服一合小便當利

又方草廬一兩杏仁二十枚並熬黃色搗分

十服小便去立差

又方胡洽水銀丸大治水腫利小便姚同草
薑根各一升芒消六兩水銀十兩水煮
水銀三日三夜乃以合搗六萬杵自相和

丸服如大豆丸日增一丸至十九

更從一起差後食牛羊肉自補稍稍飲之

又方多取柯枝皮剉濃煮煎令可丸服如梧
子大三丸須臾又一丸當下水後將服三
丸日三服此樹一名木奴南人用作船

○又方真蘇合香水銀白粉等分蜜丸服如大
豆二丸日三當下水節飲好自養無蘇合

可關之也

又方取草麻繩熟者二十枝去皮研之水解

得三合日一服至日中許當吐下諸水汁

結裹若不盡三日後更服三十枚猶未盡

更復作差後節飲及鹹物等

又方小豆一升白雞一頭治如食法以水三

斗煮熟食滓飲汁稍相令盡

又方取青雄鴨以水五升煮取飲汁一升稍

稍飲令盡厚覆之取叶佳

又方取胡鷺卵中黃頓吞十枚

又方取蛤蠣炙令熟日食十箇

又方若唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水壘
巴豆九十枚去皮心否人六十枚去皮尖

並熬令黃搗和之服如小豆大一枚以水

下爲度勿飲酒佳

又方鬼扇細搗绞汁服如雞子即下水更復

取水壘若湯研麻子汁飲之

○又方蕕蘆草三十斤子三石煮取一石去滓

○更沸上煎令可丸服如阜葵子三九至五

六丸水隨小便去即飲糜粥養之

又方白茅根一大把小豆三升水三升煮取

乾去茅根食豆水隨小便下

又方鼠尾草馬鞭草各十斤水一石煮取五

斗去滓生四煎以粉和爲丸服如大豆大二

丸加至四五丸禁肥肉生冷勿食

腫滿者白槿樹白皮一握水二升煮取五合

白槿柳大者二枚末之內更煎三五沸湯

水二斗赤小五大升和魚肉煮可取二

又將服牛渴草陸羊肉臠及香柔煎等在腫
滿條中其十水丸諸大方在別卷若止皮膚
水腹內未有者服諸發汗藥得汗便差然慎
護風寒為急若唯腹大下之不去便針臍下
二寸入數分令水出孔合須腹減乃止

附方

李絳兵部手集方療水病無間年月深淺雖
復脉惡亦主之

大戟當歸橘皮各一大兩切以水一大升
煮取七合頓服利水二三斗勿恆至重不
過再服便差禁毒食一年水下後更服水
不作此方出張尚客

外臺秘要治水氣

童陸根白者去皮切如小豆許一大盞以

水三升煮取一升已上爛即取粟米一大

盞煮成粥仍空心服若一日兩度服即恐

利多每日服一頓即微利不得雜食

鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以

升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分爲二服後服溫令暖服訖當下利利盡即差

又方卒患腫滿曾有人忽脚肿漸上至膝足不可踐地至大水頭而偏身大腫脹滿

苦瓠白瓢〔僵〕實捨如大豆粒以麪裹煮一沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃差三年內慎口味也苦瓠須好者無殼殼細理妍淨者不爾有毒不可用

○聖惠方治十種水不差垂死

用鴨肉半斤切粳米三合水三升葱椒薑

豉作粥食之

又方治十種水病腫滿喘促不得卧

以蠻姑五枚乾爲末食前湯調半錢七至一錢小便通效

食醫心鏡治十種水病不差垂死

青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮今極熟作粥空腹食之

又方主水氣脹滿浮腫小便澀少

白鴨一隻去毛腸洗瀦飯半升以飯薑板釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之楊氏產乳癥身體腫滿水氣急卧不得

郁李人一大合搗爲末和麥麴搜作餅子與喫入口〔僵〕即大便通利氣便差

梅師方治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心

食令飽〔僵〕即食盡不得喫飯

又方治水腫小便澀黃牛尿飲一升日至夜小便利差勿食鹽

○又方治心下有水

白朮三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

千金翼治小便不利膀胱水氣流滯

以浮萍日乾末服方寸七日一二服良

○又方治心下有水

白朮三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

又方治心下有水

白朮三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

又方治心下有水

白朮三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

頻服五日止此藥利小便有效如神

韋宙獨行方療水腫從脚起入腹則殺人

用赤小豆一斗煮令極爛取汁四五升溫

漬膝以下若以入腹但服小豆勿雜食亦

愈

李絳兵部手集方亦著此法云曾得效

○治卒心腹癥堅方第二十六

治卒暴癥腹中有物如石痛如刺晝夜啼呼

不治之日死方牛膝二斤以酒一斗漬以密封於熱灰火中溫令味出服五合至

○又方用蒴藋根亦如此尤良

姚云牛膝酒神驗也

又方多取當陸根搗蒸之以新布藉腹上藥

披著布上勿腹上冷復之晝夜勿息

○又方五月五日葫十斤去皮桂一尺二寸竈

中黃土如鴨子一枚合搗以苦酒和塗以布搘病不過三差

又方取櫟木燒爲灰淋取汁八升以釀一斛

米酒成服之從半合始不知稍稍增至一

二升不盡一劑皆愈此灰入染絳用葉中
釀酒也構直恩切

凡癥堅之起多以漸生如有卒覺便牢大自
難治也腹中癥有結積便害飲食轉羸瘦治
之多用酒水玉臺八毒諸大藥今止取小易
得者

取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘杵
熟煮汁可丸以秫米五六升炊飯內日中
塗藥後可飯取差

又方亦可取根一升搗千杵酒漬之從少起

○日三服此酒治癥乃勝諸大藥

又方蠶矢一石桑柴燒灰以水淋之五度取

生蠶長一尺者內中煮之爛熟去骨細擘

剉更煎令可丸丸如梧子大一服七丸

三

卷四

又方射干二兩搗三百粒搗末雞子白和爲

丸如大麻子服一丸漸至如大豆大一丸

至三丸爲度

又方大猪心一枚破頭去血搗末雄黃麝香

當門子五枚巴豆百枚去心皮生用心縫

以好酒於小銅器中煎之令心沒欲歇隨
益盡三升當糜爛煎令可丸如麻子服三
丸日三服酒盡不糜者出搗蜜丸之良又

大黃末半斤朴消三兩蜜一斤合於湯上
煎可丸如梧子服十九日三服之

治癆癥伏在心下手襦見頭足時時轉者

白雌雞一隻絕食一宿明日膏煎飯飼之

取其矢無間多少於銅器中以溺和之火
上煮可搗末服方寸七日四五服須消盡

乃止常飼雞取矢差單熬雞單食之姚同

○治心下有物大如杯不得食者

草薢二兩搗之大黃二兩澤漆四兩搗篩

蜜丸和搗千杵服如梧子大二丸日三服

稍加

其有昭水諸鬼諸丸方別在大方中

治兩腸下有氣結者

狼毒二兩旋覆花一兩附子二兩炮之搗

篩蜜和丸服如梧子大二丸稍加至三丸

服之

熨癥法

銅器受二升許貯魚膏令深二三十寸作大
火炷大七枚燃之令膏燉重紙覆繖上以
器熨之晝夜勿息膏盡更益也

又方茱萸三升碎之以酒和煮令熟布帛物
裹以熨癥上冷更均番用之癥當移去復
桂四

逐熨須臾消止亦可用好

茱萸未以雞子白和射干服之

又方龕中黃土一升先搗熟內上復搗以

苦酒燒令浥涓先以塗布一回仍渝病上

以塗布上乾復易之取令消止差

○治婦人臍下結物大如杯升月經不通發作。

往來下痢羸瘦此爲氣瘕按之若牢強肉癰

者不可治未者可治

末乾漆一斤生地黃三十斤搗絞取汁大

煎乾漆令可丸食後服如梧子大三丸日

三服即差

附方

外臺祕要方療心腹宿癥卒得癥

取朱砂細研搜飯令朱多以雄雞一隻先

餓三日後以朱飯飼之著雞於板上取

糞曝燥爲末溫清酒服方寸七至二錢日三服若病困者晝夜可六服一雞少更飼

一雞取足服之俟愈即止

又療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方

狗糞五升燒末之綿裹酒五升清再宿取

清分十服日再已後日三服使盡隨所食

癥結即便出矣

千金方治食魚鱠及生肉住胃膈不化必成

癥瘕

○搗馬糞草汁飲之一升生薑水亦得即丁

又方治肉癥思肉不已食訖復思

白馬尿三升空心飲當吐肉肉不出即死

藥性論云治癥瘕病

鼈甲阿梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十九再服

宋明帝宮人患腰痛丸心發則氣絕徐文伯

視之曰髮瘕

以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成

蛇能動搖懸之滴盡惟一髮

勝金方治膜外氣及氣塊方

廷胡索不限多少爲末猪胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之

治心腹寒冷食飲積聚結癖方第二十七

治腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脇痞滿

按之鳴轉逆害飲食

取大蟾蜍一枚去皮及腹中物支解之芒

消大人一升中人七合瘦弱人五合以水

六升煮取四升一服一升一服後未得下

更一升得下則九日十日一作

又方茱萸八兩消石一升生薑一斤以酒五

升合煮取四升先服一服一升不痛者止

勿再服之下病後好將養之

又方大黃八兩革蘆四兩並熬芒消四兩熬

令汁盡熟搗蜜和丸如梧子大食後服

三丸稍增五丸

又方狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗蜜

丸服如梧子大食前三丸日三服

又方巴豆三十枚去心杏仁二十枚並熬桔

梗六分藜蘆四分阜莢三分並炙之搗蜜

和丸如胡豆大末食服一丸日二欲下病者服二丸長將息百日都好差

又方貝母二兩桔梗二兩礬石一兩巴豆一

兩去心皮生用搗千杵蜜和丸如梧子一

服二丸病後少少減服

又方茯苓一兩茱萸三兩搗蜜丸如梧子大

服五丸日三服

又治暴宿食留飲不除腹中爲患方

大黃茯苓芒消各三兩巴豆一分搗蜜丸

如梧子大一服二丸不痛止

又方椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以蜜

膏九知麻子服二丸下痛止

十六粒合搗爲丸服二丸當吐利吐利不

盡更服二丸

又方巴豆一枚去心皮熬之椒目十四枚豉

盡更服二丸

服四神丸下之亦佳

中候黑丸治諸癥結瘻瘍第一良

桔梗四分桂四分巴豆八分去心皮杏仁

五分去皮芫花十二分並熬令紫色先搗

三味藥成末又搗巴豆杏仁如膏合和又

搗二十杵丸如胡豆大服一丸取利至二

三丸兒生十日欲癇皆與一二丸如粟粒
大諸腹內不便體中覺患便服得一兩行
利則好也

硫黃丸至熟治人之大冷夏月溫飲食不解

衣者

硫黃礬石乾薑茱萸桂烏頭附子椒人參

細辛半錢當歸十二種分等隨人多少搗
蜜丸如梧子大一服十九至二十九日三
服若冷痢者加赤石脂龍骨即使愈也

露宿丸治大寒冷積聚方

礬石乾薑桂桔梗附子炮半錢各三兩搗
蜜丸如梧子大酒下十九加至一十五

附方

外臺祕要療癰方

大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎
堪丸如梧桐子大一服三十九生薑湯吞

下以利為度小者減之

聖惠方治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴二兩爲末空心溫酒調二錢七

簡要濟衆治久積冷不下食嘔吐不止冷在
胃中

半夏五兩洗過爲末每服二錢白麵一兩
以水和搜切作碭子水煮熟爲度用生

薑醋調和服之

治胃膈上痰瘡諸方第二十八

治卒頭痛如破非中冷又非中風方

釜月下墨四分附子三分桂一分搗節以

冷水服方寸七當吐一方無桂

又方苦參桂半夏等分搗下節苦酒和以塗。

痛則差

又方烏梅三十枚鹽三指搗酒三升黃取一

升去滓頓服當吐愈

此本在雜治中其病是胃中膈上痰厥氣上

衝所致名爲厥頭痛吐之即差

但單煮米作濃飲二三升許適冷緩飲盡

二三升須臾適吐畢又飲如此數過

劇者須臾吐勝乃止不損人而即差

治胃中多痰頭痛不欲食及飲酒則發阻痰

方

常山二兩甘草一兩松蘿一兩瓜蒂三七
枚酒水各一升半煮取升半初服七合取

吐吐不盡餘更分二服後可服半夏湯
胡洽名粉隔湯礬石一兩水二升煮取一升

內蜜半合頓服須臾吐飲少熱湯

又方杜衡三兩松蘿三兩瓜蒂三十枚酒一

升二合漬再宿去滓溫服五合一服不吐

晚更一服

又方瓜蒂一兩赤小豆四兩搗末溫湯三合

和服便安卧欲撫之不吐更服之

又方先作一升湯投水一升名爲生熟湯及
食三合鹽以此湯送之須臾欲吐便擣出

未盡更服二合飲湯二升後亦可更服湯

不復也

又方常山四兩甘草半兩水七升煮取三升

內半升蜜服一升不吐更服無塞亦可

方中能月服一種則無痰水之患又有旋覆
五飲在諸大方中若胃中痞寒短氣脹者

隔

切通

甘草二兩茯苓三兩杏仁五十枚碎之水
一斗三分煮取六升分爲五服

又方桂四兩木甘草二兩附子炮水六升煮
取三分爲三服膈中有結積覺駭駭不
去者

藜蘆一兩桑末之巴豆半兩去皮心熬之
先搗巴豆如泥入藜蘆末又搗萬杵塞丸
如麻子大服一丸至二三丸
膈中之病名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所
以作丸含之令氣勢得相燻染有五膈丸方
參門冬十分去心甘草十分炙椒遠志附
子炮乾薑人參桂細辛各六分搗篩以上
好蜜丸如彈丸以一丸含稍稍燕其汁日
三丸服之主短氣心脅滿心下堅冷氣也
此疾有十許方率皆相類此丸最勝用藥雖
多不合五膈之名謂憂膈氣膈患膈寒膈其
病各有診別在大方中又有七氣方大約與
此大同小別耳

附方
聖惠方治癰頭痛

以烏梅十箇取肉鹽三錢酒一中盞空服
至七分去滓非時溫服吐即佳

又方治冷痰飲惡心

用華楂一兩搗爲末於食前用清粥飲調
半錢服

又方治痰壅嘔逆心脅滿悶不下食

用厚朴一兩生薑汁炙令黃爲末非時
粥飲調下二錢七

千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以
冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食
飲食入胃則皆變成冷水反吐不停者

赤石脂散主之
赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任稍
稍加至二七服盡一斤則終身不吐淡水
又不下痢補五臟令人肥健有人痰飲服

利膈丸牽牛子四兩半生半熟不炒早葵塗
酥二兩爲末生薑自然汁煮糊丸如桐子
大每服二十九粒不湯下

眩涕唾痰涎精神不爽

王氏博濟治三焦氣不順膈塞頭昏目
處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

御藥院方真宗賜高祖相國去痰消目進飲
食生犀丸
川芎十兩紫小者粟米泔浸三日搜切片
子日乾爲末作兩料每料入麝腦各一分

經驗後方治頭風化痰
川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日
乾或焙杵爲末煉蜜爲丸如小彈子大不
拘時茶酒嚼下

鬱金一分藜蘆十分各爲末和匀每服

一字用溫漿水一盞先以少漿水調百餘
者水漱口都服便以食壓之

外臺秘要治一切風痰風霍亂食不消大便
滯

阿梨勒三枚搗取末和酒頓服三五度良

生口
白僵蠶七箇直者細研以薑汁一茶脚溫
水調灌之

又方治風痰

○以蘿蔔子爲末溫水調一匙頭良久吐出。
涎沫如是驟緩風以此吐後用緊疎藥服
踰後服和氣散差

斗門方治胃膈壅滯大便開胃

用半夏淨洗焙乾搗羅爲末以生薑自然

汁和爲餅子用濕紙裹於慢火中煅令香
熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半

錢煎取一盞溫服能去胃膈壅滯大便
毒及治酒食所傷其功極驗

治卒患脣痛方第二十九

下韭根五斤搗絞取汁飲之愈

留脾之病令人心中堅痞忽痛肌中苦痺絞
急如刺不得俛仰其脣前皮皆痛不得手犯
曾滿短氣咳嗽引痛煩悶自汗出或微引背
膂不即治之數日害人治之方

用雄黃巴豆光搗雄黃細篩內巴豆務熟

生口
搗相入丸如小豆大服一丸不效稍益之

又方取枳實搗宜服方寸七日三夜一服

又方搗括樓實大者一枚切薤白半升以白
酒七升煮取二升分再服亦可加半夏四

○兩湯先去滑則用之

又方橘皮半斤枳實四枚生薑半斤水四升。

薑取二升分再服

又方枳實桂等分搗末橘皮湯下方寸七日

三服

仲景方神效

又方桂烏喙乾薑各一分人參細辛茱萸各

二分貝母三分合搗蜜和丸如小豆大一

服三丸日三服之

若已差復發者

又方桂烏喙乾薑各一分人參細辛茱萸各

又方甘草人參各二兩生薑四兩水六升煮

取二升分爲三服

治卒嘔吐又厥逆方

用生薑半斤去皮切之橘皮四兩擘之以
水七升煮三升去滓適寒溫服一升日三

服

附方

杜壬治胃膈痛微背心腹痞滿氣不得通及
治疾嘔

大桔梗去穰取子熟炒別研和子皮麪糊

爲丸如梧桐子大米飲下十五丸

治卒胃反嘔方第三十

葛氏治卒乾嘔不息方

破雞子去白吞中黃數枚即愈也

又方搗葛根絞取汁服一升許

又方一云蔗汁溫令熱服一升日三一方生

薑汁服一升

又方灸兩腕後兩筋中一穴名間使各七壯

灸心主尺澤亦佳

取二升分爲三服

治卒嘔吐又厥逆方

用生薑半斤去皮切之橘皮四兩擘之以
水七升煮三升去滓適寒溫服一升日三

服

葛藤尤佳

治卒嘔不止方

飲新汲井水數升甚良

又方痛爪眉中火間氣也

又方以物刺鼻中各一分來許早薑內鼻中

令嚙差

又方但閉氣仰引之

又方好欬二升薑取汁服之也

又方香蘇激黃頭服一二升良

又方粢米三升為粉并花水服之良

又方用枇杷葉一斤拭去毛炙水一斗薑取。

三升服蘆根亦佳

治食後喜嘔吐者

燒鹿角灰二兩人參一兩搗末方寸七日

三服妙

治人忽惡心不已方

薤白半斤茱萸一兩豉半升朱合東四

枚枳實二枚鹽如彈丸水三升薑取一升

半分為三服

又方但多嚼薑卷子及咬旗榔亦佳

治人胃反不受食食畢輒吐出方

大黃四兩甘草二兩水二升煮取一升半

分為再服之

治人食畢噫醋及醋心方

人參一兩茱萸半斤生薑六兩大棗十二

枚水六升煮取二升分為再服也

噫不止半夏洗乾末之服一七則立止

又方乾薑六分附子四分炮搗苦酒丸如梧

子服三丸日三效

附方

張仲景方治反胃嘔吐大半夏湯

半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗

二升煎揚之一百二十遍薑下三升半溫

服一升日再亦治膈間痰飲

又方主嘔噦穀不得下眩悸半夏加茯苓湯

半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七

升煎取一升半分溫服之

千金方治反胃食即吐

搗粟米作粉和水丸如梧子大七枚爛食

內醋中細吞之得下便已麯亦得用之

又方治乾歲若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥

治心下痞堅不能食胃中嘔噦

生薑八兩細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之

又方主乾嘔

取羊乳一盃空心飲之

斗門方治翻胃

用附子一箇最大者坐於埠上四面著火

漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾。

復滓之約生薑汁盡盡半椀許搗羅為末

用粟米飲下一錢不過三服差

經驗方治嘔逆及胃散

大附子一箇生薑一斤細剉薑研如麪糊

米飲下之

又方治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥

不能下者可以應用此候效摩丸

五靈脂不夾土石揀精好者不計多少搗

羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服

一丸煎熟生薑酒摩令極細更以少生薑

酒化以湯藥令極熱須是先做下粥溫
熱得所左手與患人藥喫不得漱口右手

急將粥與患人喫不令太多

又方碧霞丹治吐逆立效

北來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥
入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煅
透紅冷取研細為末用粟米飯丸如桐子

大煎醉湯下七丸不嚼只一服

孫真人食忌治嘔吐

○以白檳榔一顆梗梢皮一分炙為末水一
盞煎半盞服

廣濟方治嘔逆不能食

訶梨勒皮二兩去核熬為末蜜和丸如梧
桐子大空心服二十九日二服

食醫心鏡主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃
湯飲不下

粟米半升杵細水和丸如梧子大煮令熟
點少鹽空心和汁吞下

金匱王函方治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不

下食

蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓
不計時溫服

外臺祕要治反胃昔幼年經患此疾每服食

餅及羹粥等須臾吐出貞觀許奉御兄弟

及柴蔣等家時稱名醫奉勑令治罄竭各
人所長竟不能療漸羸憊候絕朝夕忽有
一衛士云

服驢小便極驗旦服二合後食准吐一半
晡時又服二合人定時食粥吐即便定這

○至今日午時奏之大內中五六人患反胃。
多承取尿及熱服二合病深七日以來服

之良後來療人並差者

○以甘蔗汁七升生薑汁一升二味相和分

為三服

○又方治醋心

○檳榔四兩橘皮二兩細搗為散空心生薑
湯下方寸匕

○兵部手集治醋心每醋氣上攻如釀醋

吳茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦

須強服近有人心如蟬破服此方後二十

年不發

○治卒發黃疸諸黃病第三十一

又方治咳噫

○生薑四兩爛搗入蘭香葉二兩椒末一錢
七鹽和麪四兩裹作燒餅熱煨空心喫不

過三兩度效

○孫尚藥方治諸吃噫

○橘皮二兩湯浸去瓤剉以水一升煎之五
合通熱頓服更加枳殼一兩去瓤炒同煎
之服效

治黃疸方

蕪菁子五升搗篩服方寸七日三先後十

日愈之

又方燒亂髮服一錢七日三服秘方此治黃疸

又方搗生麥苗水和絞取汁服三升以小麥勝大麥一服六七合日三四此酒疸也

又方取藜蘆著及中炮之令小變色搗下篩末服半錢七當小吐不過數服此祕方也

又方取小豆林米雞矢白各二分搗篩爲末

分爲三服黃汁當出此通治面目黃即差

疸病有五種謂黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也

黃汗者身體四肢微腫冒滿不得汗汗出如黃檗汗由大汗出卒入水所致方

猪脂一斤溫令熟盡服之日三當下下則稍愈

又方桔子十五枚枯蔓子三枚苦參三分搗末以苦酒漬雞子二枚令軟合黃白以和藥搗丸如梧子大每服十九日五六除熱不吐即下自消也

又方黃雌雞一隻治之剉生地黃三斤內腹

中急縛仰置銅器中蒸令極熟絞取汁再服之

又方生茅根一把細切以豬肉一斤合作羹

又方柏樹皮燒末服方寸七日三服

又方苦草一尺梔子十五枚黃檗十五分水

四升煮取一升半分爲再服此藥亦治溫病發黃

又方茵陳六兩水一斗二升煮取六升去滓

○內大黃二兩梔子十四枚黃取三升分爲三服

又方麻黃一把酒五升煮取二升半可盡服

○又方大黃一兩枳實五枚梔子七枚豉六合

水六升煮取二升分爲三服

又方茺蔚子等分燒末服半錢日一兩偏

女勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱交接後入水所致治之方

消石礬石等分末以大麥粥飲服方寸七日三令小汗出小便當去黃汁也

土瓜根搗取汁頓服一升至三服須病汗當小便去不爾更服之

敷疸者食單頭旋心怫鬱不安而發黃矣

飢大食胃氣衝燶所致治之方

日三令小汗出小便當去黃汁也

又方亂髮如雞子大猪膏半斤煎令消盡分二服

苗陳四兩水一斗煮取六升去滓內大黃

二兩梔子七枚煮取二升分三服瀉去黃汁差

又方苦參三兩龍膽一合末牛膽丸如梧子以生麥汁服五丸日三服

黃黑由大醉當風入水所致治之方

酒疸者心懊痛足脰滿小便黃飲酒發赤斑黃者二兩木蘭一兩末之酒服方寸七日三服

又方大黃一兩枳實五枚梔子七枚豉六合

水六升煮取二升分爲三服

又方茺蔚子等分燒末服半錢日一兩偏

女勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱交接後入水所致治之方

消石礬石等分末以大麥粥飲服方寸七日三令小汗出小便當去黃汁也

又方亂髮如雞子大猪膏半斤煎令消盡分二服

外臺祕要治黃疸

柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡
又方治陰黃汗染衣涕唾黃

取蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日
再加至兩匙以知為度每夜小便重浸少
許帛子各書記日色漸退白則差不過服

五升

圖經曰黃疸病及狐惑病並猪苓散主之
猪苓茯苓木等分杵末每服方寸七水調

下

食療云主心急黃

○以百合蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者。

治黃疸

用秦艽一大兩細剗作兩貼子以上好酒
一升每貼半升酒絞取汁去滓空腹分兩

服或利便止坐四

就中好酒人易治凡黃有數

種傷酒曰酒黃夜食誤食鼠糞亦作黃因

勞發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面
赤惡心者是雀元亮用之及治人皆得方

極效秦艽須用新好羅文者

傷寒頻要療男子婦人黃疸病醫不愈耳目
悉黃飲食不消胃中脹熱生黃衣在胃中
有乾屎使病爾
用煎豬脂一小升溫熱頓服之日三燥屎
下去乃愈

又方治黃百藥不差

煮驢頭熟以薑蘿取之并隨多少飲汁
又方治黃疸身眼皆如金色

不可使婦人雞犬見取東引桃根切細如
筋若釵股以下者一握以水一大升煎取

○一小升適溫空腹頓服後三五日其黃雖

離如薄雲散唯眼最後差百日方平復身

黃散後可時時飲一盃清酒則眼中易散
不飲則散遲忌食熱麵猪魚等肉此是徐

之才家祕方

正元廣利方療黃心煩熱口乾皮肉皆黃

二十六

以秦艽十二分牛乳一大升同煮取七合

去滓分溫再服差此方出於許人則

治卒患腰脇痛諸方第三十二

葛氏治卒腰痛諸方不得俛仰方

正立倚小竹度其人足下至臍斷竹及以
度後當脊中灸竹上頭處隨年壯畢藏竹
勿令人得矣

又方鹿角長六寸燒搗末酒服之鹿茸尤佳
又方取鼈甲一枚炙搗篩服方寸七食後日

三服

又方桂八分牡丹四分附子二分搗末酒服

一刀圭日再服

治腎氣虛腰脊疼痛或當風雨濕為冷所

中不速治流入腿膝為偏枯冷痺弱宜速

治之方

獨活四分附子一枚大者炮杜仲茯苓桂
心各八分牛膝秦艽防風芎藭芍藥六分

細辛五分乾地黃十分切水九升煮取三

升空腹分三服如行八九里進一服忌如

治諸腰痛或腎虛冷腰疼陰萎方

乾漆熬烟絕已丸天去心杜仲牛膝各十

二分桂心狗脊獨活各八分五加皮山茱

萸乾薯蕷各十分防風六分附子四分煉

蜜丸如梧子大空腹酒下二十九日再加

減以知爲度也大效

脇痛如打方

大豆半升熬令焦好酒一升煮之令沸熟

飲取醉

又方茺花茺花等分踏花半斤布囊貯蒸

令熱以熨痛處冷復易之

又方去窮骨上一寸灸七壯其左右一寸又

灸七壯

又積年久痛有時發動方

乾地黃十分甘草五分乾漆五分水五分

桂一尺搗篩酒服一七日三服

又方六七月取地膚子陰乾末服方寸七日

治反腰有血痛方

搗杜仲三升許以苦酒和塗痛上乾復塗

并灸足腫白肉際三壯

生葛根嚼之嚼其汁多多益佳

又方生地黃搗絞取汁三升煎取二升內塞

一升和一升日三服不差則更服之

又方灸腰眼中七壯

臂腰者猶如反腰忽轉而挽之

治腰中常冷如帶錢方

甘草乾薑各二兩茯苓木各四兩水五升

煮取三升分爲三服小品云溫

治腰卒痛如打方

以繩橫度兩乳中間屈繩從乳橫度以趨

痛脛下炎遍下屈處三十壯便愈此本在

○隱居效方腰背痛方

杜仲一斤切酒二斗漬十日服三合

附方

千金方治腰脚疼痛

胡麻一升新者熬令香杵節日服一小升

計服一斗即永差酒飲寒湯羹汁皆可服

之佳

續千金方治腰膝疼痛傷敗

鹿茸不限多少塗酥或紫色爲末溫酒調

下一錢七

經驗方治腰腳痛

威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麵糊

九桐子大以浸藥酒下二十九

經驗後方治腰疼神妙

用破故紙爲末溫酒下三錢七

又方治腎虛腰脚無力

生果棗肉懸乾每日平明喫十餘顆次喫

猪腎粥

又方治大夫腰膝積冷痛或頑麻無力

○內用酒過一寸五日暴乾爲末將元浸酒
再入少醇酒作糊搜和九如梧桐子大空

心酒下二十九

外臺秘要療腰痛

取黃狗皮炙裏腰痛處取燙徹爲度頻卽

差也徐伯玉方同

斗門方治腰痛

用大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆
大於鑄內炒令黃色投水兩挽至五更初
頓服天明取下腰間惡血物用盆器貯如

雞肝樣即痛止

又方治腰重痛

用檳榔爲末酒下一錢

梅師方治卒腰痛轉不得

鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令齊內

酒中浸一宿飲之

雀元亮海上方治腰脚冷風氣

以大黃二大兩切如碁子和少酥炒令酥

盡入藥中切不得令黃焦則無力搗篩爲

末每日空腹以水大三合入生薑兩片如

○錢煎十餘沸去薑取大黃末兩錢別置碗

子中以薑湯調之空腹頸服如有餘薑湯

徐徐呷之令盡當下冷腰多惡物等病即

差止古人用毒藥攻病必隨人之虛實而

處置非一切而用也姚僧垣初仕梁武帝

因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥

至寧年高不可輕用帝弗從幾至委頓元

帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸

寧通僧垣曰脉洪而實此有宿食非用大

黃無差理帝從而遂愈以此言之今醫用

一毒藥而攻衆病其偶中病便謂此方之
神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆
矣可不戒哉

修真方神仙方

菟絲子一斗酒一斗浸良久漉出暴乾又

浸以酒盡為度每服二錢溫酒下日二服

後喫三五匙水餃壓之至三七日加至三

錢七服之令人光澤三年老變為少此藥

治腰膝去風久服足年

○治虛積羸瘦不堪勞動方第三十三

○治人素有勞損苦作便發則身百節皮膚無

處不疼痛或熱筋急方

取白柘東南行根一尺刮去上皮取中間

皮以燒屑亦可細切搗之以酒服三方寸

七厚覆取汗日三服無酒以裝服之白柘

是柘之無刺者也

○治卒連時不得眠方

暮以新布火炙以熨目并蒸大豆更番覆

貼枕枕冷復更易熱終夜常枕熱豆即立

愈也

此二條本在雜治中並皆虛勞患此疾雖非
乃屬急不即治亦漸瘵人後方勞致為力數
倍今故略載諸法

凡男女因積勞虛損或大病後不復常若四
體沉滯骨肉疼酸吸吸少氣行動喘懶或小

腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥面體

少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慄戚多時

少起伏者積年輕者纔百日漸至瘦削五臟

氣竭則難可復振治之湯方

○甘草二兩桂三兩芍藥四兩生薑五兩無

者亦可用乾薑大棗二七枚以水九升煮。

取三升去滓內飴八兩分三服間日復作

一劑復可將諸丸散耳黃耆加二兩人參

二兩爲佳若患癰滿及瘡潰可除飴耳姚

同

○又方烏喙雞一頭治如食法以生地黃一斤

切鵝糖二升內腹內急縛銅器脣瓶中蒸

五升米火須臾取出食肉飲汁勿噉鹽三

月三度作之姚云神良並止盜汗

又方甘草一兩白朮四兩麥門冬四兩牡蠣

二兩大棗二十枚膠三兩水八升煮取二升再服

又方黃耆枸杞根白皮生薑三兩甘草麥門冬桂各二兩生米三合水九升煮取三升分四服

又方羊腎一枚切末一升以水一斗煮取九升服一升日二三服一日盡冬月分二日服日可再服

又有建中腎瀝湯法諸丸方

○乾地黃四兩茯苓薯蕷桂牡丹山茱萸各

○二兩附子澤瀉一兩搗蜜丸如梧子服七丸日三加至十九此是張仲景八味腎氣丸方療虛勞不足大傷飲水腰痛小腹急

小便不利又云長服即去附子加五味子治大風冷

又方苦參黃連菖蒲車前子忍冬枸杞子各一升搗蜜丸如梧子大服十九日三服

有腎氣大丸法諸散方
木一斤桂半斤乾地黃澤瀉茯苓各四兩搗篩散服方寸匕日三兩服佳

又方生地黃二斤麵一斤搗炒乾篩酒服方寸七日三服

附方

枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱用生枸杞子五升好酒二斗研

搗勺碎浸七日漉去滓飲之初以三合爲始後即任意飲之外臺秘要同

食療補虛勞治肺勞止渴去熱風

用天門冬去皮心入蜜煮之食後服之若

曝乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚佳

又方雀卵白和天雄末菟絲子末爲丸空心酒下五丸主男子陰萎不起女子帶下便

漏不利除疝瘕決癰腫續五藏氣

經驗方暖精氣益元陽

白龍骨遠志等分爲末蜜丸如梧桐子

○大空心時分水下三十九丸

又方除盜汗及陰汗

牡蠣肉末有汗處粉之

經驗後方治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力

羊腎從容羹法

羊腎一對去脂膜細切肉蓴朶一兩酒浸一宿刮去皴皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法事治空腹食之

又方治男子女人五勞七傷下元久冷烏鬚鬚一切風病四肢疼痛駐顏壯氣

補骨骼一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即播去只取補骨脂爲末醋煮麵糊丸如梧桐子大早晨溫酒鹽湯下二十九丸

又方固陽丹

○菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾爲末更入杜仲一兩蜜丸搗用薯蕷末酒煮爲糊丸如梧桐子大空心用酒下五十九丸

食醫心鏡益丈夫興陽理腿膝冷

○淫羊藿一斤酒一斗浸經三日飲之佳

御藥院治腳膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗

燒藥作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗

痛處

外臺秘要補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥

二方寸七日四五服佳矣

治飽食便卧得穀勞病令人四肢煩重嘿嘿欲卧食畢取其一

大麥蘖一升椒一兩並熬乾薑三兩搗末
服方寸七日三四服

附方

烏鵲

鯽魚半斤細切起作餠。沸豉汁熱投之。著胡椒。乾薑。薄荷。搗皮等末。空腹食之。近世方主脾胃虛冷。不下食。積火羸弱成瘵。

溫州白乾姜一物，薑水煮令透心，潤濕取
出焙乾，搗篩，陳黍米煮粥飲丸如桐子一
服三五十九湯，使任用其效如神。

食療治胃氣虛風熱不能食
生薑汁半雞子殼生地黃汁少許塞一匙

頭和水三合頓服立差

經驗方治脾元氣發歇痛不可忍者
吳茱萸一兩桃仁一兩和炒令茱萸焦黑

後去茱萸取桃仁去皮尖研細卷白三莖

燶熟以酒浸溫分二服

經驗後方治脾胃進食

茴香二兩生薑四兩同搗令匀淨裝內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦爲末酒丸如梧子大每服十九至十五

外臺秘要治久患氣脹

烏牛屎空心溫服一升日一服氣散即止

治卒絶粒失食飲水死方第三十

五

粒食者生人之所資數日之絕便能致命本草有不飢之文而醫方莫言斯術者當以其涉在仙奇之境非庸俗所能達故也遂使蓋

餌之歲餓屍橫路良可哀乎今略載其易者
者云若脫值奔竄在無人之鄉及墮陸谿谷
空井深塚之中四顧迥絕無可藉口者便須

飲水服氣其服法如左

閉口以舌料上下齒取津液而咽之一日得三百六十咽便佳漸習乃可至千自然

不飢三五日小疵極過此便漸輕強復有食十二時六戊者諸法恐危逼之地不能曉方面及時之早晚故不論此若有水者卒無器便與左手貯祝曰丞掾吏之賜真乏糧正赤黃行無過城下諸醫以自防畢三叩齒右手指三叩左手如此三遍便飲之後復有盃器貯水尤佳亦左手執右手以物扣之如法日服三升便不復飢即差若可得遊涉之地周行山澤間者但取松柏葉細切水服二合日中二三升便佳又掘取白茅根洗淨切服之此三物得行曝燥石上搗碎服服者食方寸辟一日又有大豆者取舍光明市熟以水服盡此則解十日赤小豆亦佳得熟二豆黃末服一二升辟十日草中有木天門冬麥門冬黃精萎蕤貝母或生或熟皆可單食樹木上自耳及檼榆白皮並可辟飢也若遇荒年穀貴無以充糧應須藥濟命者取稻米一斗淘汰之百蒸百曝搗日一食以水得三十日都止則可終身不食日行

三百里

又方粳米一斗酒三升漬之出曝之又漬酒盡止出稍食之渴飲之辟三十日足一斛二升辟周年

有守中丸藥法

其疏諸米豆者是人間易得易作且不乖穀氣使質力無減耳恐肉穢之身忽然專禦藥物或非所堪若可得頸管則自更接余所撰穀方中求也

附方

聖惠方絕穀昇仙不食法

取松實搗爲膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

野人聞話云伏虎尊師煉松脂法

十斤松脂五度以水煮過令苦味盡取得

後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

抱朴子云

漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服

身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所

在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人關東賦至秦王出降驚走入山飢無所食洎欲餓死有一老公教我與松柏葉實初時苦澁後稍便嚥遂不復飢冬不

戴也

寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘

葛仙翁肘後備急方卷之五

陸五

葛仙翁肘後備急方卷之五

陸五

治癰疽奶奶乳諸毒腫方第三十六

附子八分藜蘆二分末傳之蟲自然出

葛氏療婦發諸癰疽發背及乳方

比炎其上百壯

又方熬築粉令黑雞子白和之塗縛上以貼

癰小穿線工作小口泄毒氣燥易之神祕

又方釜底上搗以雞子中黃和塗之加少豉

彌良

又方搗黃檗末節雞子白和厚塗之乾復易

差

又方燒鹿角搗末以苦酒和塗之佳

又方於石上水磨鹿角取濁汁塗癰上乾復

易隨手消

又方末半夏蘇子白和塗之水磨傳並良

又方神効水磨出小品

又方醋和茱萸若搗薑或小蒜傳之並良

一切惡瘡腫

蔓菁根一大握無以龍葵根代之乳頭香