

桐子搗汁塗上必生黑者

千金翼療髮黃

熊脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

楊氏產乳療白禿瘡及髮中生癬卷六

取熊白傳之

又療禿瘡

取虎膏塗之

聖惠方治白禿

以白鵝糞搗細羅為散先以醋米泔洗了

傳之立差

又治頭赤禿

簡要濟衆治頭瘡

大篆殼燒為灰量瘡大小用灰調生由

傳入少咸粉佳

葛仙翁肘後備急方卷之六

葛仙翁肘後備急方 卷七

葛仙翁肘後備急方卷之七

陸七

搗雄黃紫石縫瘻而帶之

附方 梅師方治虎傷人瘡

但飲酒常令大醉當吐毛出

治卒有獵犬凡所咬毒方第五十四

方寸七日五夜一則佳

又方嚼果塗之姚同

又方刺生鐵令有味以洗瘡上姚同

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣將入山草宜先焚之其經術云

到山下先閉氣三十五息存神仙將虎來

到吾前乃存吾肺中有白帝出把虎兩目塞吾下部又乃吐肺氣白通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捨都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圓汝非李耳耶汝盜黃帝之犬

黃帝教我問汝汝答之云何舉便行一山

之虎不可得見若逢之者目向立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳中

大噏噏虎北斗君汝去虎即走止宿亦先

四凹如此又燒牛羊角虎亦不敢近人又

葛氏方燒青布以燻瘡口毒即出仍煮葛根

令濃以洗瘡搗乾葛根末以煮葛根汁服

方寸七日五夜一則佳

療狗咬人方

先嗍却惡血灸瘻中十壯明日以去日灸

一壯滿百乃止姚云忌酒

又云地榆根末服方寸七日一二亦末傳瘻上生根搗傳佳

又方刮虎牙若虎骨服一七已發如獵犬者

服此藥即差姚同

又方仍殺所咬犬取腸傳之後不復發

又方搗薤汁傳之又飲一升日三瘻乃差

又方末礬石內瘻中裹之上瘻不壞速愈神妙

又方頭髮謂皮燒末水和飲一杯若或已目赤口噤者折齒下之姚云二物等分

又方搗地黃汁飲之并以塗瘻過百處止

又方末乾薑常服并以內瘻中

凡獵犬咬人七日一發過三七日不發則脫

也要過百日乃爲大免耳

每到七日輒當飲薤汁三二升又當終身禁食犬肉蠶鳴食此發則不可救矣瘡未差之間亦忌生物諸肥臘及冷但於餅下

蒸魚及就臍氣中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

若重發療方

生食蠶蛤鱠絕良驗姚同亦可燒炙食之

不必令其人知初得齒便爲之則後不發

姚剝作鱠吞蒜薑下

又方搗薑根汁飲之即差

又凡犬咬人

取蘆中熟灰以粉瘡傅之姚同

又方火炙蠶以灌瘡中姚同

又方以頭垢少內瘡中以熟牛屎塗之佳

又方接蓼以傅瘡上

又方乾薑末服二七薑汁服半升亦良

又方但依獵犬法彌佳燒蠶蛤及末藜石傅之尤佳

得犬噉者難療凡犬食馬肉生狂

及尋常忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆

欲發狂便宜枸杞汁煮糜飼之即不狂若

不肯食糜以鹽同鼻便急塗其鼻既舐之

則欲食矣神驗

附方 梅師方治狂狗咬人

○取桃白皮一握水三升煎取一升服

○食療治犬傷人

○杵生杏仁封之差

○治卒毒及狐漏林所毒方第五十五

○馬嚼人作瘡有毒種熱療痛方

○刺鷄冠血瀝著瘡中三下若駁馬用雌鷄

○利死馬腹中尿塗之即差姚同

○草馬用雄鷄姚同

○又方灸瘡及腫上差

○若瘡久不差者

○馬鞭梢長二寸鼠矢二七枚燒末膏和傅

○之效

又方以婦人月經傳上最良姚云神效人體上先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡中或但爲馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人

○燒馬鞭皮末以膏和傅上

○又方多飲淳酒取醉即愈

○又剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

○便取死馬腹中尿塗之即差姚同

○又方以手內女人陰中即愈有胎者不可令

○胎墮

○狐尿棘刺刺入腫痛欲死方

○破雞搗之即差

○又方以熟桑灰汁漬冷復易取愈

○小品方以熟蠶著瘡中又烟燻之令汁出即

○便愈

○此狐所尿之木猶如蛇虫也此下有魚骨傷

○人

○圖經云治惡刺及狐尿刺

○搗取蒲公草根莖白汁塗之惟多塗立差

止此方出孫思邈千金方其序云余以正

觀五年七月十五日夜以左手中指背觸

著庭木至曉遂患痛不忍經十日痛日

深瘡日高大色如熟小豆色穿闊長者之

論有此方遂依治之下則愈痛亦除瘡

亦即差未十日而平復楊炎南行方亦著

其效云

效方治狐尿刺蟄痛

杏人細研煮一兩沸水熱以浸蟄處數數

易之

外臺秘要治刺馬被骨刺破中毒欲死

取剥馬腹中糞及馬尿洗以糞傳之大驗

絞糞汁飲之效

聖惠方治馬咬人毒入心

馬齒莧湯食之差

靈苑方治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之連

則毒深難理

以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

王氏博濟治驥涎馬汗毒所傷神效

白礬飛黃丹炒令紫色各等分相聚合

調貼患處

治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方第五十

六

葛氏竹中青蜂螫人方

雄黃麝香乾薑分等搗篩以麝茵和之著

小竹管帶之行急便用傅瘡兼取蛇虺毒

又方破烏鵲熟傳之

蛇綠色喜緣樹及竹上大者不過四五尺

皆呼爲青條蛇人中立死

葛氏毒蛇螫人方

急掘作坑以埋瘡處堅築其上毒即入土

中須臾痛緩乃出

徐王治蛇毒方

用搗地榆根絞取汁飲兼治瘡

又方搗小蒜飲汁以滓傅瘡上

又方猪耳垢著瘡中牛耳中垢亦可用之良

又方麝鹽唾上訖灸三壯復嚼草唾之瘡上

又方搗薤傳之

又方燒蠅蛆末以傅瘡上

又方先以無節竹筒著瘡上鎔蠅及蜜等分

灌筒中無蜜單蠅亦通

又方急且尿瘡中乃拔向日閉氣三步以刀

掘地作小坎以熱陽沃坎中渥作丸如梧

子大服之并以少泥泥之瘡上佳

又方桂心苦棗分等爲末用小竹筒塞塞之

以帶行卒爲蝮蛇即傳之此藥療諸蛇毒

塞不密則氣歇不中用

一切蛇毒

急灸瘡三五壯則衆毒不能行

蛇毒

搗鬼針草傳上即定

又方荆葉袋貯薄瘡腫上

又方以麝茵塗腫上血出乃差

又方以合口椒并葉搗傳之無不止

附方

搗師方治蛇虺人

以獨頭蒜酸草搗絞傳所咬處

取黑豆葉剉杵傅之日三易良

廣濟方治毒蛇嘴方

茲蔣草根灰取以封之其草似鷺尾也

兵部手集主蛇蠍蜘蛛毒

鵝卵輕敲一小孔合咬處立差

劉禹錫傳信方治蛇咬蝎蟹

燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便

熱酒咬處立差此極神驗得力者數十人

貞元三十二年有兩僧流向南到鄧州俱

爲蛇噏令用此法救之傳藥了便發更無

○他苦

治蛇瘡敗蛇骨列人入口繞身諸方

第五十七

葛氏凡蛇瘡未愈禁熱食使發瘡之依初

蟄人法

蛇蟄人九竅皆血出方

取東蟲初食牛馬血腹滿者二七枚燒服

之

此上蛇瘡敗及洪腫法方蛇蟄人牙折入肉
中痛不可堪方

取蠍墓肝以傅上立出

又方先密取狗糞當其上穿勿令人見以再

覆瘡口上一時著糞當上穿穿即折牙出

也

蛇骨刺人毒痛方

以鐵精如大豆者以管吹瘡內姚同

又方燒死鼠搗傅之瘡上

蛇蟄人瘡已合而餘毒在肉中溼溼痛痒方

取大小蒜各一升合搗熟湯淋取汁灌瘡

中姚同

○他苦

治蛇瘡敗蛇骨列人入口繞身諸方

以熱湯淋即解亦可令就尿之

○他苦

艾灸蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾

截令皮斷乃將皮倒脫即出小品同之

七八月中諸蛇毒旺不得渡皆齧草木即枯

死名爲蛇蠍此物傷人甚於蛇蟄即依蛇

之蟄法療之

附方

廣利方治蛇咬瘡

燒酒淋洗瘡上日三易

聖惠方治蛇入口并入七孔中

割母猪尾頭瀝血滴口中即出

治卒入山草燒辟衆蛇藥術方第五

十八

辟棄蛇方

同前姚氏仙人入山草法

辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃爲上帶一塊

右稱五兩於肘間則諸蛇毒莫敢犯

他人中者便磨以療之又帶五姑黃丸良

○丸有蜈蚣故方在於備急中此下有禁法

云不受而行則無驗

蛇毒勿渡水渡水則痛甚於初螫

亦當先存想作大蜈蚣前已隨後渡若乘

船渡不作法殺人

入山並不得呼作蛇皆喚爲蛇中之者彌宜

勿誤辟蛇法

到處燒殺羊角令有煙出地則去矣

附方

廣利方治諸蛇毒蟄人欲死兼辟蛇

乾薑雄黃等分同研用小綃袋貯繫臂上

男左女右她聞藥氣遂避人蟻毒傳之

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方第五十九

葛氏方割鷄冠血塗之

又方以鹽鹹瘡上即食云蜈蚣去速者即不

復得

又方鹽熱潰之

又方嚼大蒜若小蒜或桑樹白汁塗之亦以

麻履底土揩之良

蜈蚣甚齧人其毒殊輕於蜂當時小痛而易

歇蜘蛛毒

生鐵衣醋研取濃汁塗之又烏麻油和胡

粉傅上乾復易取差取羊桃葉傅之立愈

梅師方治蜈蚣咬人痛不止

獨頭蒜摩擦處痛止

又經驗後方燒鷄屎酒和傅之佳又取鷄屎

和醋傅之

聖惠方治蜈蚣咬方
用蠅牛擦取汁滴入咬處

兵部手集治蜘蛛咬遍身成瘡

取上好春酒飲醉使人翻不得一向卧悉

酒毒腐人須臾蟲於肉中小如米自出

又譚氏小兒方以葱一枝去尖頭作孔將蚯

蚓入葱葉中緊捏兩頭勿淺氣頻搖動即

化爲水點咬處差

劉禹錫傳信方治蟲牙傷咬

取大藍汁一椀入雄黃麝香二物隨意着

多少細研投藍中以點咬處若是毒者即

并細服其汁神異之極也昔張負外在劖

南爲張延寶判官忽被班蜘蛛咬項上一

宿咬有二道赤色細如箸繞項上從脣前

下至心經兩宿頭面腫疼如數升益大肚

漸腫幾至不救張相素重薦因出家資五

百千并薦家財又數百千募能療者忽一

人應召云可治張相初甚不信欲驗其方

還今目前合藥共人云不惜方當療人性

命耳遂取大藍汁一甕益取蜘蛛投之藍

汁良久方出得汁中甚固不能動又別搗

藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死

又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一

蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異

之遂令點於穴處兩日內悉平愈但咬處

作小瘡痂落如舊

經驗方治蜘蛛咬遍身生線

羊乳一升飲之貞元十年崔員外從質云

目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃

之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日

而平

○又方治蛇咬

濃作鹽湯浸身數偏差浙西軍將張韶爲

此蟲所咬其形大如風眉鬚皆落每夕蛇

蛇鳴於體有傍教以此方愈

又方治蛇咬其形如大風眉鬚皆落

以石灰水浸身亦良

聖惠方主蜘蛛咬人方

以雞屎傳之

又方治蠍蛇咬人

用石灰醋和塗之

之又麝芮封之溫酒漬之即愈

附方

孫真人食忌主蠍蟹

以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中
浸蟄處

又勝金方烏頭末少許頭醋調傅之
又錢相公篋中方取半夏以水研滌之立止
又食醫心鏡以醋磨附子傅之
又經驗方以驢耳垢傅之差崔給事傳

○廣利方治蠍蟻人痛不止方

治中蠶毒方第六十三

少療蟲毒下血方

葛氏方療蠭毒下血方

黃連當歸各二兩水七升煮二升分三服

一方加犀角升麻各三兩無薑荷根用葛

標四兩代之傳

中疊令人腹切痛如有物塞或吐下血
不即療之食人五藏則死矣欲知疊與非

靈當令病人唾水中沉者是浮者非小品
姚並同
欲知蠱毒主姓名方
取鼓皮少少燒末飲病人須臾自當
呼蠱主姓名可語便去則便愈亦有蛇蠍
合作蠱毒著飲食中使人得癥病此一種
積年乃死療之各自有藥又蘿蔔葉密著
病人卧席下其病人即自呼蠱主姓名也
療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方
茜草根蘿蔔荷根各三兩㕮咀以水四升煮
取二升去滓適寒溫頓服即愈又自當呼
蠱主姓名茜草即染絳草也小品并姚方
同也
又方已豆一枚去心皮鼓政三粒金底墨方
寸匕合搗爲三丸一丸當下毒不可者更
服一丸即下
又方鹽一升薄苦酒和一服立吐即愈小品
同支方苦酒一升煮令消服愈
又方取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之剴死
但服其汁已死者皆可活

又方苦瓠一枚水二升煮取一升服立即吐
愈小品同支方用苦酒一升煮令消服神

又方阜英三挺炙去皮子酒五升漬一宿去滓分三服小品同

療飲中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋漓

骨立病變無常方取鐵精指之細節又別
搗烏雞肝以和之丸如梧子大服三丸甚

者不過十日微者即愈別有鐵精方
又方豬肝一具鹽一升共煎之令熟分為二

十服秘方小品同支方分作丸亦得
之又支入心利导一斗昔全口卷之入二

又方取棗木心搗得一斛著釜中沸之令上
有三寸水發取二斗澄取清微火煎得五

升宿勿食旦服五合則吐蟲毒出小品妣同之

又方雄黃丹砂藜蘆各一兩搗末以井華

水服 一刀圭當下吐蠶蟲出

治疕已食下部肚盡腸穿者
食之

取長股蝦蟆青背一枚鷄骨支方一分燒

爲灰合內下部令深入小品同支方屢用

大驗姚方亦同

又方以猪膽瀝內下部中以綿深導內塞之
又方五鹽黃丸最爲療蠱之要其方在備急

卷七

條中

復有自然飛蠱狀如鬼氣者難

此諸種得真犀麝香雄黃爲良藥人帶此

於身亦預防之

姚氏療中蠱下血如鵝肝出石餘四藏悉壞

○唯心未毀或鼻破

待死方
末桔梗酒服一七日一二葛氏方也

支太醫有十數傳用方

取馬兜零根搗末水服方寸七隨吐則出

極神驗此物苗似萬葉綠葉生子似橘子

凡畏已中蠱欲服甘草汁

宜生煮服之當吐疾出若平生預服防蠱

毒者宜熟炙煮服即內消不令吐神驗

又方甘草炙每含咽汁若因食中蠱反毒即

自吐出極良常含咽之永不慮藥及蠱毒

也

又有解百毒散在後藥毒條中亦療方

桑白汁一合服之須臾吐利蠱出

席辨刺史傳效二方云並試用神驗

斑貓蟲四枚去足翅炙桃皮五月初採取

去黑皮陰乾大戟凡三物並搗別節取斑

貓一分桃皮大戟各二分合和棗核大以

米清飲服之訖吐出蠱一服不差十日更

一眼差此蠱洪州最多老嫗解療一人得

練二十足祕方不可傳其子孫犯法黃花

公若干則爲都督因以得之流傳老嫗不

復得練席云已差十餘人也

又方羖羊皮方寸七裏荷根四兩苦參黃連

各二兩當歸犀角升麻各三兩七物以水

九升煮取三升分三服蠱即出席云曾與

卷七一人服應時吐蜂兒數升即差此是姚大

夫方

千金翼方療蠱毒

以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蠱出也

又治蠱毒下血

謂皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

外臺秘要救急治蠱

以白鵠毛糞燒灰飲和服之

楊氏產乳療中蠱毒

生玳瑁以水磨如濃飲服一盞自解

聖惠方治小兒中蠱下血欲死

搗青藍汁頻頻服半合

○治卒中溪毒方第六十四

姚氏中水毒秘方

取水萍曝乾以酒服方寸七差止又云中

水病手足指冷即是若暖非也其冷或一

寸極或竟指未過肘膝一寸淺至於肘膝

卷七爲劇

葛氏水毒中人一名中漢一名中灑東人呼為蘇駁

切一名水病似射工而無物其訛法

初得之惡寒頭微痛目注疼心中煩悶四肢振淅骨節皆強筋急但欲睡旦醒暮劇

手逆冷三日則復生蟲食下瘡不痛不痒
不冷人覺視之乃知不即療過六七日下
部膿潰蟲食五藏熱極煩毒注下不禁八
九日良醫不能療覺得急當深視下部若
有瘡正赤如截肉者為陽毒最急若瘡如
蟲魚齒者為陰毒猶小緩要皆然人不過
二十日欲知是中水毒當作數升湯以小
蒜五寸㕮咀投湯中莫令大熱熱即無力
挾去滓適寒溫以浴若身體發赤斑文者
又無異證當以他病療之也

○病中水毒方

取梅若桃葉搗絞汁三升許以少水解為
飲之姚云小兒不能飲以汁傅乳頭與之
又方常思草搗絞飲汁一二升并以綿染寸
中以導下部日二過即差

又方搗藍青汁以少水和塗之頭面身體今
西

又方取梨葉一把熟搗以酒一杯和絞服之
不過三

又方取地榆草根搗作末服之并以導下部

亦可飲汁一二升夏月常行欲入水浴先
以少末投水中流更無所畏又辟射工家
中雖以器貯水浴亦宜少末投水中大佳
今東閭諸山縣無不病溪毒春月皆得亦如
傷寒呼為溪溫未必是射工輩亦盡患瘡
瘡但寒熱煩疼不解便致死耳方家用藥
與傷寒溫疾相似今施其單法
五加根燒末酒若漿水飲之荆葉汁往往
金不傳秘之

○又方密取蓼搗汁飲一二合又以塗身今周

正一子天微弟子百堅首術言
取牛膝莖一把水酒共一杯漬絞取汁飲
之日三雄牛膝莖紫色者是也

若下部生瘡已決洞者

林木一升鹽五升水一石煮作糜坐中即

匣

又方桃皮葉熟搗水漬令濃去滓著盆中坐
漬之有蟲出

又方阜莢燒末綿裹連之亦佳又服牡丹方
寸七日三服

○治卒中射工水弩毒方第六十五
江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山
間水中人行及水浴此蟲口中橫骨角弩
即以射人形影則病其訛法
初得或如傷寒或似中惡或口不能語或
惡寒熱四肢拘急旦可暮劇困者三日齒
間血出不療即死其中人有四種初覺則
徧身體視之其一種正黑如墨子而繞四
邊犯之如刺狀其一種作瘡瘻久
即穿陷一種突起如石其一種如
大灼人肉熛起作瘡此種最急並皆熬人
居地天大雨或逐人行潦流入人家而射人又當養鵝鴨食人行將純
白鵝以辟之白鵝亦善帶好生犀角佳也
若見身中有此四種瘡處便急療之

急周繞徧去此瘡邊一寸輒灸一處百壯
瘡亦百壯則

又方赤莢莖葉搗絞取汁飲之以滓傅之姚
云服七合日四五服

又方葫蘆令傅以搗瘡上灸蒜上千壯差

又方白鷄矢白者二枚以小錫和調以塗瘡上

又方鼠婦蟲或各七合巴豆三枚去心合猪脂但以此藥塗之

又方取水上浮走或母蟲一枚置口中便差

云此蟲正黑如大豆浮水上相遊者

又方取半夏一挺尺二者搗碎苦酒一升煎如飴去滓傳之痛處差

又方馬齒莧搗飲汁一升津傳瘡上日四五編則良驗

○又方升麻烏賊各二兩水三升煮取一升盡

服之滓傳瘡上不差更作姚同更加犀角二兩

云此蟲含沙射人影便病欲渡水先以石投之口邊角弩發矢言口息兩角能屈伸

冬月則蟄生七二十二

又方升麻鳥翼各二兩水三升煮取一升盡

服之滓傳瘡上不差更作姚同更加犀角二兩

云此蟲含沙射人影便病欲渡水先以石投之口邊角弩發矢言口息兩角能屈伸

不能語餘狀如葛氏所說

治卒中沙亂毒方第六十六

山水間多有沙蟲甚細略不可見人入水浴及以水漂浴此蟲在水中著人身及陰天雨行草中亦著人便鑽入皮裏其診法

初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺三日之後令百節強疼痛

寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人自

有山澗浴畢當以布拭身數遍以故帛拭

之一度乃傳粉之也

又療沙蟲毒方

○以大蒜十片著熱灰中溫之令熱斷蒜及

熱桂瘡上盡十片復以艾灸瘡上七壯則良

○熟桂瘡上盡十片復以艾灸瘡上七壯則良

又方斑蝥二枚熬一枚末服之燒一枚令絕

烟末以傳瘡上即差又以射罔傳之佳

又方生麝香大蒜合搗以羊脂和著小筒子中帶之行今東問水無不有此浴竟中拭

燭燭如芒毛針刺熟看見則以竹葉抄挑去之

比見嶺南人初有此者即以茅葉若茗刮去及小傷皮則為佳仍敷塗苦苣菜汁佳

又方吞鷄子黃數枚即愈不差更作

已深者針挑取蟲子正如疥蟲著爪上映光方見行動也若挑得便就上灸三四壯則蟲死病除

若覺猶憐惜見是其已太深便應依土俗作方術拂出乃用諸湯藥以浴皆一二升

出都盡乃止亦依此方并雜 溪毒及

射工法急救七日中宜差不爾則仍有飛

蟲 敢人心藏便死慎不可輕

○治卒服藥過劑煩悶方第六十七

服藥過劑煩悶及中毒多煩悶欲死方

○刮東壁土少少以水一二升和飲之良

又方於屋雷下作坎方二尺深三尺以水七升灌坎中以物揚之令沫出取一升飲之

未解更作

又方擣藍取汁服數升無藍只洗青綃取汁

服亦得

服藥失度心中苦煩方

飲生葛根汁大良無生者乾葛為末水服

五合亦可煮服之

又方吞鷄子黃數枚即愈不差更作

服石藥過劑者

白鴨屎末和水調服之差

又方大黃三兩芒硝二兩生地黃汁五升煮

取三升分三服得下便愈

若卒服藥吐不止者佳

二十四

飲新汲水一升即止

若藥中有巴豆下痢不止方

末乾薑黃連服方寸匕差

又方荳豆汁一升服之差

附方

外臺祕要治服藥過劑及中毒煩悶欲死

燒犀角末水服方寸匕

治卒中諸藥毒救解方第六十八

治食野葛已死方

以物開口取雞子一枚和以衣之須臾吐

野葛出

又方溫猪脂一升飲之

又方取生鴨就口斷鴨頭以血瀝口中入咽

則活若口不可開者取大竹筒洞節以頭

注其脣取冷水竹筒中敷易水須臾口開

則可得下藥若人多者兩腸及臍中各與

箇甚佳

又方多飲甘草汁佳

姚方中諸毒藥及野葛已死方

新小便和人屎絞取汁一升頓服入腹即

活解諸毒無過此汁

中配毒已死者

粉三合水三升和飲之口噤以竹管強開灌之

又方吞水銀二兩即裹金出少者一兩亦足

姚云一服一兩三度服之扶坐與之令入腹

日三服
食金已死者取鷄屎半升水淋得一升飲之

中杏仁毒以藍子汁解之

中半夏毒以生薑汁乾薑並解之

中附子烏頭毒大豆汁速忘汁並可解之

中狼毒以藍子汁解之

中狼毒以藍子汁解之

中藜蘆毒以葵根汁解之

中藜蘆毒以葵黃芩汁並可解之

中藜蘆毒以梔子汁解之

中藜蘆毒以梔子汁解之

中巴豆毒

黃連小豆霍汁大豆汁並可解之

中雄黃毒以防己汁解之

中蜀椒毒中蜈蚣毒

二毒桑汁蕕桑根汁並解之

中礬石毒以大豆汁解之

中芫花毒以防風甘草桂並解之

中半夏毒以生薑汁乾薑並解之

中附子烏頭毒大豆汁速忘汁並可解之

中杏仁毒以藍子汁解之

中狼毒以藍子汁解之

中狼毒以藍子汁解之

中藜蘆毒以葵根汁解之

中藜蘆毒以葵黃芩汁並可解之

中藜蘆毒以梔子汁解之

中藜蘆毒以梔子汁解之

中巴豆毒

黃連小豆霍汁大豆汁並可解之

中雄黃毒以防己汁解之

中蜀椒毒中蜈蚣毒

二毒桑汁蕕桑根汁並解之

又方荳豆咬咀濃煮多飲其汁并多食葱中

涕並佳

又方荳豆令湯多飲其汁無大豆豉亦佳

又方藍青藍子亦通解諸毒常預蓄之

又方藍青藍子亦通解諸毒常預蓄之

嚼食之亦可作散服之此藥在諸藥中諸

藥則皆驗

又方凡煮此藥汁解毒者不可熱飲之諸毒

得熱更甚宜使小冷爲良

帶辯刺史云嶺南俚人毒皆因食得之多不即覺漸不能食或更心中漸脹并皆急悶先寒似瘴

微覺即急取一片白銀含之一宿銀變色

即是藥也銀青是藍藥銀黃赤是齒藥久者人眼眼或青或黃赤青是藍藥黃赤是齒藥俚人有解療者畏人得知在外預言三百牛藥或云三百兩銀藥余以首領親狎知其藥常用俚人不識本草乃妄言之其方並如後也

初得俚人毒藥且令定方

生薑四兩甘草三兩炙切以水六升煮取二升且服三服服訖然後覓藥療之

療方

常山四兩切白蘿蔔四錢以水一斗漬一宿以月盡日漬月一日五更以上釜煮勿令

奴婢鷄犬見煮取二升旦分再服服了少時即吐以銅器貯取若青色以杖舉五尺不斷者即藥未盡二日後更一劑席辨曾

飲酒得藥月餘始覺首領舉墳將土常山

與爲呼爲一百頭牛藥服之即差差後二十日慎毒食唯有羹飯食之前後得差凡

九人

又方黃藤十兩嶺南皆有切以水一斗煮取

二升分三服服訖毒藥內消若防已俚人

藥常服此藤縱得自然不發席云常服之

利小便亦療數人

又方都淋藤十兩嶺南皆有上人悉知俚人呼爲三百兩銀其葉細長有三尺微藤生

○切以水一斗和酒二升煮取三升分三服。

服訖毒藥並逐小便出十日慎毒食不差

○更服之即愈

○不得取野葛同生者切以水七升酒一升

末水二椀煎至八分一椀今溫服頓服

○明日取下惡物

○又方乾藍實四兩白花藤四兩出雋州者上

黃取半空腹頓服之少悶勿惟單乾藍擣

末頓服之亦差

○又療腹內諸毒

○都淋藤二兩長三寸並細剉酒三升合安

墨中密封以糠火燒四邊燒令三沸待冷

○孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒
甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒等試

出溫服常令有酒色亦無所忌大效

○若不獲已食俚人食者

○先取甘草一寸炙之後熟嚼吞之若食著

毒藥即吐便是得藥依前法療之席辨云常囊貯甘草十片以自防

○附方

○勝金方治一切毒

○以膽子裝爲末用糯米糊丸如鷄頭實大

○以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸服立差

○經驗方解藥毒上攻如聖散

○露蜂房甘草等分用炒令黃色去麩爲

末水二椀煎至八分一椀今溫服頓服

○明日取下惡物

○外臺秘要治諸藥石後或熱噤多向冷地卧

○又不得食諸熱麵酒等方

○五加皮二兩以水四升煮取二升半候石

○發之時便服未定更服

○孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒

○甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒等試

之不效乃加甘草爲甘豆湯其效更速

梅師方蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕

或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲分

水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁服之

聖惠方治硫黃忽發氣悶用羊血服一合效

又方治射罔在諸肉中有毒及漏肺毒二十九

用貝子末水調半錢服效或食麵蘸毒亦

同用初虞世方治藥毒秘效

巴豆去皮不出油馬牙硝等分合研成膏

○冷水化一彈子許服差

治食中諸毒方第六十九

蜀椒閉口者有毒戰人咽氣便欲絕又令人

吐白沫二十

多飲桂汁若冷水一二升及多食大蒜即

便愈慎不可飲熟絞人此見在中椒毒合

蒜及青荳二十一差

鈎吻葉與芥相似誤食之救人方

芥子入兩水六升煮取三升服五合日五

服又云此非鈎吻

食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死方

取鷄屎燒末服方寸匕不解更服又煮葛根飲汁

葛若毒養甘草汁擣藍汁飲並良

苦瓠毒煮黍籜令濃飲汁數升佳

食馬肝中毒二十二

取牡鼠屎二七枚兩頭尖者是水和飲之

未解者更作

食六畜鳥獸二十三

○幞頭垢一錢七小品云起死人又飲豉汁

數升良

凡物肝臟自不可輕噉自死者彌勿食之生

食肝中毒二十四

擣附子末服一刀圭日三服

肉有箭毒以薑汁大豆解射箭毒二十五

食蠻肉謂在審器中經宿者及漏脯茅屋汁

露脯馬漏脯此前並有毒二十六

燒人屎末酒服方寸匕

又方擣薤汁服二三升各連取以少水和之

食黍米中藏脯中毒方

此是鬱脯煮大豆一沸飲汁數升即解兼解諸肉漏毒

食自死六畜諸肉中毒方

黃藥末服方寸匕未解者數服

六畜自死皆是遭疫有毒食之洞下亦致堅積並宜以痢丸下之

食魚中毒二十七

濃羹橘皮飲汁小品云冬瓜汁最驗

食豬肉遇冷不消必成蟲癥下之方

大黃朴硝各一兩芒硝亦佳黃取一升畫

服之若不消并皮研杏子湯三升和三服

吐出神驗二十八

食牛肉中毒養甘草飲汁一二升

食馬肉洞下欲死者

豉二百粒杏子二十枚咬咀蒸之五升飯

下熟合搗之再朝服令盡二十九

此牛馬皆謂病死者耳

食鱠魚肝及鯪鱠魚中毒三十

刺蘆根養汁飲一二升良

解毒濃羹香蘇飲汁一升

飲食不知是何毒

依前甘草薺羌通療此毒皆可以救之

食菹菜誤吞水蛭蛭噉臟血腸痛漸黃瘦者

飲牛羊熱血一二升許經一宿便燒猪脂

一升飲之便下蛭

食菌遇毒死方

絞人屎汁飲一升即活服諸吐痢尤亦佳

又極地作土梨服二三升則良

誤食野芋飲死療同菌法

凡種芋三年不取亦成野芋即殺人也

附方

梅師方治飲食中毒魚肉菜等

苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服

之吐出即愈或取煮犀角汁一升亦佳

又方治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發

熱妄語煮蘆根飲之

又方杏仁一升去皮水三升煎沸去滓取汁

爲三服下肉爲度

金匱方治食蟹中毒

紫蘇煮汁飲之三升以子汁飲之亦治凡

蟹未經霜多毒

又聖惠方以生藕汁或煮乾蒜汁或冬瓜汁

並佳

又方治雞肉作脯食之吐下

用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

唐崔魏公云

正一元氣真言第洪百堅鐵夜暴亡有梁新聞之乃諭之

曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑搗汁折齒而灌之

活

金匱方春秋二時龍帶精入芥菜中人遇食

之爲病發時手青肚滿痛不可忍作蛟龍。

病服硬糖三升日二度吐出如蜥蜴三

二个便差

明皇雜錄云有黃門奉使交廣回周顧謂曰

此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾

又方治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發

否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱因且渴遂

飲水覺腹中堅痞如恆周遂以硝石及雄

黃芩服之立吐一物長數寸大如指視之

鱗甲具拔之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上

甚詳之

治防避飲食諸毒方第七十

雜鳥獸他物諸忌法

白羊不可雜雄雞 羊肝不可合烏梅及

椒食 猪肉不可雜羊肝 牛腸不可合

大肉 雞肉不可合生葱菜 雞鴨肉

不可合蒜及李子繁肉等 生肝投地塵

芥不著者不可食 暴脯不青燥及火炙

不動并見水而動並勿食 鳥獸自死口

不開者不可食

水 中魚物諸忌

魚頭有正白連諸脊上不可食 魚無腸

膽及頭無鰓勿食 魚不合烏雞肉食

生魚目赤不可作膾 魚勿合小豆藿

青魚酢不可合生胡荽 蟬目凹者不可

食 蒸肉不可合雞鴨子及赤莧菜食之

雜果菜諸忌

李子不可合雞子及臨水食之 五月五

日不可食生菜 病人不可食生胡芥菜

姪勿食桑椹并鴨子巴豆藿
夏菖蒲羊肉細辛桔梗忌菜

甘草忌菘

菜牡丹忌胡荽 常山忌葱 黃連桔

梗忌猪肉 茯苓忌大醋 天門冬忌鯉

魚

附方

食醫心鏡黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍亂

孫真人食忌蒼耳合猪肉食害人又云九月

勿食被霜瓜食之令人成反胃病

○治卒飲酒大醉諸病方第七十一

○大醉恐腹脹爛

○作湯於大器中以漬之令復易

○大醉不可安卧常令搖動轉側又當風席地

及水洗飲水最忌於交接也

○飲醉頭痛方

刮生竹皮五兩水八升煮取五升去滓然

後合納雞子五枚攪調更煮再沸二三升

服盡

○飲後下痢不止
糞龍骨飲之亦可末服

連月飲酒喉爛舌上生瘡

○擣大麻子一升末黃檗二兩以蜜為丸服

之

○飲酒積熱遂發黃方

○雞子七枚苦酒漬之封密器中納井底二

宿當取各吞二枚效漸愈

○大醉酒連日煩每不堪方

○蔓青菜并少米熟煮去滓冷之便飲則良

○又方生葛根汁一二升乾葛煮飲亦得

○欲使難醉醉則不損人方

○擣柏子仁麻子仁各二合一服之乃以飲

○酒多二倍

○又方葛花并小豆花子末為散服三二七又

○時進葛根飲枳杷葉飲并以雜者乾蒲麻

子等皆使飲而不病人胡麻亦熟酒先食

○鹽一匕後則飲酒亦倍

○外臺秘要治酒醉不醒

○九月九日真菊花末飲服方寸七
又方斷酒用驢駒火燒灰酒服之

○又方鶴鵠糞灰水服方寸七

○聖惠方治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方

○取柑皮二兩焙乾為末以三錢七水一中

○蓋煎三五沸入蓋如茶法服妙

○又方治酒醉不醒

○用菘菜子二合細研井花水一盞調為二

○千金方斷酒法

○以酒七升著瓶中朱砂半兩細研著酒中

○緊閉塞瓶口安猪圈中任猪搖動經七日

○○頓飲之

○又方正月一日酒五升淋碓頭杵下取飲

○又方治酒病

○豉葱白各半升水二升煮取一升頓服

○葛仙翁肘後備急方卷之七